

# COLEOPTERA MICROPTERA

BRUNSVICENSIA

NEC NON

EXOTICORUM

QUOTQUOT EXSTANT IN COLLECTIONIBUS

ENTOMOLOGORUM BRUNSVICENSIIUM

IN GENERA FAMILIAS ET SPECIES

DISTRIBUIT

DR. J. L. C. GRAVENHORST

SOCIETATIS PHYSICAE GÖTTINGENSIS SÓDALIS.

---

BRUNSVIGAE,

APUD CAROLUM REICHARD MDCCCII.

1802

J 130 127

COLEOPTERA MICROPTERA

BRUNSVIGENSIS

NEC NON

EXOTICORUM

QUOTQUOT EXISTANT IN COLLECTIONIBUS

ENTOMOLOGICIS BRUNSVIGENSIS

IN GENERA FAMILIAS ET SPECIES

DESIGNAVIT

DR. J. L. C. GRAY

SECRETARIUS SOCIETATIS ENTOMOLOGICAE BRUNSVIGENSIS

*J. G. Gmelin*

BRUNSVIGIAE

ATQUE CAROLO RICHARDO MÜLLER

1855

VIRO

ILLUSTRI ATQUE DOCTISSIMO

JOH. CHRIST. LUD. HELLWIG,

DOCTORI PHILOSOPHIAE, PUERORUM NOBILIVM IN AULA BRUNSVI-  
CENSI PRAEFECTO, MATHEMATICAE ET HISTORIAE NATURA-  
LIS PROFESSORI, SOCIETATUM PLURIVM NATURAE CURIO-  
RUM SOCIO,

H O C O P U S C U L U M

SACRUM ESSE

VOLUIT

A U C T O R.

Viro

ILLUSTRI ATQUE DOCTISSIMO

JOH. CHRIST. LUD. HELLWIG

DOCTORI PHILOSOPHIAE, THEOLOGORUM MORTUUM IN ABBATIA BENEVENTANA  
CUM PRÆFATO, MATHEMATICARUM ET HISTORIARUM M.A.S.S.  
ET PROFESSORI SOCIETATUM PLENUM NATURAE CANTONIS

FORUM SOCIUM

NOE O T U S C U L U M

FORUM SOCIUM

VOLEIT

A U C T O R

*J. Hellwig*



*Tu, vir venerande,* fuisti, qui primus me cognitione rerum naturalium imbuisti, et mihi ordinem atque finem earum probasti. *Te* duce conabar sequi viam, quam mihi ostenderas, et amicitia atque benevolentia *tua* pro adminiculis erant mihi, viam semel ingresso. Perpendebam, quam amplus sit campus, qui ante oculos extendebatur, et quanta atque qualia necessaria essent, quo tuto in eo progrederer; praeceptis attamen ducis peritissimi fretus, audebam ulterius procedere, et meas quoque vires quantulascumque in ejus culturam impendere.

Hoc opusculo *tibi, vir venerande*, tentaminis primi  
mei rationem reddo. Utinam *tuo* atque reliqui publici  
entomologici applausu dignum sit.

Scripsi  
Brunsvigae,  
mense martio MDCCCII.

## Prolegomena.

## §. I.

## Historia culturae Coleopterorum

## Micropterorum.

*Coleoptera Microptera* illa appellq insecta, quibus sunt „coleop-  
tra dimidiata, et tarsi quinquearticulati;“ characteribus enim  
his duobus a reliquis coleopteris facillime distinguuntur.

De his insectis in historiae naturalis cultorum vetustissimo-  
rum scriptis nihil certi invenimus. et eis omnino ignota fuisse  
videntur. Qui autem initio seculi decimi septimi vixerunt, pri-  
mo quorundam horum coleopterorum mentionem fecerunt;

*Aldrovandus* sub genere *Forbicina* tam *Forficulas* quam *Sta-  
phylinos* complexus est 1). — *Moufetus* insecta, ab *Aldrovando*  
„*Forbicinae*„ appellata, separavit, et quaedam *Forficulas*  
quaedam *Staphylinos* denominavit 2). — Dehinc genus *Sta-*

1) *Ulysses Aldrovandi*, Medici Bononiensis, de Animalibus Insectis libri  
VII, Bononiae 1602 (et alias alibi editi).

2) *Insectorum sive minimorum Animalium Theatrum etc.* Th. *Moufeti* Lon-  
dinatis opera etc. perfectum etc. Londini 1634.

phylinorum sensim speciebus pluribus augebatur. *Linnaeus*, qui primus „*Systema Naturae*“ 3) propriè sic dictum, characteribus firmis nixum, edidit, in ordine primo Insectorum qui Coleoptera complectitur, plures *Staphylinorum* species descripsit — *Geoffroy* 4) insecta in sectiones distribuit, sectiones in articulos, articulos in ordines. Sectioni primae, quae coleoptera continet, articuli secundi, „coleoptris dimidiatis duris,“ ordo primus, „tarsorum articulis quinque,“ solum genus *Staphylinorum* continet, jam speciebus multis insigne. — *Schaeffer* 5) e Coleopteris, elytris dimidiatis, quae *Coleoptera Microptera* appellat, classem secundam insectorum constituit, cujus ordo primus Coleoptera Microptera, „tarsis omnibus quinquearticulatis,“ solos scilicet *Staphylinos* Linnaeanos, comprehendit. — *De Geer* Coleoptera in classe insectorum octava congregavit. Sectio prima hujus classis complectitur Coleoptera tarsis omnibus quinquearticulatis 6), inter quae etiam *Staphylinos* Linnaeanos. — *Fabricius* hoc genus, hactenus indivisum, in tria genera dissolvit, *Staphylinorum* nempe, *Oxypororum* et *Paederorum*, et Coleoptera, ordinem insectorum primum, *Eleutherata* appellavit 7). — Multitudine autem specierum, et habitu earum vario, apparebat, haec

3) Caroli Linnaei *Systema Naturae* etc. Lugduni Batavor. 1735 (et alias aibi editum).

4) *Histoire abrégée des Insectes* par M. Geoffroy. Tom. I. et II à Paris 1764.

5) Jac. Christ. Schaeffer *Elementa Entomologica* etc. Ratisbonae 1766.

6) *Memoires pour servir à l'histoire des Insectes* par Charles De Geer etc. Tom. I — VII à Stockholm 1752 — 1778.

7) Joh. Christ. Fabricii etc. *Systema Entomologiae* etc. Flensburgi et Lipsiæ 1775.

genera in pluria naturalia adhuc disiungi posse. *Hellwigius*, in *Rossii Fauna Etruriae* 8), quam edidit (gen. 87), jam monuit, „Ista tria genera Fabricii“ (Staphylinus, Oxyporus et Paederus) „non sufficere“ et „Oxyporus rufum et maxillosum genus peculiarare constituere“ (gen. 88). — *Olivier* 9) genera quidem Fabriciana retinuit, Staphylinos autem, secundum capitis magnitudinem, in duas familias divisit, et Oxyporos plurimos Fabricii, illos scilicet, qui characteribus distinctivis, a Fabricio ipso huic generi propositis, haud responderent, ad Staphylinos retulit. — *Latreille*, conservatis generibus tribus, quartum addidit, e *Staph. biguttato, clavicorni* et affinis constitutum, quod *Stenus* nominavit 10). Coleoptera sunt ejus classis prima insectorum. — *Cuvier* 11), exemplo antecessorum, insecta in classes, sectiones &c. distribuit. Classis quarta Coleoptera comprehendit; ordo N huius classis, „Coleoptera coleoptris dimidiatis,“ quae sunt Staphylini Linnaeani. Hoc genus in quatuor subdivisit familias, scilicet a. Staphylinos, b. Paederos, c. Oxyporos, d. Stenos.

*Linnaeus, Geoffroy, Schaeffer*, horumque virorum coëtanei, genus Staphylinorum characteribus multo melioribus et distinctioribus constituerant, quam multi eorum successorum. Ratione enim habita coleoptrorum dimidiatorum, antennarum, tarso-

8) *Fauna Etrusca, sistens insecta, quae etc. collegit Petrus Rossius etc. iterum edita a Dr. J. C. L. Hellwig etc. T. I. Helmstadii 1795.*

9) *Entomologie etc. par M. Olivier, Tom. I — III à Paris 1795.*

10) *Précis des Caractères génériques des Insectes par le citoyen Latreille à Brive, an V de la R. (1796).*

11) *Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des animaux par G. Cuvier, Paris, an VI (1797).*

rum &c., characteribusque ab his desumptis, genus Staphylinorum optime a cogeneribus discreverant. Habitu autem externo duce, species huius generis commode in plura genera dispecsi poterant. — Fabricius Staphylinos in tria genera sejungebat, characteribus genericis a solis instrumentis cibariis desumptis, infeliciter autem in singulis speciebus haud examinatis et collatis. Inter characteres *Staphylinorum* sunt „palpi quatuor filiformes;“ quaero autem, num *Staph. biguttato*, *atricapillo*, *fuscipedi*, *canaliculato*, *sanguineo*, *florali*, *paceo* &c. palpi sint filiformes? *Oxyporos* a cogeneribus distinguit „palpis quatuor inaequalibus; antenicis filiformibus, posticis securiformibus;“ character, duobus tantum viginti trium specierum huius generis proprius; palpis enim *Oxypori* veri (e. g. *O. rufus*, *maxillosus*), *Oxyp. lunulctus*, *subterraneus*, *rufipes* cum affinis, et *Oxyp. cellaris*, *analis*, *chrysomelinus* &c. longe diversi sunt. Idem valet in tertium genus, nec *Paederis ripario*, *elongato*, *orbiculato* &c. palpi sunt iidem. — Olivier et Paykull 12) genus quidem *Oxypororum* characteribus emendaverunt, omnia scilicet coleoptera, in Systemate Fabricii, sub hoc genere complexa, *Oxyporis rufo*, *maxilloso* et similibus exceptis, in genus *Staphylinorum* redigentes. *Staphylinis* autem et *Paederis* parum operae dederunt, nisi quod illos, secundum capitis magnitudinem, cum thorace comparatam, in duas familias diviserint, quae tamen, magnitudine capitis huius generis insectorum adeo variabili, parum prosunt.

Haec omnia me impellebant ad examen horum generum et specierum accuratius instituendum, cui copia haud parva specie-

12) Monographia Staphylinorum Specie a Gustavo de Paykull. Upsaliae 1789 S.

Gustavi de Paykull Fauna Suecica Tom. III. Upsaliae 1800.

rum, pro parte omnino adhuc novarum, quas undique collegeram, occasiōnem exoptatissimam offerēbat. Constitutio generum, quae hoc opusculō tractabo, fructus huius examinis erat. Licētatū a Prof. *Hellwig*, comiter mihi concedente usum collectionis divitis, speciebus pluribus novis et specierum jamjam notarum magna copia; conspicuae, consiliū capiebam publicē proferendi quae observaveram. Interea Prof. *Knoch* jam aliquid temporis in examen horum coleopterorum impenderat et plurā nova genera condiderat, scilicet e Staph. *biguttato*, *clavicorni* &c. genus *Euryops* (*Stenus* Latreille); e Staph. *fuscipede*, *caenaliculato*, *piceo*, *impresso* (Oliv.) *sulcato* (Oliv.) &c. genus *Allocharya*; e Staph. *rivulari* (Payk.), *obscurō* (Payk.), *brunneo* (Payk.) &c. genus *Anthophagus*; ex Oxyporis Fabricianis, praeter *Oxyprufum*, *maxillosum* et affines, genus *Tachyporus*. Cum autem Pr. *Knoch* nondum in animo haberet, quae observaverat jam promulgare, haec mecum benevolenter communicabat. Nomina generum novorum Prof. *Knoch* retinui, et e collectione ejus divite insectorum, plures hactenus ignotas species descripsi. — Multa sunt, quae viris doctissimis, Professoribus *Hellwig* et *Knoch* debeo, et illis auxiliantibus effectum est, si hoc scriptum ad aliquam perfectionem pervenerit. — Hic autem adnotare me oportet, Monographiam Coleopterorum Micropterorum Brunsvicensium jam maximam partem prelium reliquisse, cum consiliū caperent, exotica quoque describendi, quotquot eorum collectiones *Comitis de Hoffmannsegg*, Professoris *Hellwig*, et Professoris *Knoch* continerent. Unde evenit, ut quibusdam generibus et speciebus vernaculis character unus vel alter desit, quo a generibus atque speciebus exoticis affinibus differunt. E. g. characteribus genericis *Anthophagi* addendus est „Thorax cordatus,“ cum „Antennis filiformibus, thorace postice truncato“

haud a *Pinophilo*, genere exotico, distingui possit. Diagnosi *St. olentis*, „niger, opacus,“ addendum est, „antennis extrorsum tenuioribus“, quibus a *St. tomentosus*, ex America septentrionali, differt. *Lathrobium depressum* e Lusitania familiam constituit peculiarem huius generis, habitu enim de reliquis Lathrobiis omnino decedit; unde sequitur, descriptionem quoque generalem, Lathrobiis praenissam, ad hanc speciem non referri posse. — Praeterea Coleopteris Micropteris exoticis quaedam indigena inserta sunt, quae in horum Monographia desunt, cum serius innotuerint.

## §. 2.

De characteribus generum, nec non de  
diagnosibus et descriptionibus  
specierum.

Coleopterorum Micropterorum genera, quae condidi, adhibitis characteribus eorum essentialibus atque distinctivis, in tabellam sequentem redegi:

*Coleoptera*

coleoptris dimidiatis, tarsis quinquearticulatis.

## Coleoptera Microptera.

## I. Palpis anterioribus triarticulatis.

## A. Antennarum articulo ultimo ovato.

1. Articulo ultimo palporum posteriorum acuminato. —

*Paederus*.

2. Articulo ultimo palporum posteriorum ovato. — *Stenus*.

B. Antennarum articulo ultimo cylindrico. — *Callicerus*.



## II. Palpis anterioribus quadriarticulatis.

A. Articulis ultimis palporum inaequalibus. — *Oxyporus*.

B. Articulis ultimis palporum aequalibus.

1. Articulis ultimis palporum ovatis.

a. Thorace postice rotundato. — *Staphylinus*.

b. Thorace postice truncato.

α. Antennis extorsum crassioribus.

aa. Thorace marginato. — *Omalium*.bb. Thorace immarginato. — *Tachinus*.

β. Antennis filiformibus.

aa. Thorace cordato. — *Anthophagus*.bb. Thorace quadrato. — *Pinophilus*.2. Articulis ultimis palporum securiformibus. — *Astrapaeus*.

3. Articulis ultimis palporum gracilibus subuliformibus.

a. Thorace elongato. — *Lathrobium*.

b. Thorace brevi.

α. Tibiis laevibus. — *Aleochara*.

β. Tibiis spinosis.

aa. Thorace laevi. — *Tachyporus*.bb. Thorace foveolato. — *Oxytelus*.

2. Pluria horum generum rursus in familias dilabuntur, quas singulis generibus antepōnam.

— E tabella praecedente quisque videbit, me, in constitutione generum, *systema artificiale* secutum esse, et characteres genericos a quibusdam solummodo partibus desumpsisse. — *Systema naturale*, habitu toto insectorum fundatum, in praxi forsā optimū foret, in theoriā autem difficile, cum sane lingua quaevis nimis inops sit, quam quod, brevibus verbis, habitum illū totum et modificationes ejus circumscribere possit, et in fine, pro descriptione habitus, nihil aliud quam descriptionem lon-

gam partium omnium singularium, i. e. systema artificiale, daret. Habitus autem me duxit in ista genera, quae postea characteribus, ut credo, certis atque firmis, condidi; systema enim artificiale eo melius esse, puto, quo propius accedit ad systema naturale. Coleoptera Microptera omnia, quotquot eorum possidebam, secundum habitum totum, in plures cohortes seu genera segregabam, hoc facto disquirebam partes, quarum forma singularis huic vel illi generi propria erat, et ubi character unus nondum sufficebat, partium plurium simul rationem habebam. Hoc modo cuique generi characterem, vel characteres, quosdam eruebam, qui conjunctionem genera a cogeribus distinguebant. Coniunctio *Staph. maxillosi, clavicornis, fuscipedis, angustati, picei, floralis*, quos, cum multis aliis, *Fabryi* sub genus Staphylinorum complexus erat; porro, coniunctio *Oxyp. rufi, et rufipedis*, Paederorum *viparum, et elongati* &c. nunquam mihi naturalis esse videbatur. Examine instituto, mihi facile persuadebam, singulum eorum, cum affinibus, peculiare genus, characteribus firmis et constantibus distinctum, condere posse. Simul autem experientia me docebat, quam sit difficile, systema naturale cum systemate artificiali absolute coniungere. Quaedam insectorum huc pertinentium, habitu toto simillima, forma palporum plane invicem decedebant et cum aliis generibus, valde dissimilibus, coniungenda fuissent; si characteres generum, a palpis solis desumissem, et partium aliarum nullam rationem habuissem. E. g. *Oxyp. (Fabr.) rufipes, tubulatus* &c. secundum formam palporum, ad *Staphylinos* et *Anthrophagos*, aliudve genus; *Oxyp. (Fabr.) bimaculatus, ochrysonellinus* &c. ad *Aleocharas*, *Oxytelos* aliudve genus, relegari debuissent. Quia, vero, *Oxypori*, allegati Fabr.; secundum principia systematis mei; nec, formae diversae palporum causa, sub eodem genere manere poterant.

quamvis, habitu naturali, affines, (c. g. *Tachini corticini* varietates pallidae, nec non *Tachinus suturalis* et *Tachypri* breviores fam. secundae), nec cum ullo alio genere, ob habitum nimis singularem, conjungi poterant, in duò genera peculiariora dirempti sunt, cum, characteribus constantibus, de aliis etiam partibus corporis desumptis, a congeneribus distingui possint. Oxyporos ergo *lunulatum*, *rufipedem*, *chrysomelinum* et affines (Fabr.) ab reliquis, et veris, Oxyporis Fabricianis et cognatis disjunctum, habitu naturalis horum coleopterorum, genera autem Tachypororum et Tachinorum constituentem, me principia systematis artificialis duxerunt, hoc casu systemati naturali contraria. Ista principia postulabant etiam, ut Staphylinum *Ulini* (Rossi), habitu Staphylinis familiae tertiae (imprimis *Staphylini variataribus* maioribus, „elytris castaneis“), simillimum, a caeteris removerem; nec non *Paederum flavipedem* (Knoch), habitu *Lathrobiis* (familiae *Paederorum* Knoch) similem, a *Lathrobiis* et *Paederis*; *Callicerum* autem ab *Aleocharis*, quibus habitu affinis est.

Characteres generum a pluribus corporis partibus mutuavi; haud enim videbam, cur me oportuisset semper unam eandemque partem respicere, nec characteres distinctivos de illa vel de illis partibus desumere, quae hoc illudve genus optime a reliquis distinguebant; simulque, quatenus possibile et conveniens erat, earum partium rationem habui, qui facilius et sine noxa insecti examinari et observari poterant. Haud abnego, characteres, quos instrumenta cibaria praebent, forsàn optimos fore, cum forma eorum, adeo multifaria, semper attamen distincta et in generibus constans esse videatur. Utinam, examen harum partium exiguarum, adeo operosum et a pluribus partibus instituendum, semper sine noxa insecti institui posset, neque

saepius, insectis minimis, plane impossibile esset. *J. C. Fabricius* ipse, pater systematis entomologici, cuius characteres de instrumentis cibariis solis desumpti sunt, ora maiorum solummodo specierum generum ab ipso conditorum examinavit, et de his paucis speciebus, quae saepius pars vix quinquagesima totius generis sunt, huius characteres desumpsit, et reliquas cospecies, secundum habitum totum vel habitationem et modum vitae communes, illis coordinavit. Haec mea sententia, minime vaga est temeraria, rationibus, ut credo sufficientibus, nititur, cum longum per tempus examini characterum, ab oris partibus desumptorum, operam dederim, haud attamen neglectis speciebus minoribus. Imprimis autem veritas illius, quod jam dixi, mihi patebat, cum, inductus certitudine, magnam inter multitudinem horum insectorum, quae collegeram, multas novas species fore, paucis in operibus autorum descriptis, consilium caperem, genera Coleopterorum Micropterorum examinandi. Examine instituto, observationes meas ratione oris partium cum characteribus conferebam, quos *Fabricius* generibus tribus Staphylinorum, Oxyporum et Paederorum attribuerat; ecce, haec disquisitio et haec collatio certiolem me faciebant, patrem ipsum systematis, cuius fundamenta instrumenta cibaria erant, partium multa omisisse, partim species solummodo maximas examinasse. E. g. Staphylinorum character Fabricianus sunt „palpi aequales filiformes;“ num vero palpi Aleochararum et Oxytelorum, quos *Fabricius* generi Staphylinorum inseruit, filiformes? nullo modo, sed a palpis Staphylinorum, cuius generis species mininae vix minores sunt quam species maiores Aleochararum et Oxytelorum, longe diversi. Porro: Oxyporis, secundum *Fabricium*, „palpi posteriores clavati“ sunt; eis autem Tachinos et Tachyporos immiscuit, quorum insectorum maximum haud minimum

Oxyporum, longitudine, aequat, et quorum palpi posteriores, utique a palpis posterioribus Oxyporum diversi, filiformes sunt. Ut brevis sim: Nihil facilius erat, quam, ipsa methodo Fabriciana, e tribus allegatis generibus duplo plura producere, adeo iustrumenta cibaria eorum diversa erant. Cum vero, characteribus genericis, nollem solis partibus oris uti, ob causas supra partim iam expositas, characteres de illis tantum oris partibus desumi, quae facile, in situ eorum naturali et quieto, examinari poterant: Palpi fere semper prominent, et cum praeterea, tam numero quam forma articulorum, praecipue ultimi, satis invicem differant, nullarum aliarum oris partium, quam palporum, characteribus generum distinctivis, rationem habui, quamquam non omittam, descriptionibus necessaria de instrumentis cibaribus, quatenus ea examinare potui, inserere 1).

1) Examen partium oris in genere haud res facillima est, uti jam aliis locis ostendi. Palpi quidem facilius observari possunt, quam ulla alia oris pars, cum satis promineant, examen autem eorum nihilominus diligentiam et attentum oculum postulat. Fabricius vel in numero ipso palporum interdum erravit: Cychris, in Entomologia Systematica, quatuor tantummodo palpos tribuit, cum attamen sex palpis distinctis instructi sint, quod etiam in recentissimo opere (Joh. Christ. Fabricii etc. Systema Eleutheratorum etc. Tomus I Kiliae 1801) correxit. Characteribus classis Ulonatorum addidit „os palpis quatuor;“ Forficulae auriculariae autem palpi sunt sex aequae distincti, ac Cicindelae, Cavabae etc. e classe Eleutheratorum. Hi errores certo inde orti sunt, quod palpus interior (seu palpus anterior Fabr.) individuo, quod examinabatur, arte dorso maxillae adhaeret, et primo intuitu, pro ipso dorso maxillae haberetur. Propria experientia me docuit, hunc situm nimis facile decipere posse. Forsan autem Fabricius Forficulam auriculariam nequidem examinavit, et a reliquis Ulonatorum generibus, omnino, quotquot illorum examinavi, palpis modo quatuor instructis, characteres huius classis mutavit. — Contra, aliquid pro palpo interiore haberi potest, quod nihil aliud est, quam processus maxillae.

Cum segregarem et describerem species generis alicuius, omnia in eo posita esse credebam, quid sit *essentiale* quid *fortuitum*. Illud sunt characteres constantes, hoc autem inconstans est, nec in characteribus distinctivis speciei vel generis respicitur, sed tantummodo in subspecierum vel varietatum descriptione. Quid sit *essentiale*, quid *fortuitum*, experientia, collatio et analogia docent. Proportio, forma, sculptura, color partium, quibusdam speciebus *essentiales* esse possunt, quibusdam *fortuiti*. — Quod attinet ad *proportionem*, sunt genera, quorum speciebus, caput, sine exceptione, thorace minus est (e. g. Tachinis); e contrario, quorundam generum speciebus, caput thorace vel minus vel maius, vel ejus magnitudine est (e. G. Staphylinis); inmo sunt species, quarum individua, proportionem capitis ad thoracem, adeo differunt, ut caput quibusdam thorace maius, quibusdam thorace minus, quibusdam thoracis magnitudine sit (e. g. Oxyporis et pluribus Staphylinorum atque Oxytelorum speciebus) 2). Proportio capitis ad thoracem illis ergo *essentialis*, his autem *fortuita* est. Longitudo etiam relativa antennarum variat in individuis quarundam specierum (e. g. Staph. *nitidi*, Aleoch. *Boleti*) 3). — *Forma* partium jam minus variabilis est; sunt attamen species, quibus e. g. thorax vel transversus est vel orbiculatus (e. g. Aleoch. *Boleti*), vel cornutus vel inermis (e. g. Oxyt. *tricorni*); caput vel cornutum vel inerme (e. g. Oxytel. *tricorni*, *cornuto*). — *Sculptura*, in ge-

lae. Chrysomelae saltem et Galerucae, quas examinavi, numquam palpos sex habebant, sed proecessus maxillae exterior palpo similis erat. — Confer quae infra de hoc processu maxillae monebo (§. 6: not. 2).

2) Confer §. 4.

3) Confer §. 5. not. I.

nerere, characteres praebet bonos, imprimis si partes sulcatae sunt. Puncta, numero, ordine et crassitie vel subtilitate, saepius variant; observationes attamen et collationes repetitae probaverunt, numerum atque ordinem punctorum in seriebus thoracis Staphylinorum familiae tertiae, speciebus perpaucis exceptis, constantissimos esse. — *Color* etiam multis speciebus variabilis est (e. g. Staph. *nitido*, *alternanti*, Aleoch. *Boleti*, *nanas*, Tachino *melanocephalo* &c.). — *Magnitudo* autem variabilissima, et ne duobus quidem ejusdem speciei individuis eadem esse solet. Rarissime attamen individua reperiuntur duplo maiora minimo eiusdem speciei (e. g. St. *nitido*, Al. *Boleti*, Tachino *melanocephalo*).

In *diagnosi* speciei character sive characteres dantur, quibus ab omnibus cospeciebus, absolute, i. e. sine collatione cum aliis, se distinguit. — Quales sunt ergo characteres, quos *diagnosis* postulat? Tales, qui omnibus speciei individuis communes sunt, nec conjunctim (si nempe pluribus opus sit) ulli cospeciei tribui possunt. Nemo negabit, characteres optimos illos fore, qui, secundum analogiam, *essentiales*, i. e. talibus partibus et proprietatibus nixi sunt, quae quidem in speciebus, nec vero in individuis ejusdem speciei, variant, et quam distinctissime verbis exprimi possunt, respectu scilicet numeri, loci, situs, directionis &c. (e. g. *Oxyt. caelatus*, „thorace longitudinaliter quadri-, foveolato, foveis duabus mediis arcuatis.“ Nulli cospeciei *Oxyt. caelati* thorax est, „foveis quatuor longitudinalibus, mediis arcuatis,“ sed omnibus reliquis *Oxytelis* hae foveae, numero vel directione, differunt). Felices, si *diagnoses* omnes aequae distinctas dare possemus! sed, eheu, hoc nobis in paucissimis tantummodo concessum est. Plerumque necessitas exigebat ut colorem et formam partium consulerem, colorem, cuius mi-

sturas adeo multiplices, formam, cuius species sensim sensimque variantes, distincte et paucis verbis exprimere, nulla certe totius mundi lingua satis locuples erit. Sed, his omissis, mihi adhuc gratularer, si diagnosi semper characteres eruere potuissem, qui omnibus speciei individuis communes fuissent, simulque speciem ab omnibus conspeciebus sufficienter distinxissent; hic autem haeret aqua, et quibusdam vel hoc mihi impossibile erat, atque nihil aliud reliquum; quam ad descriptiones sequentes longiores et varietates delegare 4), (e. g. *Al. Boleti*, quarum specimina non solum colore, sed proportione etiam et forma quarundam partium, v. c. thoracis et antennarum, variant):

Quia hactenus de modo, species describendi et diagnosi concipiendi actum est, mihi etiam liceat lectoribus regulas proponere, quas, receptu specierum vel varietatum, secutus sum: Insectum, quod de omnibus reliquis, caractere essentiali, decedebat, haud haesitabam, pro specie ab illis diversa habere. Character unicus adventitius, vel pars talium characterum speciminis singuli nondum sufficiebant ad condendam novam spe-

- 4) Haud superfluum existimo, hic adnotare, diagnoses specierum electos tantummodo characterum, quos erui, continere: Cuique, qui insectum in hac monographia investigare studet, haud verba diagnosis sufficiant, si quod investigavit invenisse credat, sed insectum cum descriptione sequente fusiore comparandum et, ratione habitus, staturae, partium formae etc. cum quovis alio insecto, ad quod delegatum erit, conferendum est; contingere enim potest, et verisimile saepius continget, ut insecto caeteris paribus, character adhuc essentialis inhaereat, cuius nec in diagnosi, nec in descriptione mentio facta est, quod autem suffieiet, insectum pro specie, in hanc monographiam haud recepta, habere. Dixi, me credere, hoc saepius contingere posse; generibus enim coleopterorum micropterorum hactenus tam parum cultis, et speciebus novis adeo multis in solo ducatu Brunsvicensi repertis, persuadeo mihi, in aliis etiam terris multas novas, nondum in systema receptas species latere.



ciem, imprimis, si variabilitas harum characterum in genere haud rara erat: Differentiam solam coloris unius partis, multoque minus differentiam solam magnitudinis, vel habitationem, unius individui, haud respiciebam. Characteres distinctivi, in genere quidem adventitii, pluribus autem omnibusve speciminibus constantes, existimabam sufficientes ad novam speciem eondendam. Nemini autem, ut credo, iniustus vel temerarius esse videbor, duo vel plura individua, characteribus, plerumque essentialibus, differentia, sub unam speciem redigens, si, serie speciminum intermediorum, quibus hi characteres progressive variabant, invicem, aliud in alterum, transibant.

*Scripta auctorum*, quae saepius, verbis abbreviatis, allegavi, sunt, ordine alphabetico, sequentia;

1. *De Geer Mem.*

Memoires pour servir à l'histoire des Insectes, par M. le Baron Charles De Geer. Tome IV. 1774 à Stockholm. 4. (Premier Memoire: Des *Staphylins*.)

2. *Creutzer Ent. Vers.*

Christian Creutzer Entomologische Versuche. Wien 1799. 8. (*Staphylinus* pag. 128.)

3. *Fabr. Ent. Syst.*

Joh. Christ. Fabricii &c. Entomologia Systematica emendata et aucta &c. Tom. I. Pars. II. Hafniae 1792. 8. (*Staphylinus* p. 519. *Oxyporus* p. 531. *Paederus* p. 536.)

4. *Fabr. Ent. Syst. Supl.*

Joh. Christ. Fabricii &c. Supplementum Entomologiae Systematicae. Hafniae 1798. 8. (*Staphylinus* p. 180. *Oxyporus* p. 181.)

5. *Fabr. Mant.*

Joh. Christ. Fabricii &c. Mantissa Insectorum &c. Tom. 1

Hafniae 1787. 8. (Eleuterata, gen. 87. *Staphylinus*, gen. 88. *Oxyporus*, gen. 89. *Paederus*.)

6. *Fabr. Spec. Ins.*

*Joh. Christ. Fabricii* &c. Species Insectorum &c. Tom. I. Hamburgi et Kilonii 1781. 8. (*Staphylinus* p. 334. *Oxyporus* p. 338. *Paederus* p. 339.)

7. *Fabr. Syst. Ent.*

*Joh. Christ. Fabricii* &c. Systema Entomologiae &c. Flensburgi et Lipsiae 1775. 8. (*Staphylinus* p. 264. *Oxyporus* p. 267. *Paederus* p. 268.)

8. *Fabr. Fn. Groenl.*

*Otho Fabricius* Fauna Groenlandica &c. Hafniae et Lipsiae 1780.

9. *Fourcr. Ent. Par.*

Entomologia Parisiensis, sive Catalogus Insectorum quae in Agro Parisiensi &c. &c. edente *A. F. Fourcroy* &c. Pars prima. Parisiis 1785. 8. min. (*Staphylinus* n.)

10. *Fuesslin. Helv.*

*Joh. Casp. Fuesslin* Verzeichniss der ihm bekannten Schweitzerischen Insekten. Zürich und Winterthur 1775. 4. maj. (*Staphylinus*.)

11. *Geoffr. Hist.*

Histoire abrégée des Insectes par *M. Geoffroy*. Tome I. à Paris 1764. 4. (*Staphylinus* p. 359.)

12. *Götze Beitr.*

Entomologische Beiträge zu des Ritters Linné zwölften Ausgabe des Natursystems von *Joh. Aug. Ephraim Götze*. Erster Theil. Leipzig 1777. 8. (*Staphylinus* p. 730.)

13. *Linn. Fn. Suec.*

*Caroli Linnaei* &c. *Fauna Suecica* &c. *Stockholmiae* 1761. 8.  
(*Staphylinus* p. 230.)

14. *Müll. Zool. Dan. Fr.*

*O. Fr. Müller* *zoologiae Danicae Prodrömus* &c. *Havniae*  
1776. 8.

15. *Olivier Ent.*

*Entomologie ou Histoire naturelle des Insectes* &c. par *M Olivier*. *Coleoptères*. Tome III. à *Paris* 1795. 4. maj. (*Staphylinus* gen. 42. *Oxyperus* gen. 43. *Paederus* gen. 44.)

16. *Payk. Fn. Suec.*

*Gustavi Paykull* *Fauna Suecica*. Tomus III. *Upsaliae* 1800.  
8. (*Staphylinus* p. 368. *Oxyperus* p. 425. *Paederus* p. 427. *Stenus* p. 433.)

17. *Payk. Mon. Car. Ap.*

*Monographia Caraborum Sueciae a Gustavo de Paykull*. *Upsaliae* 1790. 8. — *Appendix Staphylinorum* p. 134.

18. *Payk. Mon. St.*

*Monographia Staphylinorum Sueciae a Gustavo de Paykull*.  
*Upsaliae* 1789. 8.

19. *Panzer Fn. Germ.*

*Faunae Insectorum Germaniae Initia*. — *Deutschlands Insecten*, herausgegeben von *Dr. G. W. F. Panzer*, 1 — 84 Hefte,  
*Nürnberg* 1796 — 1801. 8. min. (*Staphylinus*, *Oxyperus*, *Paederus*.)

20. *Pontopp. Dan.*

*Erich Pontoppidan*s kurzgefasste Nachrichten, die Naturhistorie in Dänemark betreffend. Aus dem Dänischen übersetzt  
*Kopenhagen und Hamburg* 1765. fol. min. (p. 211.)

21. *Rossi Fn. Etr.*

Fauna Etrusca, sistens Insecta, quae in provinciis Florentina et Pisana praesertim collegit *Petrus Rossius* &c. iterum edita a Dr. *J. C. L. Hellwig*, &c. Tomus I. Helmstadii 1795. 8. (*Staphylinus*, gen. 87. *Oxyporus*, gen. 88. *Paederus*, gen. 89.)

22. *Schaller Act. Hall.*

Abhandlungen der Hallischen naturforschenden Gesellschaft. Erster Band. Dessau und Leipzig 1783. 8. (p. 324.)

23. *Schrank Austr.*

*Francisci de Paula Schrank* Enumeratio Insectorum Austriae indigenorum, Augustae Vindobonae, 1781. 8. (*Staphylinus* p. 229.)

24. *Schrank in Fuessl. M.*

*Fuessly*, Neues Magazin &c. B. II. Zürich 1785. 8. p. 324 — *Schrank*, Verzeichniss der Berchtesgadischen Insekten p. 313.

25. *Schrank Boica.*

Fauna Boica, — Durchgedachte Geschichte der in Baiern einheimischen und zahmen Thiere von *Franz von Paula Schrank*. Erster Band, Nürnberg 1798. 8. (*Staphylinus*, p. 639. *Oxyporus*, p. 651. *Paederus* p. 651.)

26. *Scop. Carn.*

*Joh. Ant. Scopoli* Entomologia Carniolica, Vindobonae 1763. 8. (*Staphylinus* p. 99.)

## §. 3.

## De corpore atque habitu Coleopterorum Micropterorum.

*Corpus* insectorum, quae huc relata sunt, statura est magis minusve procera; maxime *Lathrobiis*, *Paederis*, *Aleocharae elongatulae* et similibus, *Tachyporo dissimili*, *Staphylinis* fami-

liae ultimae; minus reliquis Staphylinis, Aleocharis, Oxyporis, Callicero, Stenis et Tachinis familiae secundae. Corpus breve latiusculum Tachinis est familiae primae, Tachyporis familiae secundae, Omaliis, Oxytelis et Anthophagis. Forma etiam propria partium singularium, nec non coniunctio et proportio mutua earum habitum externum cominutant. Corpus Tachinorum, Tachypororum et Aleochararum famil. secundae et tertiae, plurimis continuum est, incisuris vel partium latitudine inaequali haud interruptum, partibus scilicet invicem arte coniunctis, bene insertis atque accommodatis, quod iam in reliquis generibus rarius obvenit. Paederis praesertim et Stenis, capitibus magnis, thorace latioribus, orbiculatis. thorace rotundato, coleoptris angustiore, et nexu soluto harum partium, habitus est singularis, de habitu cogenerum longe decedens. Capitis, thoracis, coleoptrorum et abdominis latitudo ubique aequalis, Staphylinis familiae ultimae et Lathrobiis, corpus autem latiusculum planiusculum Oxytelis et Omaliis, propria sunt. Thorax et coleoptra Tachypororum et plurimorum e familia prima Tachinorum (c. g. *Tachyp. humeralis*, *marginelli*) coniunctim unum fornicem exhibent continuum. — De generum et specierum proprietatibus et differentiis reliquis locis apertis exponetur. Quod autem omnibus Coleopteris Micropteris commune est, atque eis habitum externum dat peculiarem, et unde nomen eorum ortum est, coleoptra sunt dimidiata, de quibus infra.

Corpus, vel ubique, vel quibusdam solummodo partibus, vestitum solet esse pilis, vel confertis vel rarissimis, vel brevibus vel longis, vel lanuginosis vel setosis, vel mollibus vel rigidis &c. — Corpus quorundam *Staphylinorum* lana densa vesti-

tum est (e. g. *St. hirti*). Multis coleoptra pilis brevibus rigidis, vel erectis vel depressis, obsita sunt (e. g. *St. plurimis* familiae *tertiac*, v. c. *St. splendenti*, *acneo*), saepius sericantibus (e. g. *St. micanti*, *sericeo*). Pili, pari modo sericantes, saepius autem adeo subtiles, ut nitore tantummodo sericante fugaci se prodant, sunt etiam interdum in abdomine, rarissime in capite atque thorace (e. g. *St. micantis* et *albipedis*). Insuper, quaedam huius generis coleoptera, partibus vel locis singulis, pilis coloratis tenuibus ornata sunt (e. g. *St. erythropterus*, *castanopterus*, *pubescens*). Vestimenta autem haec pilosa vel lanuginosa, causis varii generis, aetate, frictione &c. magis minusve deteri possunt; et haud raro individua specierum alias pilosarum vel lanuginosarum, nuda occurrunt. Pili attamen breves rigidi, quibus coleoptra *Staphylinorum* plurium, margine inferiore, fimbriata esse solent, huic detrimento minus obnoxii sunt. — In genere *Aleochararum* varietas pilorum haud aequae magna est. *Plurimis*, sicut etiam *Calliervo*, ad margines tantum segmentorum pili sunt rigidi et rari. Quaedam, abdomine, rarius superficie tota corporis, pilis brevissimis tenuissimis sericantibus, non nisi oculo bene armato conspicuis, vestitae sunt. *Al. lanuginosa* lanugine tenui tecta est, oculo autem nudo vix conspicua. — *Lathrobia* atque *Paederis* abdomen habent pilis rarioribus singulis rigidis tectum; reliquae corporis partes omnino fere depiles sunt, *Paederis* attamen *ripario* atque *littorali* exceptis, ubique pilis numerosis rigidis singulis vestitis. — *Tachyporis* et *Tachinis* caput thorax et coleoptra plane sunt depilia; abdomen vero ubique, praecipue tamen ad margines segmentorum, setis valde longis, rigidis, numerosis, singulis, obsitum. — *Omaliis*, *Anthophagis*, *Oxytelis*, *Oxyporis* et *Stenis* corpus est prorsum depile.

## §. 4.

## De capite.

De partibus singulis horum insectorum ea modo narrabo, quae ad haec sola genera spectant; quae enim omnibus insectis, vel omnibus coleopteris, communia sunt, jam satis cognita pono 1).

*Capita* id commune habent, ut supra plus minusve convexa, infra autem semper plana sint, quod vel de iis insectis valet, quibus caput plane globosum esse videtur (e. g. *Aleocharis* plurimis familiae primae). — *Forma* capitum multiplex est. Basi plerumque sunt obtusa, angulis rotundatis; rotundata illis tantum, quorum thorax apice itidem est rotundatus; his caput et thorax solutius coniuncti sunt (e. g. *Al.* minoribus familiae primae, *Paedero orbiculato* &c.) *Capita* porro sunt vel longitudine latitudinis, vel latitudine longiora (oblonga), vel longitudine latiora (transversa); haec praecipue *St. maxilloso* et speciminibus quibusdam *St. aenei*, nec non *Oxytelis piceo* atque *carinato*, „capitibus maioribus“ caeteroquin autem rariora. Caput orbiculatum *Tachinorum* et *Aleochararum* transversum esse videtur, cum plerumque magnam partem sub thoracem retractum sit. Capite oblongo plures praeditae sunt species e familiis tertia et quarta Sta-

I) De partibus coleopterorum vide, inter alia multa: „Neue Beyträge zur Insectenkunde von A. W. Knoch. Erster Theil. Leipzig 1801. 3. Einleitung „p. 19 et 59.“ — Anatomicen *Staph. erythropteri*, et delineationem atque descriptionem partium ejus singularum vide in „Deutschlands Insectenfauna etc. für das Jahr 1795 von Georg Wolfgang Franz Panzer, Nürnberg 8. min. (Maxillae autem (f. 3\* et f. 4\*) labium (f. 13) et ultimus antennarum articulus prave delineati sunt).

phylinorum, Lathrobia, Tachini *lunulatus*, *melanocephalus* &c. De hac forma capitis oblonga haec autem notanda sunt: Caput vel ovatum est, lateribus rotundatis, angulis basis obtusis (e. g. Staphylinis huc referendis familiae tertiae et Lathrobiis); vel basi latius, angulis obtusis, apicem versus sensim angustatum (e. g. Staphylinis huc referendis familiae quartae et Tachinis *lunulato*, *atricapillo* &c.). Capitibus longitudine latitudinis latera vel sunt rotundata, quo formam induunt orbicularem (capita orbiculata) e. g. Staphylinis caeteris familiae tertiae, Aleocharis, Paederis &c.; vel recta, quo magis formam quadrati induunt (capita quadrata) e. g. Staphylinis plurimis familiae secundae et ultimis familiae quartae. — Notandum est, in quibusdam speciebus familiae tertiae Staphylinorum differentiam capitis orbiculati et ovati haud satis constantem et definitam esse, ita, ut, in characteribus harum specierum distinctivis, ratio eius haberi posset tanquam characteris essentialis. Habeant enim quaedam caput semper orbiculatum (ut *St. splendens*, *aeneus* &c.) quaedam caput semper ovatum (ut *St. politus*, *decorus* &c.), species attamen nonnullae sunt intermediae, quarum capita, speciminibus his, eodem iure ad capita orbiculata referemus, quo, illis, ad capita ovata referimus; haec observamus praecipue in *St. nitido*, *variante*, *sanguinolento*. — Capitis *magnitudo* cum thorace collata, de hac enim sola agitur, valde diversa est; Staphylinis primae secundae et quartae familiae, Paederis, Oxytelis, Oxyporis et Stenidis caput est circiter thoracis magnitudine; Staphylinis plurimis familiae tertiae, Aleocharis, Lathrobiis, Omaliis, Tachinis et Tachyporis thorace minus; minimum autem Aleocharis tertiae, Tachyporis secundae et Tachinis primae familiae. Quae autem de magnitudine capitum protuli summatim tantummodo valent. Nulla forsan pars corporis horum insectorum, ratione magnitu-



dinis cum aliis partibus collatae, adeo variabilis est quam caput. Plurimae specierum, de quibus modo dixi, caput eis esse magnitudine circiter thoracis, pervariabiles sunt, et inter copiam maiorem speciminum quaedam occurrunt capitè paulo latiore, quaedam capite paulo angustiore quam thorax; quaedam capite thoracis magnitudinae. Hanc varietatem praecipue tamen in Oxyporis et quibusdam Oxytelis (e. g. *Oxyt. carinato*, *morsitante*, *caelato*) observavi, ubi perinsignis est 2). Individuis, capitibus maioribus, instrumenta etiam cibaria maiora et validiora erant quam reliquis. — Eandem variabilem capitis magnitudinem in caeteris quoque Micropteroꝝ speciebus observavi, ipsis in illis, quae capitibus minimis praeditae sunt (e. g. in Tachinis); his autem rarius eam attendimus, cum caput semper sub thoracem latum, convexum, capite multo maiorem retractum sit, et eum nunquam, parte tertia magnitudinis, aequet. Quo maius autem caput est, eo magis prosilit, quia sub thorace minore

2) An haec varietas magnitudinis relativae capitis in una eademque specie ad differentiam sexualem respiciat, non audeo diiudicare. Idem autem incrementum sensui auctum, idemque transitus progressivus ab extremo ad extremum, quos aliis etiam partibus (e. g. antennis et tarsis, de quibus infra exponetur), longitudinem et crassitiam earum comparans, vidi, me non fugerunt. Ponatur ergo, habet differentiam partium cum differentia sexuali in consensu esse, de magnitudine earum gradatim decrescente argumentari licebit, vim stirpem procreandi individuis quibusdam perfectiorem, quibusdam debiliorem esse. Non nisi his par horum coleopterorum, et quidem *Aleocharae Boleti*, cuius individua, ratione antennarum et thoracis formae adeo variant, et *Steni flavipedis*, in copula cepi; ambobus autem mas et femina, colore, partium forma, et magnitudine comparativa, plane congruebant. — Hae differentiae cum nequidem sufficiant ad discernendum marem a femina, uti e praecedentibus mihi persuasum habeo, multo ergo minus characteres praebent duarum vel plurium specierum, speciminibus, uti iam dixi, aliud in aliud transeuntibus.

non abscondi potest; et caput hoc prosiliens insecto dat habitum singularem, quo a cacteris, capite parvo retracto, omnino decedere videtur, et quidem eo magis, si caput basi, thorax apice, rotundati sunt atque collo tenuissimo tantum cohaerent (e. g. *Paedero orbiculato* et plurimis Aleochararum minorum familiae primae). Microptera, quibus caput est minutum, sub thorace absconditum, superne adspecta, capite omnino carere videntur; quod attamen de mortuis solummodo valet, viva enim et se moventia caput protendant.

Quod ad *superficiem* capitis, varietas rugarum, punctorum &c. in his generibus magna est. Rarissime caput est prorsum laeve, nitidum et glabrum (e. g. Tachinis familiae secundae et Tachyporis), in minimis enim Aleocharis ipsis familiae primae, et Oxyporis, aliquid, rugis vel foveolis simile, inter antennis et interdum etiam pone oculos, deprehendimus, capite reliquo valde glabro et nitido. — Omnibus Staphylinis familiae tertiae et quartae et *St. maxilloso*, nec non *Paed. ripario*, *littorali* et *bicolori*, caput medio laevissimum, nitidissimum, lateribus autem, imprimis in angulis pone oculos, punctis pluribus vel paucioribus, crassioribus vel subtilioribus, impressum est. Staphylinorum reliquorum et Lathrobiorum capita ubique punctis impressis obsita sunt, punctis autem multo crebrioribus, subtilioribus et confertioribus, quam in Staphylinorum familiis tertia et quarta. *Stenis* caput est crassissime punctum; Aleocharis autem familiarum secundae ad quintam, Tachinis familiae primae, *Paed. orbiculato* et *angustato*, omnium certo subtilissime, ita ut puncta, ope tantum microscopii bene augentis, videri possint. — *Rugas* capitis in his insectis, quorum modo mentionem feci, haud facile deprehendimus, si vero adsunt, saltem perexiguae et plerumque inter antennis sitae sunt. Eo magis capita Oxytelorum,

Omaliorum, Anthophagorum, rugis sulcata sunt, quarum tres vel duae longitudinales distinctae inter antennis sitae sunt. Oxytelis *cornuto* et *tricorni* id praeterea proprium est, ut caput quorundam speciminum (verisimile maris) cornutum sit, cornubus scilicet duobus porrectis acutis inter antennis ante oculos positus; plurimis vero speciminibus (verisimile feminis) haec arma desunt 3).

Pars capitis anterior, quae, sutura transversali inter antennis, terminata esse solet, et *clypeus* nominatur, plurimis huc relatis insectis, brevis et lata est; longior vero et angustior Tachinis, ita ut caput, apicem versus, sensim angustetur; vel emarginata (e. g. Oxytelis et Oxyporis), vel, idque plurimum, integra.

Oculi, ad latera capitis siti, in variis generibus et speciebus varii etiam sunt; raro exacte orbiculati, plerumque forma irregulari vel magis minusve ovata; Staphylinis plurimis planiusculi parvi immersi (exceptis Staphyl. *tristi*, *boope*, *attenuato*, quorum oculi magni planiusculi sunt) imprimis familiae quartae, porro Lathrobiis, Oxytelis, nonnullis Aleocharis (e. g. *Al. ruficorni*, *lucidae*, *canaliculatae*, *cinnamomeae*, *depressae* &c.), Tachinis familiae secundae, Tachyporis. Oculi Paederorum illis Staphylinorum simillimi sunt, nisi quod paulo magis prosilient. Oxyporis oculi sunt parvi prosilientes; minus prosilientes Callicero; magni, planiusculi Tachinis familiae primae, nonnullis Aleocharis (e. g. *Al. fuscipedi*, *acutae* &c.) Staphylinis *tristi*, *attenuato* et *boopi*; modici, semiglobosi, Anthophagis et Omaliis; Stenis autem maximi et valde prosilientes.

3) De consensu capitis et thoracis, ratione irregularitatum v. S. 8. not. I.

## §. 5.

## De antennis.

Ante oculos *antennae* positae sunt, membra, in variis generibus et speciebus haud minus, et forsitan magis, varia et variabilia, quam aliae corporis partes. Constant ex undecim *articulis* et *bulbo*, seu basi vel radice totius antennae, qui, instar articuli exigui atque globosi (et strictissime nihil aliud etiam est, quam articulus primus antennae duodecimarticulatae) maximam partem in capite est absconditus, ita ut vix in speciebus maximis, multo ergo minus in minoribus vel minimis, videri possit. — *Articulus primus* plerumque longissimus est; vix vel paulo tantum articulo ultimo longior Paederis, Oxytelis, Aleocharis, Tachinis, Tachyporis, Anthophagis et Omaliis; longus et validus Staphylinis familiae quartae; Lathrobio *fracticorni* longissimus, longitudine scilicet tertiae partis totius antennae; Callicero autem brevissimus, longitudine tertiae partis articuli ultimi. Quam brevis autem sit vel quam longus, forma attamen semper magis minusve elongata (longitudine latitudinem superante), clavata, subincurva est, quae, articulo longiori, procerior, articulo breviori, minus procera esse solet. Semper etiam firmior est articulo secundo, imprimis Oxytelis; crassior autem, ullo reliquorum articulorum, illis, quibus antennae filiformes sunt (e. g. Anthophagis) vel extrorsum paulo tantum crassiores (e. g. Tachinis, Tachyporis, quibusdam Staphylinis &c.) vel extrorsum tenuiores (e. g. Staph. *olenti*, *morioni* &c.); illis autem speciebus, quarum antennae, medio vel extrorsum, multo sunt crassiores, quidam articulorum mediorum primum latitudine omnino praestant (e. g. Oxyporis, Oxytelis, nonnullis Aleocharis atque Staphylinis, praecipue Staph. *maxilloso*). — *Articulus secundus* plo-

rumque *tertio* brevior est, raro autem, in unico scilicet solummodo genere Stenorum, haec differentia magna est, et in Lathrobiis, Anthophagis, Tachinis et Callicero vix locum habet; immo quibusdam articulus hic secundus tertio longior et crassior esse videtur, (e. g. *Al. impressae, sulcatae, gagati*, Staph. *elongato, ochraceo, Oxytelo tricorni* &c.). Articuli secundus et tertius clavati sunt, saepius autem perbreves (e. g. Callicero) et interdum fere globosi (e. g. Oxyporis).

Respectu *formae*, antennae sunt vel ubique eiusdem crassitiei (filiformes) vel extrorsum crassiores aut graciliores. Haec differentia dependet a forma *articulorum mediorum*, eorumque mutua proportione: Cum autem articuli latiores vel transversi magis minusve compressi sint, ideoque, certo situ, multo angustiores appareant, idem etiam de antennis, quae ex articulis latis compositae sunt, valet, et eadem antennae, hoc situ multo crassiores, illo autem multo graciliores esse videntur. Articuli medii, seu articuli inter tertium et ultimum siti, vel sunt *campanulati*, vel *pateraeformes*. Ambobus illud est commune, ut apice truncati, basin versus angustati, et basi ipsa rotundati sint; differunt autem eo, ut campanulati latitudine longitudinem haud praestent, pateraeformes autem longitudine sint latiores. Singuli articuli medio apicis articuli praecedentis infixi sunt, basi in stylum brevem terminata, qui vero adeo exiguus est, ut vix cerni possit, praecipue articulis latis antennarum valde brevium et crassarum. Antennis filiformibus articuli medii nunquam pateraeformes sunt, sed campanulati, et vel invicem aequales (e. g. Staph. *simili, aeneocephalo, splendenti* &c. Lathrobiis) vel longitudine decrescentes (e. g. Anthophagis et quibusdam Tachinis atque Tachyporis). Antennis, apicem versus gracilioribus, articuli medii itidem sunt campanulati, nunquam pateraeformes,

et sensim longitudine et latitudine decrescunt (e. g. *St. olenti*, *cyaneo*, *morioni*). Antennis autem extrorsum crassioribus distinguendum est, an sensim crescant, vel apice tantum crassiores, medio autem filiformes, sint: Hoc in Stenorum genere vidimus, quibus articuli antennarum primus et secundus clavati sunt, tertius pergracilis et perlongus, reliqui, inter tertium et sextum, graciles, longitudine vero decrescentes, septimus et octavus latiores atque campanulati, nonus et decimus campanulati, praecedentibus multo latiores, ultimus orbiculatus, latitudine praecedentis. Antennae apicem versus sensim crassiores frequentissimae sunt; graduum autem, quibus haec crassities vel crescit vel decrescit, totidem fere sunt, quot existunt species insectorum huc spectantium. In genere obtinet haec regula: „Articuli „medii sensim latitudine crescunt, ita ut quartus et quintus, interdum etiam sextus, campanulati, saepe subglobosi,“ (*Aleochnanae* fere pateraeformes) „sequentes autem semper pateraeformes sint, et quidem nonus latior, quam ullus reliquorum.“ Ab hac regula exceptae sunt antennae Calliceri, quarum articulus decimus cylindrico-campanulatus est, et triplo longior ullo reliquorum articulorum mediorum pateraeformium, qui, longitudine, aequales sunt. Quo breviores et latiores antennae sunt, eo latiores et paterae similiores articulos etiam singulos esse oportet, (confer antennae *St. maxillosi*, *Oxypororum*, *Aleochnanae*, *lucidae*, *fuscipedis*, *fumatae* &c.) Interdum antennarum pars media basi parum crescit, apicem versus autem multo citius (e. g. *Oxytelis*, quorum articuli antennarum quartus ad septimum campanulati, octavus autem nonus et decimus pateraeformes sunt). Caeterum mihi liceat adnotare, haec, quae de articulis mediis dixi, generalissima tantummodo esse, si enim in unaquaque levi varietate commemorari vellein, mox in nimiam

verbositatem inciderem, praesertim his partibus antennarum, forma adeo variantibus et inconstantibus, ut saepius unius eiusdemque speciei individuis quibusdam campanulatae, quibusdam autem pateraciformes sint (e. g. *Staph. nitidi*, *Al. Boleti* &c.).

Forma, in variis generibus et speciebus multiplici quidem, constantiore autem, ideoque maioris momenti est *articulus ultimus*, seu undecimus. Praecipue in genere *Calliceri* insignis est, cylindricus nempe et praelongus; longitudine triplo superat articulum primum, longiorem artamen ullo reliquorum, penultimo excepto, et paulo adhuc crassior est. In reliquis autem generibus hic articulus nunquam longissimus simulque validissimus est. Quod ad collationem eius cum articulo primo, vide quae initio huius § dixi; si autem circiter articuli primi longitudine est, crassitie etiam ei non cedit. Latior articulo medio latissimo fere nunquam est et solo *Paedero angustato* articulos medios singulos hoc respectu superat; alias, antennis vel extrorsum crassioribus, ad summum latitudine articuli penultimi est. — *Forma* eius plerumque ovata est, apice acuto, interdum formae globosae propior, apice acuto (e. g. *Oxytelis*, *Stenis*); vel brevis, subcampanulata, apice oblique seu parabolice truncato, quae solis *Staphylinis* familiarum trium primarum propria est. *Staphylinis* artamen quibusdam e familia tertia, illis praecipue, qui, ratione formae thoracis, jam reliquis e familia quarta affines sunt, haec articuli ultimi antennarum forma magis minusve submutatur, et in subovatam, apice vel rotundato - obtuso vel subacuto transit. Cavendum autem est, ne error obveniat: Cum enim hic articulus, si latior est, apicem versus compressus sit, forma ejus, a variis partibus visa, varia etiam est, a duabus scilicet brevis, apice oblique truncato, a duabus autem ovata,

apice acuto; ego semper latitudinem maximam respexi. Id, quod monendum erat, quo errores et contradictiones evitarentur.

*Longitudo* antennarum, cum aliis corporis partibus collata, non solum in speciebus, sed in ipsis speciei unius eiusdemque speciminibus, acque variabilis et multiplex est, ac earum crassities 1), quod praesertim in *Aleochara Boleti* et *Staph. nitido*, observavi,

- 1) Quibusdam Coleopterorum Macropterorum speciebus longitudinem et crassitiam antennarum maiorem vel minorem characterem distinctivum sexus sistere fertur (e. g. *Cerambycibus*) et quibusdam veritas huius opinionis experientia quotidiana probatur: e. g. *Melolontha vulgari*, cuius individua, „lamellis antennarum „maioribus,“ quod omnes scimus, mares, „lamellis antennarum minoribus,“ feminae sunt). Dubito, an idem de illis Coleopterorum Micropterorum speciebus statuendum sit; quarum individua antennis longioribus tenuioribusque et brevioribus crassioribusque variant. De antennis *Aleochar. Boleti* et *Staph. nitidi*, quorum magnam speciminum copiam legi, affirmare saltem possum, eas seorsim, tam longitudine quam crassitie, decrescere, sexus ergo differentiam haud distinetam et, certa longitudine vel crassitie, definitam exhibere, quod eo maiore fiducia asserere audeo, cum ipse par *Aleochar. Boleti*, copula iunctum, preslenderim, quo autem nullam, ne minimam quidem, differentiam externam inter marem et feminam observo — Hac occasione aliam adhuc notam addere mihi liceat: Quibusdam Coleopterorum Macropterorum speciebus latitudinem tarsorum anticorum maiorem vel minorem differentiae sexuali respondere ferunt. Sunt etiam species Coleopterorum Micropterorum, nominatim Staphylinorum familiae tertiae, quarum individua tarsi anticis dilatatis et gracilibus variant. Omnino non credo, hanc differentiam ad differentiam sexus respicere (vide §. IO. not. 2); nullo modo autem antennarum longitudo et crassitudo, una cum tarsorum anticorum latitudine vel gracilitate, ad differentiam sexualem respiciunt, cum inter antennis et tarsos, illo respectu, plane nullus consensus sit, et proportio eorum mutua nullis firmis et certis regulis respondeat: E. g. *Staph. nitidi* individua occurrunt vel, „antennis brevibus crassis, tarsi anticis „dilatatis,“ vel „antennis longis gracilibus, tarsi anticis gracilibus,“ vel „antennis longis gracilibus, tarsi brevibus latis,“ vel „antennis brevibus crassis, tarsi anticis gracilibus longis.“



quorum copiam magnam legi, ita ut generalia huius proportionis hic non dare possim, specialia autem generum atque specierum descriptionibus iunxero.

## §. 6.

## De partibus oris.

*Partes oris*, seu *instrumenta cibaria*, quae nunc examinabo, attentione et diligentia maxima digna sunt, cum partim, ratione oeconomiae insectorum, tanti sint momenti, partim autem, ob multiplicem simulque constantem formam et proportionem, apta sint ad characteres genericos praebendos. Hae partes sunt: Labrum, mandibulae, maxillae cum palpis anterioribus, labium cum palpis posterioribus, et mentum.

*Labrum* 1) longitudine est latius; Tachinis autem angustius, quam reliquis generibus; *Paedero orbiculate*, caeteris paribus, maius, margine antico integro, quo capitis pars anterior dilatatur et producitur. Reliquis horum insectorum generibus labrum, quantum mihi observare licuit, margine antico magis minusve emarginatum, seu incisum, et interdum in duos lobos (clypeus, verrucis binis setosis, *Panzer*) fissum est, quod in *Staph. olente*, *polito*, *Lathrobio brunnipede* et *Oxyporis*, satis distincte animadverti. Margine setis crebrioribus, haud vero confertis, ciliatum est.

*Mandibulae* apice incurvae et acutae sunt; dorso laeves, integrae, nudae, arcuatae, interdum planiusculae ita ut margines

1) Haec oris pars, quam Illiger primus labrum nominavit, a pluribus auctoribus labium superius appellatur, atque eadem est, quam Panzer (Fig. IX, tab. XII libelli entomologici, supra iam allegati) sub nomine „Clypeus, verrucis binis setosis“ exhibuit.

duo distincti dorsum et latera mandibulae definiant. — *Margo interior* mandibulae duplex et acutus est; intervallum, inter hunc marginem duplicem, alveatum est et eo latius vel angustius, quo latior vel angustior mandibula tota est. *Oxytelis piceo*, *carinato* *tricorni* unus horum marginum interiorum adeo retrocedit, ut dens introrsum versus huius marginis a dorso oriri videatur. Quorundam horum coleopterorum mandibulae, margine inferiore, *dentibus* armatae sunt, quorundam autem *inermes*, et hae, sine exceptione, breves, latae, apicem versus sensim angustiores (e. g. *Tachini rufipedis*, *Aleochar. fuscipedis*, *canaliculatae*, *Tachyp. analis*). Mandibulae dentatae plerumque graciliores sunt; in genere Stenorum gracillimae et falcatae, apice profunde incisae, vel, si mavis, dente longo acuto subcurvato, apici propiore, armatae; paulo latiores *St. olentis*, *politi*, *maxilloso*, *erythropteri*, nec non *Paed. littoralis* et *riparii*, medio marginis interioris dente porrecto subobtusiusculo armatae; Oxypororum et *Lathrobii elongati*, dentibus duobus; *Paed. orbiculati*, dentibus tribus vel quatuor. Mandibulae *Oxytel. picei*, *carinati* et *tricornis*, forma, illis *Aleochararum*, *Tachinorum* &c. similes, apice eodem modo incisae sunt, quo in Stenorum genere; Calliceri exsertae, paulo angustiores quam *Aleocharis*, margine autem inferiore denticulatae, *Staph. stercorarii* breves, crassae, latae, marginis interni medio dentibus validis brevibus armatae. — Mandibulae autem ambae nunquam invicem omnino aequales et similes sunt: Irregularitates et flexiones earum ita sitae sunt, ut alterae alteris respondeant, i. e. ut, coniunctis et complicatis mandibulis, tuberculi, seu dentes, seu convexitates unius, in foveolas, seu incisiones, seu concavitates alterius inserantur, &c. quo haec instrumenta aptiora redduntur ad rapinam et cibum tenendum et comminuendum. Inde dentium numerus et situs

varii quarundam specierum, (Paed. *orbiculati* mandibula altera quadridentata est, altera tridentata; Staph. *stercorarii* altera tridentata, altera bidentata) et quidem ita, ut mandibula sinistra, capite scilicet superne viso, dentibus semper pluribus instructa sit, quam dextra.

*Maxillae* constant e basi et duobus processibus. — Illa est forma irregulari, angulata, subquadrata, radice latior, difficilis descriptu. — *Processus interior*, qui ad latus internum basis oritur, altius autem illa ascendit, compressus est, medio latissimus ventricosus, apicem et basin versus angustatus; dorso, seu margine extero, qui basi adjacet, recto, laevi, nudo; margine interno medio ventricoso, apicem versus ciliis brevibus pectinato, interdum etiam basin versus ciliis fimbriato (e. g. St. *polito*, Paedero *orbiculato*). — *Processus exterior* insidet in apice truncato basis; forma est clavata, plerumque subincurva, interdum ensiformi (e. g. Lathrob. *elongato*); apice setis densis seu ciliis incumbentibus vestitus; coloratu et crassitie substantiae membranaceae variis in areas tres divisus, quarum media reliquis obscurior esse solet 2).

2) Quibusdam horum coleopterorum hic processus, longitudine et arearum coloratu, palpum triarticulatum mentitur (e. g. Staph. *olenti*, *erythroptero*, Lathrob. *elongato* etc. multis), et facile pro palpo vero haberi potest. Examine autem diligentiore, et comparatione inter palpos et processus maxillae plurium insectorum, institutis, haud difficile dignoscendum et oculis aequae ac verbis distinguendum erit, quid sit palpus verus, quid processus maxillae: Palpus, articulis pluribus corneis, vi motus proprii instructis, compositus, maxillae ita insertus est, ut, maxilla ipsa quiescente, quoquo versus et velociter se movere possit; articulus eius ultimus nunquam pilis vestitus, sed laevissimus est; interdum articulus primus, et plerumque articulorum mediorum et primi apices setis quibusdam, haud vero confertis, vestiti sunt. Processus exterior maxillae membranaceus est, nunquam articulatus, nec ita maxillae inser-

*Palpi anteriores* singuli apici basis maxillarum, immediate ante processum anteriorem, inserti sunt, et proveniunt e tuberculo exiguo, haud confundendo cum articulo palporum primo brevi. Raro triarticulati sunt (Stenis nempe, Paederis et Callicero); plerumque quadriarticulati. — *Articulus primus*, brevis, clavatus, numquam parte quarta articuli secundi longior est. *Articulus secundus* clavatus, tertio numquam brevior plerumque autem paulo longior est (e. g. Oxyporis, Staph. *olenti*, *maxilloso*, *polito*, *stercorario*, Oxytelo *piceo*, Tachino *rufipedi*). *Articulus tertius* etiam clavatus est et, si ipse ultimus est (e. g. Callicero, Paederis, Stenis), aut si articulus quartus pertenuis est, (e. g. Aleocharis, Lathrobiis, Oxytelis) praevalidus. — *Articulus quartus* forma est multiplici: 1) Vel nihilo vel paulo tantum angustior penultimo, ovatus, et quidem apice vel obtusus (Staph. familiae primae et Staph. majoribus familiae secundae) vel acutus (Staph. reliquis, Oxyporis, Tachinis, Omaliis, Pinophilo): 2) penultimo latior, securiformis (Astrapaeo): 3) brevis, tenuis, multo gracilior penultimo, subuliformis (omnibus reliquis Coleopterorum Micropterorum generibus.

*Palpi posteriores* triarticulati, dorso seu superficiei externae labii inserti sunt, et proveniunt e tuberculo, quod, radice prolongata, articulo proprio simile, motus autem spontanei haud potens est. *Articulus primus* minor est, et forma brevi clavata; *secundus* clavatus, plerumque reliquis longior, quod autem in Staph. *polito*, *erythroptero*, *ster-*

sertus, ut per se moveri posset, et si interdum motus spontanei compos esse videtur, hoc motus effectus substantiae ejus flexibilis est, quae pressioni cedit. — Maxillae, palpis duobus veris instructae, sunt Carabis, Dyticis, Cicindelis, Cycharis, Forficulae auriculariae etc. — Plura, huc pertinentia vide §. 2. not. I.

*ovario*, *Stenis*, *Tachino rufipede*, *Alæoch. canaliculata*, *Oxytelis piceo*, *carina* et *tricorni*, *Latrob. elongato* nullius est momenti, quibus articuli primus et secundus fere eiusdem longitudinis sunt; articulus *ultimus* vel de articulo ultimo palporum anteriorum, forma, decedit (e. g. *Oxyporis*, *Paederis*, *Stenis* et *Calli-cero*), vel ei aequalis est (in reliquis generibus) 3).

*Mentum* corneum plurimis generibus longitudine latius est, et quidem apice, cui labium insidet, latissimum, truncatum, integrum, gulam versus angustatum; *Oxyporis* autem et *Stenis* latitudine longius et rhomboidale. — Alia quaedam de mento vide in nota 4).

3) Palpi anteriores semper sub capite magis minusve prominent, ipsis etiam maxillis, quibus inserti sunt, absconditis. Palpi posteriores, multo quidem anterioribus breviores sunt; porrectis autem, articulus saltem ultimus comode et sine noxa insecti observari et examinari potest. Cum autem forma articulorum ultimorum adeo sit multiplex, nec attamen in speciebus varians, ab ea praecipue characteres genericos desumsi. — Palpi filiformes sunt ubique eiusdem crassitiei, articulis primis clavatis, ultimo ovato; securidacei, articulis primis clavatis, ultimo triangulari vel securiformi, praecedentibus latiore; acuminati, articulo ultimo subuliformi, multo breviora et tenuiora quam penultimus.

4) Cum hoc loco quaedam de differentia labii et menti addere mihi propositum sit, non possum quin indicem, me, in denominatione oris partium, Don. Illiger secutum esse, qui illas in praefatione ad „Enumerationem Coleopterorum Borussiae“ (Verzeichniss der Käfer Preussens, entworfen von Joh. Gottl. Kugelann, ausgearbeitet von Joh. Karl Wilhelm Illiger etc. Halle 1798. 8.) p. XXXIV <sup>197</sup> plane et distincte descripsit. Primus etiam labium et mentum distinxit, et definitionem harum partium multo faciliorem reddidit. — Fabricius, in scriptis primis Entomologicis, sub labio inferiore mentum simul et labium comprehendit, hoc autem pro processu interno linguaeformi illius habuit, quod patet e verbi, eius propriis, „Labia horizontalia, os superne inferneque tegentia; ultimo interdum elongato in linguae

*Labium*, superficiei internae et apici menti adnatum, multo autem altius ascendit quam illud; membranaceum est, lateribus autem et sub palpis substantia multo crassiore. Non vero audeo, de forma eius aliquid certi dicere velle, quia iure dubito, labia, insectorum, quae examinavi, integra fuisse, cum saepius apice, parte eorum longe tenuissima, adeo irregularia seu lacerata vel

„laciniis interiores“ (Vide I. C. Fabricii *Systema Entomologiae* — in Prolegomenis. — I. C. Fabricii *Entomologia Systematica*. Tom. I in praefatione, p. V). Mentum ergo et labium sub universali nomine „labii inferioris“ comprehendens, cum labii apicis mentionem faceret, tum de apice menti, labio scilicet proprie sic dicto deficiente, vel oculis eius latente, loquebatur, quod plane apparet e comparatione operis eius recentissimi (I. C. Fabricii *Systema Eleutheratorum*. Tom. I. Kiliae 1801. 8.) cum operibus praecedentibus. In illo enim partes easdem seiunxit, quas Illiger iam antea, sub nominibus menti et labii distinxerat, illud autem labium, hoc ligula appellavit; et saepius legimus „ligula trifida, ligula bifida, ligula integra“ ubi in scriptis prioribus eiusdem auctoris de „labio trifido, labio bifido, labio integro“ locutum est; saepius autem „labium emarginatum, ligula nulla, labium cylindricum, labium integrum“ etc. ubi, quoque in *Entomologia systematica*, „labium emarginatum, labium cylindricum, labium integrum“ legimus. „Penicilli duo“ Lucani, qui sunt „ligula bifida penicillata“ Lucani (in *Syst. Eleutherat.*) labium sunt. — Differentiam inter labium et mentum Dom. Sturm figuris diligentissime sculptis quatuor tabularum, quas libello entomologico (*Verzeichniss meiner Insectensammlung etc. von Jacob Sturm*. Erstes Heft, Nürnberg 1800. 8.) adiunxit, perclare proposuit. Insecta, et instrumenta eorum cibaria, tabulis illis exhibita, ab insectis, quae hic tractantur, longe quidem discrepant; sed collatione partium multa iam clariora redduntur. Maximis praeterea Staphylinis, colore nigro seu obscuro, nihil facilius est, quam mentum et labium discernere, cum nonsolum substantia, illius scilicet cornea, huius membranacea, sed ipso colore, menti nigro, labii flavo, differant. — Confer quae Prof. Knoch, in opere supra iam allegato, (*Neue Beyträge zur Insectenkunde von A. W. Knoch*. Erster Theil. Leipzig 1801 — Einleitung) de ore disseruit.

corrugata apparerent, ut non credere possim, me illa sub forma eorum propria et naturali vidisse. Attamen „ligulam emargi-  
 „natam cum mucrone“ (Fabr.) Oxypori, nec non „ligulam  
 „cylindricam integrant“ Paederi (Fabr.) vidi, haud vero „li-  
 „gulam trifidam“ Staphylinorum (Fabr.) e quibus *Staph. maxillo-  
 sum, olentem, stercorarium et politum* examinavi, labium autem  
 nunquam fissum conspexi. Ea labii pars, quae infra palpos po-  
 steriores sita est, *Paed. ripario et orbiculato, Tachino rufipedi,*  
*Aleoch. fuscipedi et canaliculatae, Oxytelis carinato et tricorni,* lon-  
 gitudine latior, forma rectanguli, erat; *Staph. polito, maxilloso,*  
*olenti, Lathrob. elongato,* basi latissima, apicem versus sensim  
 angustata; e contrario, apice latissima, basin versus sensim an-  
 gustata, Stenid erat 5). — In superficie interna labii partes duas  
 conspiciamus, *pectinibus* similes, quorum dentes perpendiculariter  
 in superficie interna labii erecti sunt 6). Hi pectines, situ, for-  
 mae labii respondent, in *Staph. maxilloso* et *Lathr. elongato,*  
 quorum labia accuratius examinare potui, coniunctam figuram  
 anguli acuti exhibent cuius apex gulam versus spectat. — Labium,  
 cum palpis et his pectinibus, a latere visum, exacte maxillam  
 repraesentat, cum pectines, substantia et figura, omnino pro-  
 cessui interno maxillae similes sint, et solo defectu processus  
 exterioris ab illa differt 7).

5) In characteribus genericis nunquam labii rationem habui, praecipue eam ob  
 causam, quod de vera huius partis figura saepe nimis incertus essem, et quod  
 ab illa labii parte, quae pone palpos ascendit, parte adeo tenui, quae facillime  
 vulnerari aut deformari possit, characterem genericum nollem desumere.

6) Ligula, laciniis linearibus intus dentatis, *Copris Fabr.* — Confer tabulas  
 in libello Entomologico Sturmii, quem iam in nota 4) huius § allegavi.

7) Labium ergo, cum duobus palpis in superficie externa, et duobus pectinibus

## §. 7.

## De Thorace.

*Thorax*, circumdatus <sup>est</sup> *canalicula marginali*, quae instar sulculi angusti, in speciebus minimis vix conspicui, totum thoracem ambit, margine autem anteriore fere evanescit. — Infra hanc canaliculam thorax adhuc paululum continuatur, quae continuatio, *ora lateralis* a me appellata, aequae ac thorax, canalicula marginali propria circumdata est, semper autem laevissima nitidissima, licet thorax vel confertissime punctus sit (e. g. Staphylinis familiae secundae). Stenis solis haud minus confertim et crasse puncta est, quam reliquae thoracis partes. Plerumque orae laterales cum thorace proprio angulam exhibent acutum; acutissimum autem, oris nempe lateralibus omnino fere ad superficiem inferam thoracis reflexis, in Tachyporis, Tachinis, Aleoch. *fuscipede*, *ruficorni* &c., ut paucis dicam, in omnibus illis, quorum thorax latus valde convexus atque lateribus deflexus est. Inde Staphylinis, Aleocharis familiae primae &c. hic angulus minus est acutus; rectus, Oxyporis, Paederis, Lathrobiis; obtusissimus Stenis, quorum thorax nulla canalicula marginali circumdatur, sed lateribus linea solummodo subelevata obsoleta ab ora laterali separatur. Forma orae lateralis duplex est; ple-

in superficie interna, omnino cum maxilla duplici comparari potest, et, secundum analogiam, meliorem forsitan iure maxilla nominaretur, cum tam ratione situs et motus ascendens et descendens, quam serie duplici dentium superficiei internae, maxillae reliquorum animalium melius respondeat, quam illae partes oris coleopterorum, quae hactenus maxillae nominatae sunt. — Cum autem permutationem harum denominationum multae confusiones sequi possent, et certo sequerentur, nomina usitata partium oris servavi, et nihil magis opto, quam quod quisque ea servet.



rumque scilicet linearis, apicem versus angustata; Lathrobiis vero, Oxyporis et Paederis triangularis, basi latissima.

*Thorax* proprius, seu pars thoracis superiora, semper magis minusve convexus est; disco enim deplanato, latera saltem declinata sunt (e. g. Aleoch. *depressae* et *deplanatae*); lateribus autem planiusculis, discus convexus est, (e. g. Omaliis, Aleocharae *strumosae* &c.). Thorax planissimus illis generibus est, quae, habitu toto, valde plana sunt (e. g. Oxytelis, Omaliis); convexissimus Tachyporis et quibusdam Aleocharis (e. g. *Al. fuscipedi*, *lanuginosae*, *bipunctatae*, *nitidae* et affiniibus). Latera thoracis nominantur vel *declivia*, vel *deflexa*, vel *declinata* quo magis vel minus, quo abruptius vel lenius descendunt. — *Forma* thoracis, vel eius circuitus, in generibus variis varia etiam est: *Orbiculatus* thorax est quibusdam Aleocharis familiae secundae; *subquadratus*, angulis obtusis, margine basis rotundato, Staphylinis familiae secundae; *suborbiculatus*, margine apicis truncato, Staphylinis familiae tertiae; *subrectangulus*, angulis obtusis, Staphylinis familiae quartae et Lathrobiis; longitudine latior, seu *transversus*, Tachinis, Omaliis, et plurimis Tachyporis atque Oxytelis; *fusiformis*, vel subcylindricus medio paulo latior, Steuis plurimis; *globosus*, Aleocharis familiae primae et nonnullis Paederis; *cordatus*, seu apice latior, basin versus angustatus, Anthophagis. Superfluum autem foret, de unaquaque differentia formae thoracis, quae in singulis speciebus magis minusve diversa est, hic iam loqui, cum infra, in descriptione specierum, omnia repeterentur. — De proportione thoracis ad caput supra (§. 4.) iam locutus sum.

Quod adhuc memorandum est spectat ad *irregularitates* thoracis. Thorax nempe: 1) totus est glaber, laevis, sine ulla irregularitate, Tachinis et Tachyporis; 2) punctis subtilissimis.

oculo non bene armato vix conspicuis, sparsus 1) (e. g. *Tachino rufipedi* &c. *Alloch. fuscipedi*, *lanuginosae* &c.) 3) punctis, nudo oculo conspicuis, confertis, impressus (e. g. *Staphylinis* plurimis familiae secundae, *Lathrobiis*, *Oxytelo tricorni* &c.). His autem coleopteris linea est thoracis media longitudinalis, laevissima, nitida, interdum nudis oculis vix conspicua vel obsoleta, praecipue, si thorax confertissime atque subtilissime punctus est (e. g. quibusdam *Staphylinis* familiae secundae), interdum autem latissima, si thorax punctis quidem multis, haud vero confertis, impressus est (e. g. quibusdam *Lathrobiis*). *Staphylinus olens*, solus inter *Staphylinos* indigenos, hac linea longitudinali thoracis caret, et nunquam ne vestigium quidem eius vidi, quamquam thorax subtilissime et confertissime punctus est. 4) *Staphylinis* familiarum tertiae et quartae thorax est laevis nitidus, et plerumque seriebus punctorum longitudinalibus impressus. Hae series distinctae et, ipso punctorum numero, constantes esse solent, ita ut ab hoc characterem distinctivum specierum desumere ausus sim. — Series autem duae mediae, quas *series dorsales* appello, characteres optimos praebent, et punctorum, e quibus finguntur, in speciebus variis, sunt tria ad duodeviginti. — Fere sine ulla exceptione, juxta harum serierum singulam altera est, itidem longitudinalis, plerumque autem magis minusve arcuata, arcus convexitate intus versa, punctis duobus ad octo constans; hae series sunt illae, quas *series laterales* appello. — Immediate ante canaliculam marginalem lateralem, puncta sunt plerumque duo, rarius tria vel quatuor distincta, e quibus, utro-

1) Forsan corpora omnium coleopterorum punctis subtilissimis sparsa sunt, quae autem, in minimis, ope tantum microscopii multo augmentis deprehendi possunt.

que thoracis latere, *series marginalis* composita est. — Hae series thoracis ita dispositae sunt, ut, in regula, numerus punctorum seriei dorsalis maior sit numero punctorum seriei lateralis, et hic maior numero punctorum seriei marginalis; exceptis attamen Staph. *elongato* et *glabro*, quorum series dorsales et laterales, numero punctorum, aequales sunt. Series thoracum elongatorum Staphylinorum familiae quartae e punctis longe pluribus compositae sunt, quam series thoracum orbiculatorum breviorum Staphylinorum familiae tertiae, ita, ut numerus minimus punctorum thoracis in familia quarta, maximus sit in familia tertia (nulla scilicet ratione habita Staphylinorum, quorum thorax haud puncto-striatus est). In familia quarta Staphylinis quibusdam (e. g. Staph. *ochraceo*, *elongato*) series lateralis, septem-vel octo-puncta, et series marginalis, tri-vel quadripuncta, apice ita incurvatae sunt, ut jungantur, et junctim figuram pedi episcopalis exhibeant. — Quod de seriebus punctorum thoracis summam dixi, de plurimis tantummodo, non de omnibus, Staphylinis familiae quartae obtinet; nulla enim regula sine exceptione: Sunt Staphylini nonnulli, quibus thorax punctis paucis sparsis impressus est (e. g. St. *splendenti*, *laminato*, *fulminanti*, *alternanti*); Staph. *puncto* thorax est lateribus multipunctus, punctis haud in series dispositis, seriebus autem dorsalibus distinctis, octo-ad decempunctis; item Staph. *rufipenni* thorax est multipunctus, punctis autem dispersis. — 5) Tandem thorax quibusdam Micropteris sulcatus est vel foveolatus, idque diversimodo: Est vel laevis, dorso sulco uno longitudinali canaliculatus, (e. g. Oxytelo *morisitanti*, Aleocharis *obscurae* et *sulcatae*); vel laevis, basi quibusdam foveolis longitudinalibus abbreviatis impressus (e. g. Al. *impressae*, *gagati*); vel crasse punctus, sulcis et foveis longitudinalibus, longitudine thoracis, exaratus, (e. g. Oxyte-

lis *piceo*, *carinato* &c. Omaliis pluribus &c.); Omalio *vugoso* autem sulculis abbreviatis rugosus; vel foveola parva orbiculata ante scutellum impressa (e. g. Aleocharis pluribus). — Alias impressiones thoracis, vel minus notatu dignas vel rariores, hic praetermitto, et in singulis speciebus adnotabo. Quaedam autem huc spectantia, imprimis ratione consensus inter caput et thoracem, vide §. 8.

## §. 8.

## De coleoptris et alis.

*Coleoptra*, forma; minus sunt multifaria quam thorax. In situ naturali quieto vel sunt *transversa* (longitudine latiora), lateribus parallelis (e. g. Staph. *simili*, Aleocharis familiae tertiae) vel *rectangula* (latitudine longiora) (e. g. Staph. familiae quartae, Paedero *ripario*, Lathrobiis, Omaliis, Anthophagis &c.) vel *quadrata* (longitudine latitudinis) (e. g. Staphylinis plurimis, Aleocharis familiarum primae et secundae, Oxytelis). Pectoris semper sunt *latitudine*, quae autem, cum latitudine aliarum corporis partium collata, multiplex est: Coleoptra, thorace multo angustiora, his insectis nunquam inveniuntur; latiora autem sunt Paederis, Oxyporis, Stenis et praecipue plurimis Aleocharis familiae primae. Respectu *longitudinis* relativae, coleoptra optime cum thorace comparari possunt: Longissima sunt Omaliis et Anthophagis, quorum coleoptra, longitudine et latitudine, thoracem saepius duplo superant; breviora quidem, thorace attamen longiora, Tachinis, Tachyporis, Oxyporis, Oxytelis; reliquis longitudine circiter thoracis. Coleoptra, respectu longitudinis, cum abdomine conferre, eam ob causam non censeo, quod quaedam horum insectorum, morte, abdomen saepius

contrahere soleant, ita ut multo abbrevietur, quo ergo proportio longitudinis harum partium valde mutatur et variatur; Tachinis autem, Tachyporis, Omaliis familiae secundae et Anthophagis, abdomen maximam partem a coleoptris tegitur; Aleocharis vero, Staphylinis, Paederis &c. minimam partem. — Coleoptra plerumque sunt planiuscula, eoque magis, quo magis totum corpus deplanatum est (e. g. Oxytelis, Omaliis), eoque minus, quo minus illud deplanatum est (e. g. Tachyporis et Tachinis). — *Elytra* apice truncata sunt, plerumque oblique, ita, ut margo suturalis margine laterali brevior sit, angulis exterioribus apicis magis minusve rotundatis, praecipue Aleoch. *fuscipedi*, Staph. *simili*, *olenti* &c., omnibusque illis Micropteris, quorum coleoptra perbrevia sunt, nec e. g. Tachyporis, Tachinis, minime autem Omaliis, quorum elytra, e contrario, ita truncata sunt, ut margo suturalis margine laterali longior, immo, Omalio *Ranunculi*, praeterea productus seu appendiculatus sit. — Coleoptra marginibus lateralibus deflexa sunt, angulo attamen haud acuto, sicut orae laterales thoracis, sed pars ista deflexa, nec margine distincto acuto, seu linea elevata, nec canalicula marginali, separata, substantia, irregularitatibus vel laevitate, coleoptrorum superficiei aequalis est, nec in essentialibus ab illa diversa. — *Humerus*, in angulo elytrorum basis exteriori, pars altior elytrorum esse et, instar gibbuli, eminare solet; in generibus autem, quorum coleoptra convexa sunt, (e. g. Tachinis et Tachyporis) vix paululum prominet. — Reliquae coleoptrorum *irregularitates* sunt vel puncta, vel cicatriculae, vel sulculi, vel lineae impressae. — *Puncta*, omnium frequentissimae, vel subtilissima sunt et confertissima (e. g. Staphylinis familiae secundae, Aleocharis &c.); vel crassiora et minus conferta (e. g. Staphylinis plurimis familiae tertiae, Lathrobiis, Paederis, Oxyte-

lis plurimis, et praecipue Stenis); vel in series disposita (e. g. *Staph. impresso, elongato, ochraceo*, *Omal. rugoso, crenato, brunneo, striato*) seriebus autem raro distinctis, cum puncta passim vel in lineas impressas subconfluant (e. g. *Omalis rugoso et crenato*), vel dispergantur et vix vestigium serierum relinquunt (e. g. *Staph. ochraceo, Omalio brunneo &c.*); vel in disco solo elytrorum dispersa, (e. g. *Oxyporis*) 1). — *Cicatriculosa*, seu punctis

1) Hoc loco non possum non mentionem facere consensus inter caput, thoracem et coleoptra, ratione punctorum rugarum vel aliarum irregularitatum superficiei eorum: Si una harum partium prorsum est laevis et glabra, duae etiam alterae laeves et glabrae esse solent (e. g. *Tachyporis*, *Tachinis* familiae primae etc.). Coleoptris punctis, caput etiam et thorax punctis impressi erunt, haud vero semper eodem modo, sed, capite subtiliter et confertim puncto, thorax etiam et coleoptra subtiliter et confertim puncta sunt (e. g. *Staphylinis* familiae secundae, *Aleocharis* familiarum tertiae et secundae multae); capiti thoracique, subtilissime et confertissime punctis, *Staphylinorum* plurimorum familiae secundae, linea media est longitudinalis laevis nitida, *Staph. olente* attamen excepto, qui hac linea caret, etsi caput et thorax eius punctulatissimi sunt; capite lateribus tantummodo puncto, thoracis etiam latera sola puncta sunt, punctis autem plerumque regulariter et in series positis, (e. g. *Staphylinis* familiarum tertiae et quartae), coleoptra vero ubique puncta sunt, punctis interdum in series subdispositis, (e. g. *Staph. elongato, ochraceo*.) Immo, puncta capitis, quantitate et qualitate, punctis thoracis respondent, ita, ut, illis subtilibus et frequentibus, vel crassioribus et crebrioribus, haec etiam subtilia et frequentia, vel crassiora et crebriora sint, et vice versa, (confer *Staphylinorum* et *Lathrobiorum* species). Stenis caput, thorax et coleoptra punctis confertis crassis obsita sunt. Capite rugis exarato, thorax etiam rugosus esse solet (e. g. *Oxytelis, Omallis*). *Oxyteli tricornis* caput et thorax, quibusdam speciminibus, armati, quibusdam, inermes sunt. — Quod autem haecenus de consensu capitis thoracis et coleoptrarum dixi, summam solummodo valet, et „nulla regula sine exceptione.“ Inter omnia Coleoptera *Microptera* nullum occurrit coleoptris cornutis, aliove modo armatis, quamquam quibusdam caput vel caput et thorax armati sunt (e. g. *Oxytel. cornu-*

irregularibus, subconfluentibus impressa, elytra sunt Oxytel. *picea*, *carinata*. — *Sulculi* nonnulli longitudinales, valde autem breves, basi coleoptrorum Aleoch. *impressae* et *gagatis* insculpti sunt. — *Lineae* longitudine totius elytri, in his generibus haud reperiuntur, lineis duabus coleoptrorum parallelis, juxta suturam situs, exceptis, quae omnibus fere horum insectorum speciebus communes sunt; praeterea elytris Oxypororum, disco, lineae duae longitudinales, abbreviatae, subobliquae, impressae sunt; et vestigium harum linearum quibusdam etiam Tachinis familiae secundae superest, lineis nempe vel obsoletis et interruptis, vel in puncta tria remota dissolutis.

### De alis.

Sub coleoptris *alae*, situ naturali quiescente, artificiose complicatae, absconditae sunt, spatio perexiguo, cum, explicatae, multo longiores et latiores toto corpore sint. *Membranula* earum multo crassior est quam membranula alarum Forficulae *auriculariae*, et modo multo simpliciore, *costis* paucis, explicantur et complicantur 2). Tres harum costarum oriuntur basi alae, ex

te et tricorni, Anthophago armigero). Porro, Oxyporis et quibusdam Tachinis familiae secundae elytra sunt disco puncta et striata, capite thoraceque laevissimis.

2) Nec miramur, uti in alis Forficulae auriculariae, multitudinem, tenuitatem, ordinem costarum et ligamentorum, quae membranulam subtilissimam sustinent, nec effectum musculorum et nervorum invisibilium, qui, mechanismo artificiosissimo, costas illas, medio geniculatas, regunt, expandunt, retrahunt, et ope earum, alam explicant, vel complicant et sub coleoptra occultant. — (Confer. Memoires etc. par C. De Geer T. III. Mem. XII. p. 544. — Bonnets Abhandlungen aus der Insektologie, übersetzt von J. A. E. Göze, pag.

ea parte, quae cum trunco corporis cohaeret, apicem versus attenuantur, et fine omnino evanescent. Prima, sic dicta *marginalis*, ipse margo superior alae est, et in apice alae desinit; valida est, medio lata plerumque colorata, apicem versus attenuata. Secunda, seu *furcata*, ortu simplex, mox in duos ramos discedit, qui in margine inferiore alae, superior autem apici propior, inferior in medio marginis, desinunt. Tertia, quam *brevem* apello, desinit eo, ubi margo basis alae et margo inferior alae coniunguntur, multo est brevior quam costae furcata et marginalis, et, cum margine basis alae, exigua tantummodo partem membranulae includit. — Hae tres costae, quae e radice alarum oriuntur, distinctae sunt, et omnibus Coleopteris Micropteris communes esse videntur. Interdum autem ab illis, tanquam ramuli a trunco, quaedam costae breviores et graciliores proficiscuntur, numero et directione variis, quas autem hic praetereo, cum parvi momenti sint.

## §. 9.

## De trunco corporis.

*Truncus corporis*, i. e. corpus, capite thorace et caeteris membris privatum, constat *pectore* et *abdomine*.

*Pectus*, incisura laterali, ab abdomine separatum, supra tumidiusculum est, post mortem insecti autem exsiccatum et collapsum, alis et coleoptris omnino tectum; infra pedibus posterioribus instructum (vide §. 10). — Medio partis anterioris superioris *scutellum* adnatum est, quod, situ partium naturali quieto

549). Haec omnia in alis coleopterorum micropterorum desideramus (Confer. Deutschlands Insectenfauna von G. W. F. Panzer, tab. XII).



atque incolumi, inter angulos interiores elytrorum basis prodit. *Staphylinis* hoc scutellum elongatum est, basi latum, apicem versus sensim angustatum; *Lathrobiis* triangulare, exiguum; *Paederis* perexiguum, obtusum; *Anthophagis* et *Stenis* vix conspicuum; reliquis parvum triangulare.

*Abdomen* supra et infra convexum est, marginibus lateralibus elevatum, unde pars eius inferior, quae *venter* nominatur, semper convexior est, quam pars superior, seu *dorsum* abdominis, eoque magis vel minus, quo angustius et crassius vel latius et depressius totum corpus est. — Abdomen compositum est e septem annulis corneis, qui *segmenta*, ultimus autem speciatim *anus*, nominantur, quorum quinque prima, longitudine, aequalia sunt, sextum<sup>um</sup> autem reliquis longius esse solet. Hic segmentorum numerus constans est; abdomine autem, morte, contracto, haud raro accidit, quin unum alterumve eorum, praecipue ultimum, in segmentum praecedens retrahatur, quod Tachinis et Tachyporis saepius obvenit, atque numerus segmentorum minor esse videatur; cave, ne, hoc deceptus, credas, abdomen e sex vel quinque segmentis compositum esse. Segmentum *penultimum* sive sextum reliquis segmentis longius esse solet, imprimis in genere Tachinorum, et partes (verisimile genitales) includit, quae, speciebus nonnullis, instar penicillorum et forcipularum, numero autem non semper eodem, ventre, sub segmento ultimo, prominent (e. g. in speciebus quibusdam Staphylinorum, Lathrobiorum, Paedero *ripario*; distinctissime autem et copiosius in Tachinis familiae primae). — Quod ad *formam* segmentorum, haec, dorso, omnibus Coleopteris Micropteris, eadem est, nisi quod latitudine interdum diversa sint: Staphylino *palmulae* abdomen apicem versus latitudine crescit, Tachinis Tachyporis et quibusdam Staphylinis familiae tertiae (v. c. *Staph. attenuato*) la-

titudine decrescit; anus, vel segmentum ultimum, reliquis semper angustius est. Ventre segmentum penultimum, vel hoc et segmentum antepenultimum, interdum a reliquis differunt: Nonnullis Staphylinorum speciebus (e. g. *Staph. maxilloso, olenti*) segmentum penultimum, quibusdam individuis, margine medio, arcu parvo sinuatum est, quibusdam autem integrum; nonnullis Tachinorum speciebus, praecipue maioribus (e. g. *T. rufipedi, humerali, subterraneo*) segmentum penultimum, quibusdam individuis, margine sinuatum est, quibusdam integrum; nonnullis *Staph. variantis* et *politi* speciminibus segmentum penultimum margine medio incisum est seu fissum, aliis integrum; Staphylini *laminati* segmentum penultimum, infra, vel sub ano productum est, vel simplex et haud longius quam supra; *Staph. splendenti* vel segmentum penultimum, infra, margine medio, profunde fissum est, simulque antepenultimum arcu parvo sinuatum, vel utrumque integrum 1).

1) Cum autem individua specierum hic allegatarum, et certe multarum adhuc aliarum, caeteris paribus, forma sola huius segmenti differant, et haec differentia adeo frequens sit, eam non sufficientem esse putavi, ad plures species condendas. Coniicio autem, hanc segmenti penultimi duplicem formam in sexum duplicem specierum referri posse, idque tanto meliore iure, cum observaverim, penicilla ista, quorum in § mentionem feci, individuis, margine segmenti penultimi infra sinuato, longiora esse quam reliquis. Hunc atamen consensum sexus et formae segmenti penultimi conicere tantum, nec affirmare, possum; nondum enim par individuorum ex qualibet allegatarum specierum in copula reperi, nec credo, hanc differentiam individuorum in reliquis Micropteriorum speciebus, praeter Staphylinos et Tachinos familiae primae, locum habere; ego saltem eam haud ubique vidi, quamquam, multis speciebus, copiam haud exiguam speciminum possideo, et par Aleoeh. Boleti nec non Steni flavipedis, copula iunctum, prehendi.

## §. 10.

## De pedibus.

*Pedes* Coleopterorum Micropterorum, respectu numeri et situs artuum, omnibus generibus atque speciebus, nec non inter se, aequales sunt; respectu autem proportionis, semper pedes antici brevissimi et validissimi sunt, pedes postici longissimi atque gracillimi. Constant *capite femorum, femore cum trochantere, tibia et tarso*, et proportioni pedum inter se proportio artuum respondet, qui, pedibus anticis, validiores et breviores, pedibus posticis, longiores et graciliores sunt, exceptis capitibus femorum, quae, pedibus anticis, validissima quidem, simul vero longissima, pedibus autem posticis, brevissima esse solent. Hi pedis artus, omnes simul, ope capitis femoris, moventur, singuli autem, per se, motus etiam peculiaris in artu praecedente, haud attamen omnibus directionibus, potentes sunt: *Caput femoris (squamula articuliformis Panzeri)*, quod, quamquam, motu pedum, magni momenti est, plurimi Entomologi nostri aevi praeteriverunt, basis est totius pedis; partim in acetabulo situm, i. e. in cavitate corporis, formae eius exacte respondente, et motum ei certum concedente; hic motus attamen non nisi prorsum atque retrorsum, neque lateratim, fieri potest. *Femur* in capite femoris lateratim movetur, et si insectum incedit vel currit, atque pedes prorsum et retrorsum movere cogitur, capita femoris antica omnino prorsum, posteriora autem omnino retrorsum flexa sunt, ita ut pedes, respectu quidem totius corporis, antrorsum et retrorsum, in capitibus femorum autem lateratim, moveantur. Basi femoris, introrsum, *trochanter* (inter 23 — 24 et 28 — 29 tab. XII libelli Entomologici *Panzeri* situs), tanquam appendicula, iunctus est, qui autem motus spon-

tanci haud potens esse videtur. Nescio, quod de eius fine et usu proferam. Eodem modo, quo femora in capitibus femorum, *tibiae* in femoribus, et *tarsi* in tibiis moventur. — Omnes hi artus ita formati sunt ut, complicati, singuli singulis arcte se adplicent. Caput femoris, quousque ex acetabulo prominet, superficie superiore convexum est, superficie autem inferiore eo magis vel minus concavum, quo magis vel minus femur, superficie superiore, quae, replicando femoris, superficiem inferiori capitis femoris adplicatur, convexum est; margines femoris, in primis margo exterior, acuti sunt. Femur itidem, superficie inferiore, eo magis vel minus concavum est, quo magis vel minus superficies superior tibiae, quae illi adplicatur, convexa est 1).

*Capita femorum*, situ longitudine et crassitie, varia sunt; basi semper latiora quam apice; plerumque, si longiora sunt, fortia et pyramidalia (e. g. pedibus anticis Staphylinorum). Proportio eorum ad femora pedibus omnibus diversa esse solet: pari antico, capita femorum plerumque longissima et validissima sunt; pari medio breviora et debiliora; pari postico brevissima, maximam partem in acetabulo abscondita, parte prominente subglobosa, apice subtuberculato. Differentia longitudinis inter capita femorum antica et media in Onaliis vix est conspicua; et Stenis omnia aequae sunt breviora. Capita femorum paris singuli approximata esse solent; Oxyporis attamen atque Aleocharis capita femorum paris medii subremota sunt.

1) Quae hactenus de artibus pedum dixi sane etiam ad omnia reliqua coleoptera referri possunt, pedibus, generaliter et quoad articulationem artuum, prorsum invicem congruentibus. Variant autem forma, nec non numero atque proportione articularum tarsorum.

*Femora*, forma, multo minus variabilia sunt; caeteris paribus attamen Paederis et Stenis gracillima longissima, Lathrobiis brevissima validissima. *Trochanter* eo distinctior esse solet, quo gracilius femur ipsud est, (c. g. Paederis, Stenis, Aleocharis &c.).

*Tibiae*, longitudine, propemodum femora aequant, basi subangustiores sunt quam apice, plerumque paululum incurvatae; Stenis solis rectae. Staphylinis, Tachyporis et Tachinis breves sunt atque validae, setis rigidiusculis, et inter setas spinis quibusdam longioribus, vestitae, imprimis attamen tibiae anticae. Oxytelis autem multo validiores, spinis veris armatae, et anticae praeterea (quod, e coleopterorum micropterorum generibus, huic soli proprium est), apice, sinu obliquo marginis interioris, eodem modo ut Aphodiis, emarginatae sunt. Lathrobiis, Omaliis et Paederis tibiae sunt graciliores atque minus spinosae, ciliis rigidiusculis vestitae; quamvis inter Omalia quaedam occurrant tibiis validioribus et fere aequae spinosis ac tibiae Oxytelorum (c. g. Omal. *rugosum*). Oxyporis et maioribus Aleocharis graciles sunt atque subciliatae; Stenis et minoribus Aleocharis gracillimae atque laevissimae. — *Spinae* et *cilia*, de quibus actum est, praecipue marginibus acutis interioribus et exterioribus, validissimae autem et longissimae, sine exceptione, apici tibiarum insident. Ante omnes duae spinae, longitudine et crassitie insignes, margine interiore apicis, instar furculae bifurcae, prominent. Hoc par spinarum omnibus Coleopterorum Micropterorum generibus, vel illis, quorum tibiae, marginibus lateralibus, laevissimae vel solummodo ciliis tenuibus vestitae sunt, commune, eo autem longius est, quo plus tibiarum margines laterales spinis vel ciliis instructi sunt; Stenis autem minimum. Omnes hae spinae et cilia, sine exceptione, apicem pedis versus directae sunt, quo

coniicio, eas, insecto incedenti vel currenti, pro adminiculis servire, quorum ope corpus promovetur.

*Tarsi*, omnibus huc relatis generibus, compositi sunt ex articulis quinque, quorum ultimus, seu *unguis*, forma clavata seu pyriformi, apice ungula duplici armatus est. — De tarsis generaliter idem obtinet, quod iam de femoribus et tibiis dixi; Antici scilicet brevissimi, postici longissimi sunt. Tarsi autem antici vel perbreves sunt simulque valde dilatati, vel graciles et longi; illi Staphyl. omnibus familiarum primae et secundae, plurimis Staph. megacephalis familiae tertiae, et quibusdam familiae quartae (e. g. Staph. *fulgido*, *alternanti*), porro Lathrobiis plurimis; graciles omnibus reliquis generibus et speciebus. Hic vero notandum est, tarsos anticos, quibusdam speciebus, medium tenere inter graciles et dilatatos; immo, specierum quarundam specimina, tarsis dilatatis, tarsis tenuibus et tarsis intermediis variare (e. g. Staph. *nitidi* 2). — Articuli quatuor primi, infra, unguem versus, subproducti et pilis brevibus tenuibus densis, prorsum inclinatis, tecti sunt, et quidem eo crebrius, quo latior tarsus est; apice incisus esse videntur, ita ut incisura superne appareat, et articulus insequens e hac incisura provenire videat-

2) Sunt, qui credunt, formam tarsorum anticorum in consensu esse cum differentia sexuali, illaque specierum individua, quorum tarsi antici dilatati sunt, mares, reliqua autem feminas esse; dicunt maribus cum in finem tarsos anticos latiores et validiores esse, quo, ope eorum, feminis, copula, arctius inhaereant. His autem non adsentire possum, cum tarsi antici, omnibus individuis Staphylinorum familiarum primae et secundae, quotquot eorum vidi, dilatati, plurimis autem reliquis generibus et speciebus graciles sint. Staph. nitidus unica est species, in qua tarsos anticos et dilatatos et graciles deprehendi, speciminibus attamen haud deficientibus, quibus tarsi intermediis erant, i. e. qui, eodem iure, graciles vel latos nominari poterant, (confer §. 5. nota I).

tur; revera articuli apice truncati, spinis autem duabus porrectis validis armati sunt, quae speciem illius incisurae simulant. Cum autem tarsi antici semper posterioribus breviores sint, articulos etiam eorum breviores esse oportet. Illis, quorum tarsi antici perbreves et dilatati sunt, articuli etiam sunt perbreves, transversi, lati, medii latissimi; quorum tarsi antici autem graciles sunt, articulus primus elongatus, articuli medii breves et, ob spinas apicis, cordati sunt. Articuli singuli tarsorum posteriorum longiores sunt articulis singulis tarsorum anteriorum: Tres medii plerumque breves, cordati; Oxyporis autem et Lathrobiis articuli, secundus oblongus, tertius et quartus breves, cordati; quibusdam omnes longi graciles (e. g. Tachinis familiae secundae et Tachyporis, quibus generaliter pedes valde graciles sunt). Articulus primus, fere sine ulla exceptione, longissimus est; Oxyporis autem et Lathrobiis secundo haud longior, saepius brevior esse videtur 3). Omaliis et Oxytelis articuli quatuor primi perbreves sunt, ultimus autem longus validus, ungula etiam, caeteris paribus, validiore et longiore, quam in cogeneribus. Caeterum, unguis omnibus, forma, constans est, nec nisi ratione longitudinis et crassitiei interdum, ut modo vidimus, differt.

3) Fabricius verisimile articulum secundum longiorem, una cum articulo primo breviori, pro uno tantum atque primo habuit, et Paederis et Oxyporis tarsos quadriarticulatos tribuit, quo simul confirmavit id quod iam supra (§. 2.) dixi „Fabricium nempe maiores solummodo species generum suorum accuratius „examinavisse.“ Inter eius enim Oxyporos et Paederos, maioribus solis (e. g. Oxyporis rufo et maxilloso, Lathrobiis elongato brunnipedi etc.) articulus primus brevis, articulus secundus longus est. Reliquis autem Oxyporis et Paederis Fabricianis (Tachinis, Tachyporis et Paederis veris) articuli quinque tarsorum distinctissimi sunt, et articulus primus sequentibus longior; insecta vero ipsa, in genere, illi multo minora.

§. II.

De habitatione et vitae genere horum  
insectorum.

*Vitae genus et habitatio* Coleopterorum Micropterorum per-  
multiplices sunt: Degunt partim in cadaveribus et fimo, partim  
in boletis vel agaricis et in aliis substantiis putrescentibus, par-  
tim in locis tenebrosis suffocatis, partim in floribus varii geni-  
ris, ibique victum quaerunt. Haud vero quaeque species, et  
multo minus quodque genus, eadem semper habitatione eodem-  
que victu utuntur. Staphylini reperiuntur in stercore, cadave-  
ribus, agaricis vel boletis, et aliis substantiis vegetabilibus pu-  
trescentibus, in locis tenebrosis suffocatis &c.; Lathrobia in suf-  
focatis humidiusculis, ubi finus seu vegetabilia putrescunt; ibi-  
que Paederi; Alcocharae in fimo, cadaveribus, boletis et agari-  
cis, sub arborum cortice; Omalia et Anthophagi in floribus;  
Oxyteli non nisi in fimo, Tachypori plurimi in fimo, nec minus  
frequentes in floribus, muscis, quisquilliis, gramine, &c.; Ta-  
chini familiae primae in fimo, familiae secundae in agaricis et  
boletis; Steni in locis humidis, arenosis, ad ripas, in lacunis  
exsiccatis &c. — Sed de vitae ratione horum insectorum nimis  
mance disseruissem, si modo dictis iam desinerem, cum in fa-  
miliis et ipsis speciebus generum plurimorum hoc vel illud ob-  
veniat peculiare, saepe admodum singulare et notatu dignum; ita  
ut credam, me, non sine ullo pro scientia usu, lectoribus meas  
observationes communicaturum.

De *ortu*, *vitae epochis* variis, et *copula* horum insectorum  
illud tantum scimus, quod cum omnibus coleopteris commune  
habent: Femina, aliquot tempus post copulam, ovula deponit  
in locum, larvis futuris, quae ex illis provenient, commodum.  
Larvae proreptae si, folliculis pluries depositis, ad certam



magnitudinem accreverunt, in pupam incompletam (nympham) mutantur, e qua tandem insectum perfectum provenit. De vitae ratione atque victu horum insectorum, in statu imperfecto, proprias observationes haud addere possum, nunquam enim mihi successit, larvas speciei cuiusdam maioris Staphylinorum (Staph. *olentis*? St. *similis*?) 1), quas nonnunquam in sylvis, locis tenebrosis suffocatis, sub truncis arborum caesarum, semper autem solitarias (ut insecta perfecta) reperi, usque ad perfectionem alere. Educatio atque nutritio harum larvarum, et observatio earum per omnes vitae epochas, res difficilis est, quod quisque mihi concedet, qui periculum fecit. Vitae rationem in insectis solis perfectis observavi. Si de *habitatione* insectorum agitur, *fortuita* a *vera* bene distinguenda est. Haec est ubi insectum

1) Saltem autem mihi liceat, descriptionem harum larvarum hic iungere: Corpus apterum, elongatum, longitudine 8—10 lin., nigrum, convexum, capite et duodecim segmentis, aequali latitudine, lateribus deflexis, constabat. Caput, cum antennis et instrumentis cibariis, capiti capitisque partibus insecti perfecti simile, minus attamen, erat; mandibulis falcatis, haud dentatis. Segmentum primum, subtransversum, apice paulo angustius, segmentis sequentibus longius, capite latius, infra pedibus anticis instructum, thoraci insecti perfecti respondebat. Segmenta secundum et tertium, singula primo paululum breviora, sequentibus paulo longiora, infra pare pedum instructa, pectori insecti perfecti respondebant. Segmenta sequentia, longitudine et latitudine similia, transversa, imbricata, lateribus deflexa, marginulo laterali subelevato, abdomen erant; ultimum autem, subpenultimum retractum, anum emittebat cylindricum, longitudinae segmenti, eo autem quadruplo angustiorum, et supra, spinis duabus, segmento longioribus, tripartitis, quoad formam cornua cervina aequantibus, armatum erat. Pedes erant quinquearticulati; articulo primo, capiti femorum respondente, huic etiam simillimo; articulis sequentibus subcylindricis, apice paulo crassioribus, armatis infra spinulis; secundo reliquis vix brevioribus; sequentibus crassitie decrescentibus; ultimo, apice, ungula duplici paululum curvata, armato. Caeterum pedes, ratione longitudinis proportionalis, pedibus insecti perfecti respondebant.

constantissime et copiosissime reperitur, et cum certitudine non indicari potest, nisi insectum aliqua copia, constanter, et temporibus diversis, loco quodam occurrat. Fieri enim potest, ut multitudo magna speciminum eiusdem speciei uno eodemque loco reperiatur, cum modo ibi provenerit, (experientia enim docet, multa insecta, statu imperfecto, longe secus vivere et locis habitare longe diversis, quam statu perfecto (e. g. Lucanus *Cervus*, *Melolontha vulgaris* &c.), vel tutelani contra frigora hyemis quaesiverit (uti e. g. *Omalius depressum*, quod, autumno anni 1799 et vere anni 1800, frequens domi ad fenestras cepi; vel *Oxyteli piceus* et *carinatus*, quorum copia haud exigua, vere, sub lapidibus, in quisquiliis, locis apricis, occurrit), paucis autem diebus praeterlapsis evanuerit, quia huius insecti habitatio propria longe alio loco est. Unde sequitur, multitudinem solam speciminum speciei, semel loco quodam repertam, nos, hoc respectu, nondum maxima certitudine ducere posse, potius habitationem constantem hic maioris momenti esse, quam illa. — Qui individuum unicum speciei alicuius loco reperit, ubi plurimae reliquarum cospecierum habitare solent, verisimile ibi reperit, ubi proprie degit, et vice versa (e. g. *Aleoch. longicornis* specimen modo unicum possideo, idque in fimo repertum; cum autem *Aleochararum* affinium longe maxima multitudo in fimo victitet, credo etiam, me illam loco proprio et naturali cepisse. E contrario, *Aleochara opaca*, quam semel tantum, et quidem in flore *Echii vulgaris* cepi, proprie, ut mihi persuasum est, alio loco degit, nullam enim huius familiae *Aleocharam* unquam in floribus reperi). — Si cuiusdam speciei multitudo speciminum magna est, et in diversis substantiis victitat, ita vero, ut longe plurima in una harum substantiarum degant, credo, hanc victum eis proprium praebere, his attamen distinctionibus: Forsan co-

pia insectorum quorundam in hunc vel illum pastum incidit, cum nullum alium invenire potuerit, quem illi praeferat, de quo autem facile nos certiores facere possumus, si haec insecta per plures dies observamus, certe enim haud diu permanebunt, sed mox alium locum quaerent; ope praeterca aualogiae, et collato vitae genere reliquarum cospecierum, facile intelligemus, an haec insecta loco proprio atque naturali prehenderit, an non. Quamvis autem plurima locis certis libentius habitent, et substantiis certis libentius victitent, quam aliis, sunt attamen quae substantiis, saepe valde diversis, pari modo delectari videntur, (e. g. Aleoch. *fuscipes* habitat aequè copiose in cadaveribus atque in fimo et boletis putrescentibus, et in omnibus, uti videtur, sibi placet atque vita fruitur minime famelica sed iucundissima; Omalium *rivulare* in fimo, in floribus, et in boletis degit. Stercus autem, carnis putrescens, boletus et flos res admodum diversae sunt.

In articulo praecedenti breviter momenta exposui, vel ad habitationem fortuitam vel ad habitationem propriam respicientia. Quae autem sunt causae, cur quaedam harum specierum, etsi speciminibus divites sint, nunquam, quaedam autem, individuis haud ditiores, saepe, et interdum copia haud exigua, locis fortuitis reperiantur, licet nulla ratio adsit, cur hic potius habitent (e. g. si victus earum naturalis et proprius haud procul est, et haec habitatio fortuita nec locus est, ubi tutelam quaesiverint, nec locus, quo ovula deponant &c.). Oxytelum *depressum*, cuius habitatio propria, sine dubio, in stercore est, aliquando copiose in floribus Echii *vulgaris*, et saepe in gramine legi; Tachinum *melanocephalum* et Aleoch. *nanam*, species duas, individuis adhuc ditiores, quam Oxytel. *depressus*, semper in boletis vel agaricis, et nunquam alibi. Au sensus, qui insecta, habitationes et vi-

ctum quaerentia, ducit, fortasse quibusdam hebetior, quibusdam acrior, causa huius differentiae sit?

Aliud autem, ut credo, notatu dignum, illud est peculiare et singulare in toto habitu talium generum familiarum et specierum, quae, vitae ratione singulari, a reliquis decedunt: Inter omnia Coleoptera Microptera *Staph. maxillosus* unicum est, quod in cadaveribus solummodo victitat; quantopere autem, antennis brevibus crassis, thorace, corporis signaturis, et, ut brevis sim, habitu toto, ab omnibus reliquis cospeciebus et Staphylinorum cogeneribus differt! Staphylini primi familiae secundae (e. g. *Staph. olens*, *similis* &c.) locis habitant suffocatis tenebrosis, sub lapidibus vel arborum truncis, nunquam in stercore; corpore autem opaco, obscuro, subtilissime puncto, thorace quadrato, antennis apicem versus magis minusve tenuioribus, ab omnibus reliquis Staphylinis decedunt. Staphylini ultimi huius familiae, qui in fimo degunt, habitu sunt longe alio, et vel vestimento corporis magis minusve lanuginoso differunt (e. g. *St. pubescens*, *nebulosus*, *murinus*), vel colore elytrorum pallido (e. g. *Staphyl. erythropterus*, *castanopterus* &c.). In familia tertia Staphylini, qui, fere sine ulla exceptione, in fimo victitant, et nitore splendidior, nec non forma atque punctura thoracis distincta sunt, singularitates quasdam observamus: *Staph. marginatum*, thoracis margine flavescente distinctum, cum omnibus cospeciebus huius familiae thorax unicolor sit, nullibi, quam in sylvis altioribus umbrosis, in fimo bovino, reperi, nunquam locis apricis, in campis vel pratis; species quasdam minores, elytris pilis griseiscentibus brevibus tectis, capite thoraceque interdum subsericantibus (e. g. *St. fulvipedem*, *micantem* &c.) saepius sub vegetabilibus putrescentibus, in lacunis exsiccatis, quam in fimo; species plurimas familiae quartae saepius sub arborum cortice et sub

lapidibus, quam in fimo. — *Paederi riparius et littoralis*, colore rufo et habitu toto, a conspeciebus satis distincti, occurrunt in gramine, locis humidulis vel umbrosis, inter quisquillas, ad radices arborum; reliquos huius generis non nisi sub lapidibus reperi. — *Aleochara prima familiae priucae, Aleochara canaliculata*, habitu toto nec non partibus quibusdam singulis, e. g. forma et fovea lata thoracis, de reliquis speciebus decedens, vitat, nec sub arborum cortice, nec in fimo, nec in boletis vel agaricis, nec in cadaveribus, sed semper sub lapidibus, ubi nunquam alia quaevis *Aleochara* mihi occurrit; reliquae huius familiae *Aleocharae*, „capite thoraceque globosis,“ in boletis et agaricis vel sub arborum cortice putrescente degunt; *Aleocharae* „coactae, thorace lato, apicem versus angustiore gibbo-  
„so,“ quae suat plurimae familiae tertiae, et quaedam familiae secundae, in fimo habitant; plurimae autem familiae secundae, et quaedam e familia tertia minus coactae et thorace minus gibboso, in boletis et agaricis, vel sub arborum cortice. — *Oxyteli* in fimo tantummodo degunt. — Duo genera Coleopterorum Micropterorum, *Omaliium* scilicet et *Anthophagus*, ab omnibus reliquis cogeneribus, „co-  
„leoptris longis, et abdomine lato depresso, ano acuto“ distincta, habitationem in floribus sibi sumserunt. — Species familiae secundae *Tachypororum*, tam vitae genere, quam habitu externo toto, inter se differunt: Quasdam, pallidas, nigro signatas, nitidissimas (e. g. *Tachyp. chrysomelinum, analem* &c.) in floribus, gramine &c., et interdum in fimo siccioro, reperi; quasdam autem, subnitidas, subsericantes, obscuras (e. g. *Tachyp. pubescentem, cellarem* &c.) modo sub arborum cortice. — Familiae duae *Tachinorum*, et vitae genere, et habitu toto, valde inter se differunt: Species familiae primae, quae in fimo tantummodo

habitans, latiores sunt, minus nitidae, capite orbiculato, colore multo opaciore, quam species *familiae secundae*, quae nunquam alibi quam in boletis vel agaricis inveniuntur. — *Oxypori* degunt cum familia secunda Tachinorum. — De *Stenorum* habitatione et vitae ratione veris nondum aliquid certi conperiri, cum species huius generis, habitu toto, inter se admodum congruentes, a cogeneribus autem omnino diversae, locis diversissimis reperiri, uti infra videbis; in genere autem terram humidioram amare, et diem atque solis lucem minus fugere videntur, quam species reliquorum cogenerum.

E praecedentibus apparet, plurima horum insectorum vel in fimo vel in agaricis et boletis degere. Eruiere autem possumus characteres universales, quibus illa ab his differunt. — Illa scilicet generaliter colore sunt opaciore, vel nitore caeciore; colore plerumque nigricante, interdum antennis pedibus elytris pallidioribus, his nempe vel subsanguineis vel castaneis vel fuscis, (e. g. Staph. quibusdam familiae tertiae, Aleocharis familiae tertiae, Oxytelis, Tachinis familiae primae), rarius ochraceo-vel rufo-vel testaceo-signatis, (e. g. Staph. *erythroptero* &c. Oxytelo *piceo*, Tachino *subterraneo*). — Quae semper in boletis vel agaricis habitant, nitore sunt nitidissimo, et colore pallido; plerumque rufa vel testacea, capite, angulis inferioribus coleoptorum, anoque saepe nigris vel fuscis (e. g. Oxypori, Tachini familiae secundae, Aleochara *nana*). — Character praeterea notatu dignus, et solis Oxyporis atque Tachinis familiae secundae proprius, lineae sunt duae impressae elytrorum subcrenato — punctae, quae autem Tachinis interdum interruptae sunt, et fere omnino evanescent.

---

# C o l e o p t e r a

## Microptera.

---

### Genus I.

#### Staphylinus

##### Palpi filiformes

Thorax basi rotundatus.

*Corpus* elongatum.

*Caput*, angulis obtusis; infra planum laeve, supra convexum — *Antennis* moniliformibus, undecimarticulatis; articulis, primo longiore, secundo et tertio brevioribus, caeteris brevissimis.

*Thorax*, antice truncatus, postice rotundatus; convexus —  
*Ora* laterali infra reflexa.

*Coleoptra* angulata; angulis obtusis; thoracis circiter magnitudine; depressiuscula; lateribus deflexa.

*Abdomen* elongatum, marginatum; dorso ventrique convexum; latitudine coleoptrorum.

*Pedes cursorii* — *Capitibus femorum approximatis*; *anticis* femore multo crassioribus, vix longioribus; *mediis* femore paulo brevioribus et crassioribus; *posticis* brevissimis, maximam partem in acetabulo absconditis — *Tibiis spinosis* — *Tarsis* quincartulatis; articulo primo longiore.

*Familia I.* Thorace lateribus basi que rotundato; angulis anticis acutis.

*Familia II.* Thorace subquadrato.

*Familia III.* Thorace suborbiculato.

*Familia IV.* Thorace elongato.

### Fam. I.

*Corpus* nitidum.

*Caput* subquadratum, angulis obtusis; nitidissimum, laeve, basi lateribusque punctum — *Oculis* parvis — *Antennis* capite paulo longioribus, extrorsum crassioribus; articulis, primo longo, clavato, crasso; secundo et tertio clavatis, brevioribus et tenuioribus; quarto et quinto subglobosis; sequentibus pateraeformibus, latitudine crescente; ultimo oblique truncato.

*Thorax* nitidissimus, laevis, lateribus punctus.

*Coleoptera* subquadrata, angulis obtusis; thorace longiora et paulo latiora; plana, pubescentia.

*Abdomen* pubescens.

*Pedes*, *tarsis* anticis dilatatis.

○ *St. maxillosus*, niger, nitidus; fascia coleopterorum cinerea; ventre candido.



*Longitudo* 5 — 8 lin.

Variat fascia coleoptorum continua vel medio interrupta; abdominis dorso cinereo - maculato vel nigro; capite latiore vel angustiore quam thorax.

Habitat ubique in cadaveribus.

*St. maxillosus* Linn. Fn. Suec. n. 841.

- *Fabr.* Ent. Syst. *St.* n. 9.

- *Payk.* Mon. *St.* n. 2.

- *Payk.* Fn. Suec. *St.* n. 2.

- *Schrank* Boic. n. 861.

- *Rossi* Fn. Etr. n. 607.

- *Olivier* Ent. *St.* n. 2. pl. I. f. 5. a.

- *Panzer* Fn. Germ. H. 27. t. 2.

- *nebulosus* *Fourc.* Ent. Par. *St.* n. 5.

- *balteatus* *Fabr.* Fn. Groenl. p. 191.

- *De Geer* Mém. *St.* n. 4.

- *fasciatus* *Fuesslin* Helv. n. 410.

*Geoffr.* Hist. *St.* n. 5.

De confusione *St. maxillosi* et *St. olentis* cel. *Hellwig* in „Fauna Etruriae *Rossii*“, quam edidit, uberius disseruit.

## Fam. II.

*Corpus* confertim punctum.

*Caput* confertim punctum — *Oculis* parvis — *Antennis* articulis, primo longiore clavato, secundo et tertio brevioribus clavatis, sequentibus campanulatis, ultimo oblique truncato.

*Thorax* subquadratus, confertim punctus, lateribus antice subdeflexis.

*Coleoptera* quadrata, angulis obtusis.

*Pedes* tarsi anticis dilatatis.

1. *St. olens*, niger, opacus. *maxillosum*

*Longitudo* 8 — 13 lin.

*Corpus* confertissime subtilissimaeque punctum.

*Caput* quadratum, angulis obtusis, magnitudine thoracis. *Antennis* capite paulo longioribus, extrorsum decrescentibus.

*Coleoptera* thorace vix longiora et latiora.

Habitat, vere, sub lapidibus et arborum demortuarum truncis, in sylvis.

*St. olens* Fabr. Ent. Syst. St. n. 6.

- Payk. Mon. St. n. 4.

- Payk. Fn. Succ. St. n. 5.

- Olivier Ent. St. n. 4. pl. I. fig. 1.

- Panzer Fn. Germ. H. 27. t. 1.

- major niger De Geer Mem. St. n. 3.

- maxillosus Fourcr. Ent. Par. St. n. 1.

- Schrank Austr. n. 434.

- Fuesslin Helv. n. 409.

Geoffr. Hist. St. n. 1.

Cel. Geoffroy, loco allegato, citavit etiam Linnei *St. maxillosum* (Linn. Fn. Succ. n. 603; et Act. Upsal. de anno 1736 p. 15 n. 23). Omnia autem haec citata ad *St. maxillosum* et ejus varietatem totam nigram referenda sunt. Loco, e Geoffroyi Hist. Ins. allegato, *St. olentem* describi, ex omnibus characteribus et e magnitudine apparet, cum *St. maxillosus*, „longitudine undecim linearum“ nunquam occurrat.

Cel. etiam Schrank perperam *St. maxillosum* Linnei citavit.

Confer quae cel. *Hellwig* in editione „Faunae Etruriae,“  
n. 607 monuit,

3. *St. similis*, niger, subopacus; linea longitudinali media ca-  
pitis thoracisque nitida,

*Habitu* *St. olentis*; differt autem corpore minore et pau-  
lo nitidior, coleoptris thorace brevioribus, linea capitis  
thoracisque nitida.

*Longitudo*  $5\frac{1}{2}$  — 8 lin.

*Habitat*, haud raro, sub lapidibus, in humidis, mon-  
tosis,

*St. similis* *Fabr.* Ent. Syst. St. n. 7.

- *Payk.* Mon. St. n. 5.

- *Payk.* Fn. Suec. St. n. 6.

- *Schrank* Boic. n. 863.

- *Olivier* Ent. St. n. 12. pl. V. f. 42?

- *nitens* *Schrank* Austr. n. 436.

*Geoffr.* Hist. St. n. 3.

*St. globulifer* *Fourcroy* Ent. Gar. St. n. 3.

- *minor niger* *De Geer* Mem. St. n. 7.

*Staphylinum* *De Geeri*, quem hic citavi, non ad *St. po-*  
*litum* *Linn.* referri posse, e multis ejus characteribus me  
persuasum habeo.

Allegavi etiam *St. nitentem* *Schr.*, thorace punctis quin-  
„que maioribus, infinitis minoribus; longitudine septem  
„lin.“ Quamquam enim puncta quinque majora thoracis  
speciminibus meis desunt, caeteri tamen characteres plane  
conveniunt.

Nulla modo *St. olens* huc pertinet; et *Dom. Schrank*  
(Boic. n. 863.) *St. olentem* *Payk.* allegans, omnino errat. Di-

cit enim ipse „thorax (*St. similis*) elytris longior est“ quo haec species a praecedente discernitur.

Descriptio Fabriciana huius insecti maxime cum meis speciminibus convenit, quia lineae elevatae capitis thoracisque, ab omnibus Entomologis ante Fabricium praetermissae, mentionem facit.

- St. morio* Geoffr.  
 4 *St. morio*, niger, subnitidus; antennarum apice, palpis, tibiis, tarsisque fusciscentibus.

*Habitu* *St. praecedentis*; linea etiam capitis thoracisque. Differt autem ab illo, corpore paulo angustiore; coleoptris paulo longioribus; capite thoraceque nitidioribus et minus confertim ac subtiliter punctis.

*Longitudo*  $6\frac{1}{4}$  lin.

*St. morio* Mus, Prof. Knoch.

- St. cyaneus* Scop.  
 5 *St. cyaneus*, ater, opacus; capite, thorace, elytrisque coeruleiscentibus.

*Habitu* *St. praecedentium*. Antennis autem extrorsum subcrassioribus; thorace paulo convexiore.

*Longitudo* 6 — 8 lin.

*Caput et thorax* linea media longitudinali laevi.

*Coleoptra* thoracis magnitudine.

Variat thorace cyanescente vel nigricante.

Habitat in montosis, sub lapidibus, cum *St. simili* et *St. aeneocephalo*; interdum etiam in fimo; primo vere.

*St. cyaneus* Fabr, Ent. Syst. St. n. II.

- Payk. Mon. St. n. 7.

- Payk. Fn. Succ. St. n. 4.

- Panzer Fn. Germ. H. 27. t. 2.

*St. Olivier* Ent. St. n. 13. pl. I. f. 4.

- *ophthalmicus* Scop. Carn. n. 300.

- *coeruleus* Fourcr. Ent. Par. St. n. 2,

*Geoffr.* Hist. St. n. 2,

*fulvipes* Scop.

6 *St. tricolor niger*, opacus; elytris cyanescentibus; pedibus, palpis, antennarumque basi rufo-testaceis.

*Habitu* quidem *St. praecedentis*; satis autem distinctus.

*Longitudo*  $5\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* orbiculatum, thorace multo minus, confertim punctum; punctis autem crassioribus quam in *St. praecedentibus*; linea media longitudinali obsoleta laevi; atrocoeruleus, nitidum. Antennis capite duplo longioribus, filiformibus, fuscis, basi rufis. Clypeo rufo. Labro fusco. Palpis gracilibus, tenuioribus quam in *St. praecedente*, rufis, apice fuscis.

*Thorax* quadratus, coleoptris vix angustior, subnitidus, crassius punctus quam in *St. praecedente*, linea media longitudinali laevi.

*Coleoptra* quadrata.

*Abdomen* pilis brevissimis tenuissimis griseo-sericantibus tectum. Segmentis penultimo et antepenultimo, margine, pilis fulvo-sericantibus fimbriatis.

*Pedes* rufi; capitibus femorum nigris.

*St. tricolor* Mus. Prof. *Knoch*,

*fulvipes* Scop.

7 *St. crassicollis niger*, opacus; tarsis fuscis; capite thoraceque nitidis.

*Habitu* *St. sequentis*. Differt autem statura latiore, capitis thoracisque punctis minus confertis, thorace convexiore &c.

*Longitudo* 7 lin.

*Thorax* subquadratus; angulis anticis obtusioribus quam in *St.* sequente; punctus, medio laevissimus; latitudine coleoptrorum.

*Coleoptra* quadrata, thorace paulo breviora.

*St. crassicollis* — Mus. Prof. Knoch.

8 *St. aeneocephalus*, nitidus; capite thoraceque nigro - aeneis, linea media longitudinali glabra; coleoptris fusco - vel rufis - grisescentibus,

*Habitu* *St. Merionis* (n. 4.); capite autem orbiculato, paulo angustiore quam thorax,

*Caput* confertissime subtilissimeque punctum; punctis quibusdam crassioribus lateralibus impressum; nitidum; linea media longitudinali glaberrima,

*Thorax* confertissime subtilissimeque punctus; punctis quibusdam maioribus, saepius obsoletis, quorum sex vel decem in series duas dorsales disposita sunt; linea media longitudinali glabra,

Magnitudo et color pervariabiles sunt.

*Var. 1* *St. aeneo-nitidus*; elytris, antennarum basi, tarsisque, fuscis; abdominis dorso lineis quinque griseis longitudinalibus; longitudine 6 lin.

*Var. 2* *St. aeneo-nitidus*; elytris, antennis, pedibusque fuscis; abdominis dorso linea longitudinali, segmentorumque marginibus, griseis; longitudine 6 lin.

*Var. 3* *St. aeneo-nitidus*; antennarum basi, palpis, tarsisque rufis; coleoptris, lineisque quinque abdominis longitudinalibus, griseo-sericeis; longitudine 4 — 5 lin.

*Var. 4 St. var. 3 similis; linea autem abdominis unica tantum, marginibusque segmentorum griseis.*

*Var. 5. St. niger, capite aeneo; coleoptris, abdominisque dorso, griseosericeantibus; antennis tarsisque rufis; longitudine 6 lin.*

*Var. 6 St. niger; capite thoraceque aeneis; antennis tarsisque rufis; longitudine 7 lin.*

Omnes hae varietates, habitu semper eodem, altera in alteram sensim transeunt. Nitore sericeus elytrorum et linearum a pilis griseis tenuibus depressis proficiscitur; quibus detritis, elytra fusca seu rufa, abdomen autem nigrum nitidum apparent.

Habitat haud raro in montosis apricis, sub lapidibus; praecipue tempore autumnali.

*St. aeneocephalus Payk. Mon. St. n. 6,*

- *Payk. Fn. Suec. St. n. 10,*

- *cupreus Olivier Ent. St. n. 16. pl. II. f. 16?*

Nondum audeo dijudicare, an *St. cupreus Oliv.* et *St. aeneocephalus Payk.* ejusdem sint speciei. Olivier nihil quidem de linea media thoracis dixit; caetera autem plane congruunt.

Dubito, an *St. aeneocephalus De Geeri* et *Fabricii* huc referri possit, cum nihil neque de lineis abdominis, neque de punctis thoracis capitisque dicatur; et Fabricius *St. aeneocephalum* „affinem *St. erythroptero* et forte meram ejus varietatem“ appellet, cum quo *St. noster* nihil commune habet.

Dom. Panzer sub nomine *St. aeneocephali* (Fn, Germ, H. 27 t. 5.) longe aliam speciem quam Paykullianam exhibuit.

9 *St. fossor* niger; capite thoraceque fuscis; coleoptris, tibiis, tarsisque rufis.

*Habitu* *St. erythropteri*. (n. 11.) Colore autem, thoracisque linea media longitudinali elevata, differt.

*Longitudo* 5 — 6 lin.

*Habitat* — Mus. Prof. Hellwig et Knoch.

*St. fossor* Fabr. Ent. Syst. St. n. 16.

- Penzer Fn. Germ. H. 27. t. 6.

10 *St. castanopterus* niger; coleoptris, pedibus, antennisque rufis.

*Habitu* *St.* sequenti simillimus, a quo tamen magnitudine, et thorace semper toto nigro differt.

*Longitudo* 5 lin.

Frons, cervix, scutellum, pectus, abdominisque dorsum saepius flavo-sericant.

*Habitat* haud raro in fimo.

*St. castanopterus* — Mus. Prof. Knoch.

- *erythropterus* Scop. Carn. n. 306 v. 2.

- Olivier Ent. St. n. 10. pl. II. f. 14.

- Rossi Fn. Etr. n. 609 var.

Haec species, characteribus constantibus distincta, hucusque pro varietate minore *St. erythropteri* habita est.

11 *St. erythropterus* niger; elytris, antennarum basi, pedibusque rufis; margine thoracis postico flavo.

*Longitudo* 6 — 10 lin.

*Corpus* subnitidum.

*Caput* orbiculatum, thorace latius, confertissime subtilissimeque punctum; antennis extrorsum paulo crassioribus.



*Thorax* subquadratus, paululum elongatus, confertissime subtilissimeque punctus; margine postico semper flavo.

*Coleoptera* quadrata, angulis obtusis, thorace latiora.

Habitat in fimo et, primo vere, in arena sub graminee spisso collis aprici prope *Brunsvigam*.

*St. erythropterus* Linn. Fn. Succ. n. 842.

- *Fabr.* Ent. Syst. St. n. 14.

- *Payk.* Mon. St. n. 3.

- *Payk.* Fn. Succ. St. n. 3.

- *Rossi* Fn. Etr. n. 609.

- *Schrank* Boic. n. 862.

- *Schrank* Austr. n. 435.

- *Scop.* Carn. n. 306. var. 1.

- *Fourcr.* Ent. Par. St. n. 9.

- *De Geer* Mem. St. n. 6.

- *Panzer* Fn. Germ. H. 27. t. 4.

*Geoffr.* Hist. St. n. 9.

12 *St. stercorarius* niger, opacus; antennarum basi, elytris, pedibusque rufis.

*Statura* et partium forma satis a *St.* praecedente differt — Proportione partium et forma *St. olentis*; antennis autem extrorsum crescentibus, punctis capitis thoracisque crassioribus.

*Caput* magnum, quadratum, angulis obtusis; atrum, opacum. Clypeo testaceo. Labro, palpis, antennisque fuscis; his capite vix longioribus, extrorsum crassioribus, basi rufis.

*Thorax* ater, opacus; linea media longitudinali, laevi, antice obsoleta, postice laevissima nitidissima.

*Scutellum* nigrum opacum.

*Coleoptera* quadrata, angulis obtusis, thoracis magnitudine, aurantiaca, pilis rigidis depressis obsita.

*Pectus* nigrum, pilis flavo-sericantibus vestitum.

*Abdomen*, dorso, maculis duabus segmentorum singulorum flavicantibus-sericeis; ventre, basi segmentorum flavo-sericea,

*Longitudo*  $5\frac{1}{2}$  — 6 lin.

Habitat in Stercore bovino, apud nos rarissime; semel tantummodo captus prope *Seesen*, die 8 Junii anno 1800.

*St. stercorarius* *Olivier* Ent. St. II, 18 pl. III. f. 23.]

19 *St. pubescens*; nigro-fusco-flavoque sericeo-nebulosus; thorace angulis anticis obtusis,

*Longitudo* 4 —  $6\frac{1}{2}$  lin,

*Caput* orbiculatum, thoracis magnitudine, opacum, metallicum, punctum; punctis maioribus passim impressum; lanugine flavescente vestitum; linea media longitudinali, laevissima, nitida, medio in rhombum, plus minusve transversum vel latum, laevem, nitidissimum, dilatata. Clypeo testaceo. Labro rufescente. Antennis capite longioribus, extrorsum crassioribus; articulis, primo clavato longo, secundo et tertio brevioribus clavatis, quarto et quinto subglobosis, sexto ad decimum campanulatis; articulis quinque basis rufis, apice nigra; caeteris totis nigris. Palpis nigris. Mandibulis nigris, basi rufis,

*Thorax* quadratus, angulis obtusis; coleoptris angustior; subtilissime confertissimeque punctus; lanugine rara tectus; linea media longitudinali, antice subobsoleta, postice laevissima nitida.

*Scutellum* triangulare, nigro - sammetinum, marginibus lineaque media longitudinali nudis.

*Coleoptera* subquadrata, angulis obtusis; opaca, nigro-cinereoque nebulosa seu tessellata.

*Abdomen* dorso flavo - cinereo - nigro - fuscoque varium, punctis interdum majoribus nigro - sammetinis duobus segmenti singularis; ventre pectoreque villis densis argenteo-sericeis, punctis minutis nigris passim intermixtis, vestitis.

*Pedes*, femoribus nigris, nitidis, nudis, annulo rufo; tibiis tarsisque obscuris, pilis grisescentibus vestitis.

Variat capite paulo latiore vel paulo angustiore quam thorax.

Habitat in humidis arenosis, in fimo bovino.

*St. pubescens* Fabr. Ent. Syst. St. n. 5.

- Payk. Mon. St. n. 9.

- Payk. Fn. Suec. St. n. 13.

- De Geer Mem. St. n. 2.

- Olivier Ent. St. n. 15. pl. II. f. 15.

- *chrysocephalus* Fourcr. Ent. Par. St. n. 8.

Geoffr. Hist. St. n. 8.

*Maculata* *capite*

14 *St. nebulosus*, obscuro - nebulosus; palpis, pedumque geniculis tibiisque rufis, thorace angulis anticis acutis.

Longitudo 6 — 7 lin.

*Caput* orbiculatum, thoracis magnitudine, subtilissime punctum, opacum, griseo - virescens, obscure - nebulosum; linea media longitudinali aeneo - nitida, laevi, obsoleta. Clypeo, labro, palpis, antennarumque basi rufis; apice antennarum fusca. Mandibulis nigris.

*Thorax* quadratus, basin versus sensim angustatus; angulis anticis acutis; colore capitis; subtilissime punctus, opacus; linea media longitudinali obsoleta, basi nitida.

*Scutellum* St. *pubescentis*; interdum autem, sammeto detrito, laeve, opacum, nigerrimum punctum.

*Coleoptera* quadrata, angulis obtusis; thorace latiora; opaca, subtilissime puncta; colore thoracis.

*Abdomen* nigrum, dorso subgriseo - virescenti - nebulosum, ocellis segmenti singularis duobus nigro - sammetinis, fulvoque sericeis, saepius autem obsoletis; infra, segmentorum basi, pectoreque argenteo - sericantibus.

*Pedes* rufi; tibiis apice obscurioribus; femoribus basi nigris; femorum capitibus nigris, argenteo - subsericantibus.

Habitat in fimo.

*St. nebulosus* Fabr. Ent. Syst. St. n. 3.

- Payk. Fn. Suec. St. n. 11.

Geoffr. Hist. St. n. 6.

○ 15 *St. murinus*, abdomine palpisque nigris; capite, thorace, clytrisque subaeneo - nitidis, obscure - nebulosis.

*Habitu* St. *praecedentis*; statura autem minore, thorace basin versus vix ac ne vix quidem angustato, oculis multo majoribus, palpibus nigris &c.

*Longitudo* 4 — 6 lin.

*Caput* quadratum, angulis obtusis, subtransversum, punctum, cupreo - vel olivaceo - subaeneum, obsolete nebulosum. Clypeo et labro concoloribus. Mandibulis palpisque nigris. Antennis rufescentibus vel fuscis, vel basi pallidioribus, caeterum antennis St. *praecedentis* similibus.

*Thorax* magnitudine circiter capitis; quadratus, angulis anticis acutis; capitis colore; punctus, opacus; linea media longitudinali obsoleta, basi autem nitidissima laevissima.

*Scutellum* et *coleoptra* St. praecedentis.

*Abdomen* nigrum; segmento primo et secundo, dorso, fulvo-nigroque subsericantibus; infra, segmentorum basi, pectoreque subargenteo-sericantibus.

*Pedes* plerumque nigri; interdum autem apice femorum, basique tibiaram rufis.

Variat capite paulo angustiore vel paulo latiore quam thorax; colore plus minusve nitido vel obscuro et opaco.

Habitat in fimo.

*St. murinus* Fabr. Ent. Syst. St. n. 4.

- Rossi Fn. Etr. n. 608.

- Payk. Mon. St. n. 14.

- Payk. Fn. Suec. n. 11.

- Olivier Ent. St. n. 14. pl. VI. f. 51.

- Pänzer Fn. Germ. H. 66. t. 16.

### Fam. III.

*Corpus* nitidum.

*Caput* nitidum, laeve, lateribus basis punctum. *Antennis* extrorsum crassioribus; articulo primo longiore clavato, ultimo obtuso. *Palpis*, articulo ultimo acuto ovato.

*Thorax* suborbiculatus; antice truncatus, angustior, angulis nempe deflexis; nitidus, laevis, punctis quibusdam impressus. Canalicula marginali crenulata.

*Coleoptra* subquadrata, angulis obtusis, thoracis magnitudi-  
ne vel paulo majora; nitida, confertim puncta.

*Abdomen* nitidum.

16 *St. splendens* niger, nitidus; elytris viridi-aeneis; thorace punctis quibusdam singulis impresso.

*Longitudo*  $4\frac{1}{2}$  — 6 lin.

*Caput* orbiculatum, thoracis magnitudine, pone oculos punctum. Antennis, articulis, primo longiore clavato, secundo et tertio brevioribus clavatis, sequentibus subcampulatis, ultimo oblique truncato.

*Thorax* glaber, punctis aliquot majoribus in angulis anticis impressus.

*Coleoptera* thorace paulo longiora et latiora, pilis brevibus vestita.

*Abdomen* infra, speciminibus quibusdam, segmento penultimo profunde inciso, antepenultimo sinuato; quibusdam autem segmentis omnibus simplicibus.

*Pedes*, tarsi anticis dilatatis.

Variat capite paulo latiore vel paulo angustiore quasi thorax.

Habitat ubique in fimo.

*St. splendens* Fabr. Ent. Syst. St. n. 19.

- Payk. Fn. Suec. St. n. 9.

17 *St. laminatus* niger, nitidus; capite thorace, elytrisque viridi-aeneis; thorace glaberrimo, impuncto.

*Habitu* omnino *St. praecedentis*. Statura autem capiteque minoribus; capite thoraceque nitidissimis, hoc glaberrimo laevissimo.

*Longitudo* 4 — 5 lin.

*Caput* thorace paulo angustius.

*Abdomen*, infra, segmento penultimo quibusdam producto, quibusdam simplicibus.

Variat thorace viridi - vel atroviridi - vel violaceo - aeneo.

Habitat in fimo bovino, rarior.

*St. laminatus* Creutzer Vers. p. 128. t. 3. f. 31.

- *Panzer* Fn. Germ. H. 67. t. 20.

- *aeneus* De Geer Mem. St. n. 9.

18 *St. aeneus niger*, nitidus; elytris viridi-aeneis; thorace seriebus dorsalibus quadri-punctis; capite orbiculato.

*Habitu* *St.* praecedenti similis; seriebus autem punctorum distinctus.

*Longitudo*  $3\frac{1}{4}$  —  $4\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* orbiculatum, thoracis circiter magnitudine. Antennis, articulis sexto ad decimum transversis pateracformibus.

*Thorax* laevis, punctis, marginali uno, lateralibus duobus, seriebus duabus dorsalibus quadripunctis.

Variat capite paulo angustiore vel paulo latiore quam thorax, orbiculato vel, rarius attamen, transverso.

Habitat in fimo.

*St. aeneus Rossi* Fn. Etr. n. 613.

<sup>fuscifera</sup>  
19 *St. politus niger*, nitidus, elytris aeneis; thorace seriebus dorsalibus quadripunctis; capite ovato; alis fuscis.

*Habitu* *St.* praecedentis; statura autem graciliore; punctis subtilioribus; capite ovato; tarsis anticis simplicibus etc.

*Caput* ovatum, thorace plus minusve angustius.

*Thorax* punctis marginalibus duobus; seriebus lateralibus tripunctis, dorsalibus quadri-punctis.

*Abdomen*, infra, segmento penultimo quibusdam inciso, quibusdam simplici.

Color et magnitudo variant.

*Var. 1 St.* capite, thorace, elytrisque viridi - aeneis; longitudine 4 —  $4\frac{1}{2}$  lin.

*Var. 2 St.* niger; elytris nigro - aeneis; longitudine  $4\frac{1}{4}$  lin.

*Var. 3 St.* niger; elytris viridi - aeneis; longitudine 5 lin — Frequentissimus.

Habitat in boletis, in fimo, ubique, per totum anuum

*St. politus* Fabr. Ent. Syst. St. n. 20.

- Rossi Fn. Etr. n. 606.

- Payk. Mon. St. n. 31.

- Payk. Fn. Succ. St. n. 31.

- Linn. Fn. Succ. n. 843?

- Olivier Ent. St. n. 31. pl. II. f. 10.

- *aeneus* Fourcr. Ent. Par. St. n. 17.

- Geoffr. Hist. St. n. 17.

Entomologorum plurimi asserunt, numerum punctorum thoracis hujus speciei valde variabilem esse. Manifesto autem plures species (e. g. *St. politum*, *variantem*, *punctum* &c.) confundunt, bene tamen distinctas. Mihi, inter magnam Staphylinorum copiam, nunquam *St. politus* „seriebus „dorsalibus thoracis quinque punctis,, vel *St. punctus* „late- „ribus thoracis parumpunctis“ &c. occurrerunt.

Eadem constantia punctorum thoracis longe plurimis Staphylinis hujus familiae est; et minime ad sententiam Paykulli accedo, dicentis „Numerus punctorum excavato- „rum thoracis (*St. politi*) variat, quod de specie praecedent- „te (*St. nitido*) et sequente (*St. marginato*) etiam valet.“

Ratione etiam coloris ego nunquam talem inconstantiam observavi, qualem alii observasse contendunt. *St. politum*



elytris rufis seu pedibus pallescentibus nunquam vidi; inde credo, *St. polito* Scopoli varietates „elytris rufis et pedibus „pallidioribus“ ad alias species, forsitan ad *St. nitidum* vel ad *St. corruscum* &c. referendas esse.

Quisque jam conjiciet, ex hac specierum diversarum confusione multa etiam falsa citata auctorum profecta esse. Et res ita se habet. *St. aeneus* De Geeri (Mem. St. n. 9.) quem Dom. Paykull et Panzer allegaverunt, varietas est *St. laminati* (n. 17.) — *St. minorem nigrum* De Geeri (Mem. St. n. 7.) a Dom. Fabricio citatum, ad *St. Similem* (n. 3.) retulit; item *St. atrum* &c. *Geoffroyi* (Hist. St. n. 3.), quem Dom. Panzer sub *St. polito* (*St. puncto*) citavit — Hic autem Staphylinus, a Dom. Panzer (Fn. Germ. H. 27. t. 7.) sub nomine *St. polito* exhibitus, simillimus est *St. puncto*, et liceat mihi, illum ad hunc referre. Taceo de illis auctoribus, qui quidem *St. politum* descripserunt, cum aliis autem similibus conjunxerunt; horum enim numerus maximus est.

20 *St. decorus* niger, subnitidus; capite, thorace, elytrisque aeneis; capite ovato; thorace seriebus dorsalibus quadripunctis.

Habitu praecedenti simillimus; capite autem paulo majore, plerumque viridi - aeneo; elytris depilibus; punctis subtilioribus; nitore caeciore.

Longitudo  $4\frac{1}{2}$  —  $5\frac{1}{2}$  lin.

Variat capite thorace elytrisque viridi - vel cupreo - vel nigro - aeneis.

Habitat passim in fimo, in quisquiliis, sub lapidibus.

*St. decorus* — Mus. Prof. Knoch.

21 *St. varians* niger, nitidus; elytris aeneis; alis albis; capite ovato; thoracè seriebus dorsalibus quadripunctis.

*Habitu* *St. polito* (n. 19.); statura autem minore; nitore splendidiore; punctis crassioribus; alis albis, puncto marginali fusco; elytris depilibus:

*Longitudo* 3 —  $3\frac{1}{4}$  lin.

Variat elytris viridi-vel nigro aeneis; thorace seriebus dorsalibus quadripunctis, vel, rarissime tamen, quinque-punctis; tarsis anticis subdilatatis vel tenuibus.

Habitat in fimo, frequens.

*St. varians* Fabr. Ent. Syst. St. n. 22.

- Payk. Mon. St. et Fn. Suec. St. n. 33.

- Olivier Ent. St. n. 35. pl. V. f. 46.

- *politus* Linn. Fn. Suec. St. n. 843?

- Schwank Austr. n. 437.

Haec Staphylinorum species saepius cum aliis, praecipue cum *St. polito* (n. 19.) confusa esse videtur — *St. polito* Paykulli var.  $\beta$  „elytrorum macula sanguinea“ ad *St. bipustulatum* (n. 54.) speciem satis distinctam, pertinet.

22 *St. punctus* nitidus, niger; thorace lateribus multi-puncto.

*Habitu* *St. praecedentium*; satis autem distincta species.

*Longitudo*  $3\frac{1}{3}$  —  $4\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* orbiculatum, thorace vix angustius, nigrum, nitidum, confertim punctum, medio laevissimum.

*Thorax* niger, nitidus; lateribus multi-punctus, punctis interdum in series tres subdispositis; seriebus dorsalibus constantibus, octo - ad duodecim - punctis.

*Coleoptera* nigro-vel subviridi-aenea, depilia.

Habitat in paludosis, sub vegetabilibus putrescentibus, cum pluribus hujus generis.

*St. politus* Panzer Fn. Germ. H. 27. t. 7.

23 *St. atratus*, niger, nitidissimus; elytris aeneis; capite orbiculato; thorace, seriebus dorsalibus quadripunctis.

*Habitu* *St.* praecedenti simillimus; punctura *St. politi*, punctis autem crassioribus; nitore splendidiore; elytris depilibus.

Variat elytris nigro-vel virescenti-aeneis.

Habitat cum *St.* praecedente, in paludosis.

24 *St. lucidus*, niger, nitidus; elytris viridi-aeneis; pedibus fuscis; capite orbiculato; thorace seriebus dorsalibus quadri-vel quinque-punctis.

*Habitu* *St.* praecedentis; statura autem minore; elytris subpilosis; pedibus fusco-piceis.

Longitudo 2 —  $2\frac{1}{2}$  lin.

Habitat — Mus. Prof. Hellwig.

25 *St. concinnus*, niger, nitidus; elytris viridi-aeneis; pedibus fuscis; capite suborbiculato; thorace seriebus dorsalibus quinquepunctis.

*Habitu* *St.* praecedenti simillimus; statura autem majore; thorace semper seriebus dorsalibus quinquepunctis; elytris depilibus.

Longitudo  $2\frac{1}{2}$  — 3 lin.

Habitat — Mus. Prof. Hellwig.

26 *St. Boops*, niger, nitidus; antennis pedibusque testaceis; oculis magnis; thorace seriebus dorsalibus tri-punctis.

*Statura*, St. praecedentibus; minor et crassior,

*Longitudo*  $1\frac{3}{4}$  lin.

*Caput* orbiculatum, thoracis latitudine; oculis magnis, oblongis, capitis fere longitudine; antennis capite paulo longioribus.

*Thorax* punctis serierum crassioribus,

*Coleoptera* subviridi-aenea.

*Habitat* — Mus. Prof. Hellwig.

- 27 *St. cephalotes*, niger, nitidus; elytris viridi-aeneis; antennis pedibusque fuscis; capite latiore quam thorax; hoc seriebus dorsalibus quadripunctis.

*Habitu* St. praecedentium; capite autem multo latiore.

*Longitudo*  $2\frac{3}{4}$  lin.

*Caput* orbiculatum, thorace latius; oculis parvis.

*Habitat* — Mus. Prof. Hellwig.

- 28 *St. brevicornis*, niger, nitidus; thorace seriebus dorsalibus quinque-punctis; capite orbiculato, antennis paulo brevioribus.

*Statura*, St. praecedentibus gracilior.

*Longitudo*  $5\frac{3}{4}$  lin.

*Caput* orbiculatum, thorace paulo angustius. Antennis capite vix brevioribus, rigidis, crassis; articulis sexto ad decimum transversis.

*Abdomen* gracile, elongatum; coleoptris plus triplo longius.

Habitat — Mus. Prof. Hellwig.

*similicornis Grav.*

29 *St. rigidicornis*, niger, nitidus; elytris aeneis; pedibus piceis; antennis brevibus; thorace seriebus dorsalibus quadri-punctis.

*Habitu* *St.* praecedentis; statura autem minorę; capite majore; thorace paulo longiore &c.

*Longitudo*  $2\frac{3}{4}$  lin.

*Caput* suborbiculatum, thoracis magnitudine; antennis *St.* praeced.

*Thorax* suborbiculatus, latitudine paulo longior, coleoptris angustior.

*Coleoptra* viridi-aenea.

Habitat — Mus. Prof. Hellwig.

*St. parvicornis*, niger, nitidus; elytris aeneis; capite ovato, antennis brevibus; thorace seriebus dorsalibus quadri-punctis.

*Habitu*, praecedentibus multo gracilior, quo cum varietatibus *St. fulvipedis* magis congruit.

*Longitudo*  $2\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* parvum, ovatum, thorace angustius; antennis *St. brevicornis*.

*Thorax* suborbiculatus, coleoptris angustior.

Habitat — Mus. Prof. Hellwig.

31 *St. carbonarius*, niger, nitidus; antennis pedibusque fuscis; thorace punctis aliquot obsolete impresso.

*Habitu St. brevicornis* (n. 28.) ; capite autem minore, antennis longioribus, thoracis punctis obsoletis &c., differt — A varietatibus quibusdam *St. nitidi*, capite minore, praecipue autem thoracis medio haud dilatato, distingui potest.

*Longitudo*  $3\frac{2}{3}$  lin.

*Caput* ovatum, thorace angustius; antennis capite duplo fere longioribus, articulis sexto ad decimum campanulatis.

*Habitat* — Mus. Prof. Hellwig.

○ 32 *St. marginatus*, niger, nitidus; thoracis margine laterali, pedibusque flavescens.

*Habitu St. variantis* (n. 21.).

*Longitudo* 3 — 4 lin.

*Caput* suborbiculatum, thorace minus; antennis capitis thoracisque longitudine.

*Thorax* seriebus dorsalibus quadripunctis, coleoptris paulo minor.

*Coleoptra* thorace paulo longiora, nitida, nigra; pilis brevissimis, tenuibus, cinereis, decumbentibus, tecta.

*Pedes*, capitibus femorum anteriorum, femoribusque flavis; tarsis, tibiis, geniculisque fuscis.

*Habitat* in Silvis montosis, in fimo bovino.

*St. marginatus* Fabr. Ent. Syst. St. n. 30.

- Payk. Mon. St. et Fn. Suec. St. n. 32.

- Olivier Ent. St. n. 33. pl. III. f. 29.

○ 33 *St. fulvipes*, ater, nitidus; clytris pedibusque rufo-testaceis; thorace seriebus dorsalibus sexpunctis.

*Statura*, St. praecedentibus gracilior.

*Longitudo*  $2\frac{1}{2}$  — 4 lin.

*Caput* parvum, ovatum, thorace angustius, nitidissimum, nigrum; antennis capite thoraceque paulo longioribus, extrorsum subcrassioribus, basi testaceis vel fuscis.

*Thorax* coleoptris paulo minor, niger, nitidus; seriebus marginalibus bi-, lateralibus tri-, dorsalibus sex-punctis.

*Coleoptra* thorace paulo longiora, subquadrata, nitida, confertissime subtilissimeque puncta, pilis brevibus tenuibus tecta, rufo-testacea.

*Abdomen* nitidum, nigrum; ventre, pectoreque subflavo-sericantibus.

Habitat in paludosis, sub vegetabilibus putrescentibus, tempore vernali.

*St. fulvipes* Fabr. Ent. Syst. St. n. 31.

- *cruentus* Oliv. Ent. St. n. 34. pl. V. f. 49.

Credo utique, me verum *St. fulvipedem* Fabr. descripsisse. Locus, quem in Fabr. Ent. Syst. obtinet, et comparatio ejus cum statura et magnitudine *St. marginati* hoc confirmant — Sunt, qui hunc Staphylinum ad *St. flavipedem* Fabr. (Ent. Syst. St. n. 39.) referunt, minus apte, uti mihi videtur, hujus enim in Systemate locus et descriptio dissuadent.

*St. fulvipes* Panzeri (Fn. Germ. H. 27. t. 9.) longe est diversa species, ad unum alterumve familiae quartae Staphylinum, forsan ad *St. ochraceum* (n. 65.) referenda.

34 *St. micans*, niger, nitidus; griseo-sericans; pedibus testaceis; thorace seriebus dorsalibus sexpunctis.

*Habitu* omnino *St. praecedentis*.

*Longitudo* 3 — 4 lin.

*Antennae* fuscae, basi pallidae.

*Caput et thorax nigri, nitidissimi, colore flavescente fugacissimo sericantes.*

*Coleoptra subquadrata, fuscescentia, pilis brevibus griseo-sericantibus vestita.*

*Abdomen subfusco-sericeum.*

*Habitat cum St. praecedente.*

*St. micans* — Mus. Prof. Knoch.

Quamquam autem hic *Staphylinus* et *St. fulvipes* ejusdem sunt staturae et puncturae, et quamquam socialiter vivunt, distinctae attamen species esse videntur. Inter specimina plura nunquam *St. fulvipes* „capite thoraceque sericantibus, „elytrisve grisescentibus,“ nec *St. micans* „elytris rufis, „absque colore flavescente fugaci capitis thoracisque“ mihi occurrerunt,

*4. 21.*

35 *St. opacus* niger, nitidus; pedibus subfuscescentibus; elytris subgrisescentibus; thorace seriebus dorsalibus quinque punctis,

*Habitu* *St. praecedentium*; statura autem subcrassiore.

*Longitudo* 2 —  $3\frac{1}{2}$  lin.

*Coleoptra*, quibusdam speciminibus, pilis brevissimis adpressis griseo-fuscescentibus, tecta; quibusdam autem fere nuda fuscescentia — Cave, ne horum individua quaedam cum varietate secunda *St. bipustulati* (n. 54.), cui similia sunt, confundes.

*Habitat* cum praecedentibus.

*St. opacus* — Mus. Prof. Knoch.

*4. 21.*

36 *St. nitens*, niger, nitidus; antennis pedibusque fuscis; elytris subgriseo-fuscescentibus; thorace seriebus dorsalibus quadripunctis.



*Habitu St. fulvipedis* (n. 33.); statura autem paulo gracilior.

*Longitudo*  $2\frac{1}{3}$  lin.

*Caput* subovatum, thorace angustius; antennis capitis thoracisque longitudine.

*Thorax* punctorum ordine *St. politii* (n. 19.).

*Habitat*, cum *St. praecedentibus*, in paludosis, sub vegetabilibus putrescentibus.

37 *St. nitidulus*, nigricans, nitidissimus; antennis, palpis, pedibusque pallidis; thorace seriebus dorsalibus quadripunctis; capite suborbiculato.

*Habitu St. splendiduli* (n. 60.) hujus autem familiae.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  — 2 lin.

*Caput* suborbiculatum, thorace minus, nitidissimum, laeve, punctis perpaucis basi impressum. Antennis capite longioribus; articulo ultimo subgloboso, suboblique truncato.

*Thorax* suborbiculatus, latitudine vix paulo longior, coleoptris paulo angustior, nitidissimus, laevis, seriebus punctorum *St. politii* (n. 19.); punctis autem ferè obsoletis.

*Pedes* rufi, vel rufo-testacci.

*St. nitidulus* — Mus. Prof. Knoch.

38 *St. attenuatus*, niger, nitidus; pedibus, antennis, palpisque pallidis; oculis magnis; abdomine longo.

*Statura*, *St. praecedentibus* procerior.

*Longitudo*  $3\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* orbiculatum, thorace vix angustius, nitidissimum. Oculis magnis oblongis. Antennis capite thoraceque brevioribus, luteis, apice fuscis.

*Thorax* coleoptrorum magnitudine, nitidissimus, laevis; punctis, marginali uno, lateralibus duobus, seriebus dorsalibus tripunctis, punctis autem obsoletis.

*Coleoptra* quadrata, subnuda, fuscescentia.

*Abdomen* gracile, apicem versus sensim attenuatum, coleoptris quinquies longius, nigrum.

*Pedes* testacei, tibiis posticis fuscescentibus.

Habitat Brunsvigae. —

39 *St. binotatus*, niger; pedibus, elytrorum apice, segmentorumque marginibus rufescentibus.

*Habitu* *St.* praecedentis; oculis autem parvis &c.

*Longitudo*  $2\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* suborbiculatum, thorace angustius, nitidissimum, laeve, punctis paucis basi impressum, nigerrimum; antennis, capite thoraceque vix brevioribus, fuscescentibus; palpis rufescentibus; oculis parvis.

*Thorax* coleoptris vix angustior, nitidissimus, glaber; punctis duobus dorsalibus, unoque marginali, distinctis, impressus; nigerrimus.

*Coleoptra* subquadrata, subtilissime puncta, nitidula, fuscescentia; marginibus lateralibus pallidioribus; apice, vel macula elytri singuli apicis, testacea.

*Abdomen* elongatum, apicem versus sensim angustatum, nigricans, subgriseo - sericeum; segmentorum marginibus rufescentibus.

*St. binotatus* — Mus. Prof. Knoch.

40 *St. albipes* niger, nitidus; antennis rufis; pedibus testaceis; capite subovato; thorace sericante, seriebus dorsalibus quadri-punctis.

*Statura*, *St. micante* (n. 34.) minor et latior, cui caeterum affinis est.

*Longitudo*  $1\frac{3}{4}$  lin.

*Caput* subovatum, thorace angustius. Antennis, capite plus duplo longioribus, palpisque fuscis.

*Thorax* niger, nitidus, colore fugacissimo griseo sericans, punctis *St. variantis* (n. 21.).

*Coleoptera* quadrata, thorace paulo longiora et latiora, nigra vel obscure-picea, pilis brevibus tenuibus tecta.

*Abdomen* nigrum vel obscure-piceum.

*Habitat* Brunsvigae.

41 *St. fuscus*, nigro-fuscus, nitidus; thorace pallidiore, seriebus dorsalibus obsolete quadripunctis; elytris pedibusque rufis; capite orbiculato.

*Habitu* *St. sequentis*; *statura* autem capiteque latioribus.

*Longitudo*  $2\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* orbiculatum, thoracis latitudine; antennis capite longioribus.

*Coleoptera* depilata.

*Habitat* — Mus. Prof. Hellwig.

42 *St. subuliformis* fuscus, nitidus; thorace, elytris, pedibusque pallidioribus; capite subovato.

*Habitu* varietatum minorum pallidiorum *St. nitidi* (n. 46.); corpore autem graciliore, thorace haud dilatato.

*Longitudo*  $2\frac{2}{3}$  lin.

*Caput* subovatum, thorace paulo angustius, nitidissimum, nigrum. Antennis capite longioribus.

*Thorax* laevis, impunctus, rufus.

*Coleoptra et pedes rufo - testacei.*

*St. subuliformis* - Mus. Prof. *Knoch.*

- 43 *St. terminatus*, fuscus, nitidus; pedibus, elytris, thoracisque margine postico, rufis; thorace seriebus dorsalibus quadripunctis.

*Habitu* *St. praecedentis*; statura autem paulo majore, antennarum articulo primo crassiore.

*Longitudo* 3 lin.

*Caput* orbiculatum, thoracis magnitudine, nitidissimum, nigro-fuscum; clypeo, palpis, antennisque pallidioribus; his capite paulo longioribus, articulo primo paululum longiore et crassiore quam in cospeciebus hujus familiae.

*Thorax* coleoptris paulo angustior, seriebus dorsalibus quadripunctis, nitidissimus, obscuro-fuscus; margine basis rufo.

*Coleoptra* nitida, rufo-fusca.

*Abdomen* fuscum; marginibus segmentorum pallidioribus; subgriseo-sericans.

*St. terminatus* — Mus. Prof. *Knoch.*

- 44 *St. fragilis*, fuscus, nitidus; thorace rufo, seriebus dorsalibus quadripunctis; elytris pedibusque testaceis; capite orbiculato.

*Habitu* omnino *St. subuliformis* (n. 42.); statura autem graciliore.

*Longitudo*  $2\frac{2}{3}$  lin.

*Habitat* — Mus. Prof. *Hallwig.*

45 *St. lepidus* niger; antennis, pedibus, segmentorumque marginibus piccis; clytris rufescentibus; thorace seriebus dorsalibus quadripunctis; capite ovato.

*Habitu* *St. fulvipedis* (n. 33.); capite autem latiore.

*Longitudo*  $2\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* thorace angustius; antennis capite longioribus.

*Habitat* — Mus. Prof. *Hellwig*.

46 *St. nitidus*, nitidus; thorace medio latiore, angulis anticis declivis glabris; capite suborbiculato.

*Caput* suborbiculatum vel subovatum, plerumque thorace paulo angustius, interdum autem thoracis latitudine. *Antennis* vel capite vix longioribus, crassis, articulis sexto ad decimum pateraeformibus; vel capitis thoracisque longitudine, extrorsum vix crassioribus, articulis quarto ad decimum campanulatis.

*Thorax* medio latior characterem sistit, quo haec species facile ab omnibus praecedentibus distinguitur. Plerumque glaberrimus laevissimus est, puncto tantum uno alterove majore impressus; rarius puncto, marginali uno, lateralibus duobus, et seriebus dorsalibus tripunctis; punctis interdum obsoletis vel confluentibus.

*Coleoptera* quadrata, thoracis latitudine, nitida, plerumque pilis brevibus tenuibus obsita, rarius nuda.

*Pedes* tarsis anticis, speciminibus quibusdam, dilatatis, quibusdam autem, gracilibus.

Inter omnes Staphylinorum species haec facile plurimum variat, tam colore et magnitudine corporis, quam partium quarundam forma et proportione.

*Var. 1 St. nigerrimus*; antennarum apice fusca; longitudine 5 lin.

*Var. 2 St. niger*; antennarum apice tarsisque fuscis; longitudine 3 — 5 lin.

*Var. 3 St. niger*; antennis pedibusque fuscis; sutura rufa; longitudine  $3\frac{1}{2}$  lin.

*Var. 4 St. niger*; antennis, segmentorumque marginibus, fuscis; pedibus testaceis; longitudine 3 lin.

*Var. 5 St. niger*; thorace, pedibusque fuscis; sutura rufa; longitudine 3 lin.

*Var. 6 St. niger*; antennis segmentorumque marginibus fuscis; elytrorum marginibus, pedibusque rufis; longitudine 4 lin.

*Var. 7 St. nigro-fuscus*; capite, coleoptrisque obscurioribus; longitudine  $4\frac{1}{2}$  lin.

*Var. 8 St. fuscus*; capite nigro; pedibus testaceis; longitudine 4 lin.

*Var. 9 St. niger*; antennis, segmentorum marginibus, suturaque fuscis; pedibus testaceis; longitudine 3 lin.

*Var. 10 St. rufo-fuscus*; capite, thoraceque nigris; longitudine  $2\frac{3}{4}$  lin.

*Var. 11 St. niger*; antennis, elytris pedibusque fuscis; longitudine 4 — 5 lin.

*Var. 12 St. niger*; antennis pedibusque fuscis; coleoptris castaneis; longitudine 5 — 6 lin.

*Var. 13 St. niger*; abdomine pedibusque fuscescentibus; elytris testaceis; longitudine 3 lin.

Haec varietas speciminum, quam magna etiam in hac specie sit, attamen non sufficit ad plures novas species con-

dendas. Varietates enim omnes, una sensim in alteram, ita transeunt, ut nulla certis finibus gaudeat.

Habitatio horum Staphylinorum haud minus multiplex est; habitant enim sub cortice arborum putrescente, in boletis, in fimo, immo, quamvis rarius, in floribus.

*St. nitidus* Fabr. Ent. Syst. St. n. 24.

- *Payk. Mon. St. et Fn. Succ. St. n. 30.*

- *Schrank Boic. n. 864.*

- *saxatilis Rossi Fn. Etr. n. 615.*

- *Schrank Austr. n. 442.*

- *fulvopterus Fourcr. Ent. Par. St. n. 11.*

*Geoffr. Hist. St. n. 11.*

Staphylinus huic similis *St. picipennis* Payk. (Fn. Succ. n. 8.) esse videtur; an eadem species? Fabricii autem *St. picipennis* huc non est numerandus; auctor enim staturam ei omnino *St. similis* tribuit.

*St. nitidus*, quem Dom. Panzer (Fn. Germ. H. 27. t. 8.) exhibuit, longe est diversa species, ad *St. glabrum* (n. 67.) referenda.

047 *St. corfuscus*, niger, nitidus; elytris rufis; thorace seriebus dorsalibus quinque-punctis.

*Habitu* *St.* praecedentis; statura autem graciliore, capite minore, thorace medio angustiore.

*Longitudo*  $3\frac{1}{2}$  — 4 lin.

*Caput* subovatum, thorace angustius; antennis, capite duplo longioribus.

*Coleoptra* quadrata subdepilata.

Habitat in fimo, rarior.

- 48 *St. tristis* niger, nitidissimus; antennarum articulo primo, palpisque rufis; thorace seriebus dorsalibus tripunctis.

*Habitu* *St. nitidi* (n. 46.); corpore autem latiore, oculis magnis, thorace medio angustiore &c.

*Longitudo* 5 lin.

*Caput* orbiculatum, thoracis latitudine. Oculis magnis oblongis. Antennis, capite paulo longioribus, fuscis, articulo primo rufo.

*Thorax* punctis, marginali uno, lateralibus duobus, seriebus dorsalibus tripunctis.

*Coleoptera* quadrata, thoracis latitudine, opaca, puncta; punctis subtilioribus quam in speciebus praecedentibus; pilis brevissimis, praecipue marginem lateralem versus, tecta.

*Abdomen* nigrum, subaeneum.

*Pedes* nigri; tarsis fuscis, anticis dilatatis.

*Habitat* Brunsvigae, raro.

*St. tristis* Fabr. Ent. S) st. St. n. 21.

- 49 *St. fuliginosus*, niger, nitidus; elytris opacis; antennis tarsisque fuscis; thorace medio latiore, seriebus dorsalibus tripunctis.

*Habitu*, varietatibus majoribus nigris *St. nitidi* similis; corpore autem latiore, coleoptris opacis. A *St.* praecedente oculis parvis, et thorace lato differt.

*Longitudo*  $4\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* orbiculatum, thorace vix angustius. Antennis capite paulo longioribus.

*Pedes* antici tarsis dilatatis.

*Habitat* — Mus. Prof. Hellwig.



50 *St. lateralis*, niger, nitidus; coleoptrorum margine laterali rufo; antennis tarsisque fuscis.

*Habitu St. nitidi* (n. 46.).

*Caput* suborbiculatum. *Antennis* capite paulo longioribus.

*Thorax* seriebus dorsalibus obsolete quadripunctis; punctis confluentibus.

*Pedes* antici tarsis dilatatis.

*St. lateralis* — Mus. Prof. Hellwig.

*Payk.*

51 *St. impressus* niger, nitidus; elytris rufo-marginatis, tripuncto-striatis.

*Habitu St. nitidi* (n. 46.); thorace autem minus declivo.

*Longitudo* 4 lin.

*Elytra* tripuncto-striata hanc speciem ab omnibus similibus satis discernunt.

*St. impressus* Panz. Fn. Germ. H. 36. t. 21.

- *cinctus* Payk. Fn. Suec. St. n. 37.

*Habitat* — Mus. Prof. Hellwig.

52 *St. debilis*, niger, nitidus; elytris piceo-testaceis; thorace seriebus dorsalibus quinque-punctis; capite suborbiculato.

*Habitu*, *St. praecedentibus* gracilior.

*Longitudo* 2 lin.

*Caput* suborbiculatum, thorace angustius, nigrum; antennis, capite longioribus, fuscis.

*Thorax* lateribus minus deflexis quam in conspeciebus hujus familiae; seriebus marginalibus bi-, lateralibus tri-, dorsalibus quinque-punctis.

*Abdomen*, apicem versus attenuatum, atrum; infra, segmentorum marginibus fuscis.

*Pedes* fuscis.

*Habitat* — Mus. Prof. Hellwig.

53 *St. sanguinolentus*, niger, nitidus; elytris sanguineo-notatis; sutura sanguinea; thorace seriebus dorsalibus quinque punctis.

*Habitu St. variantis* (n. 21.); capite autem orbiculato, sutura semper sanguinea, qua etiam optime a speciebus duobus sequentibus discernitur, quae nunquam sutura sanguinea occurrunt.

*Longitudo*  $2\frac{2}{3}$  — 4 lin.

Variat elytrorum signaturis:

*Var. 1 St.* coleoptris pallido-sanguineis; margine laterali et postico nigris; pedibus pallidioribus.

*Var. 2 St.* elytris nigris; marginibus sanguineis; pedibus pallidis.

*Var. 3 St.* elytris nigris; striga humerali, suturaque sanguineis.

*Var. 4 St.* elytris nigris; puncto humerali, suturaque dimidia, sanguineis.

*Var. 5 St.* elytris nigris; sutura sanguinea.

*Var. 6 St.* coleoptris nigris; sutura sanguinea.

*Var. 6 St.* coleoptris nigris; vitta arcuata sanguinea. —

Arcus incipit summo elytrorum humero, et medio suturae sanguineae jungitur. Oritur, striga humerali elytrorum varietatis tertiae prolongata et sutura sanguinea conjunctis.

Inter multa hujus speciei specimina individuum vidi unicum varietatis sextae, thorace seriebus dorsalibus sex-punctis.

Habitat frequens in fimo bovino et equino, cum *St.* sequentibus.

*Inclm.*  
 ○ 54 *St. bipustulatus*, niger, nitidus; elytris sanguineo-notatis; sutura nigra; thorace seriebus dorsalibus quinque-punctis.

*Habitu* *St.* praecedentis; capite autem angustiore, suborbiculato; sutura semper nigra. — *A. St.* sequente corpore minus glabro et nitido, colore elytrorum obscuriore, thorace seriebus dorsalibus quinque-punctis, facile distingui potest.

*Longitudo* 2 —  $3\frac{1}{4}$  lin.

*Variat* elytrorum signaturis.

*Var. 1 St.* elytris, macula oblonga laterali sanguinea.

*Var. 2 St.* elytris subrufo-nitentibus.

*Var. 3 St.* elytris, macula apicis sanguinea.

*Var. 4 St.* elytris, striga humerali sanguinea.

*Var. 5 St.* elytris striga disci sanguinea.

*Var. 6 St.* elytris, puncto humerali sanguineo.

*Var. 7 St.* elytris, puncto humerali et striga discoidali, sanguineis, confluentibus.

Habitat in fimo cum *St.* praec.

*St. bipustulatus* Panzer *Fn. Germ. H.* 27. t. 10.

~ *varians* Payk. *Mon. St. et Fn. Suec. St. n.* 33. β.

Haereo, an *St. bipustulatum* Fabr. (*Ent. Syst. St. n.* 34.) huc referam.

*St. bipustulatus Rossii* (Fn. Etr. n. 602.) potius ad Aleo-  
charam quamdam, statura et habitu *Al. fuscipedis* vel *bi-*  
*punctatae* &c. referendus est, quod descriptio hujus insecti  
„thorax gibbus, clytra rotundata,“ longitudo, latitudo et  
habitatio probant. Loco, e *Rossii* Fn. Etr. allegato, delenda  
ergo sunt citata „Fabr. E. S. Staph. n. 34“ nec non  
„Panzeri Fn. Ins. G. H. 16. t. 21,“ quae *Oxyporum bipustu-*  
*latum Fabr.* exhibet, insecta plane diversa.

*varius Gyll a. . .*

- 55 *St. bimaculatus niger*, nitidissimus, elytrorum macula  
magna rufo-testacea; thorace seriebus dorsalibus quadri-  
punctis.

*Habitu* *St.* praecedentis; capite autem thoraceque glabris  
nitidissimis; hoc, seriebus dorsalibus quadripunctis &c.

*Longitudo* 3 —  $3\frac{3}{4}$  lin.

*Thorax* punctorum distributione *St. politii* (n. 19.).

*Elytra* vel testaceo-rufa, marginibus nigris; vel nigra,  
macula apicis magna rufo-testacea, semper pallidiora quam  
in *St.* praecedente.

*Habitat* cum *St.* praecedente; rarius autem occurrit.

- 56 *St. discoideus*, niger, nitidus; palpis, antennis, pedibus,  
elytrorum segmentorumque marginibus rufis; thorace serie-  
bus dorsalibus quinque punctis.

*Habitu* *St. sanguinolenti* (n. 53.); statura autem paulo cras-  
siora; capite orbiculato, thoracis latitudine; antennis capite  
paulo longioribus.

*Longitudo*  $2\frac{1}{2}$  lin.

*Habitat* — Mus. Prof. Hellwig.

57 *St. ochropus*, niger, nitidus; antennis fuscis; pedibus pallidioribus; thorace seriebus dorsalibus quinque-punctis.

*Habitu* plurimorum hujus familiae Staphylinorum; thorace autem paulo longiore.

*Longitudo* 2 —  $2\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* suborbiculatum, thoracis magnitudine; palpis antennisque fuscis; his articulo ultimo vix oblique truncato, potius ovato obtuso.

*Thorax* sub-orbiculatus, antice vix angustior vel deflexus; latitudine paulo longior; seriebus dorsalibus quinquerarius sex-punctis.

*Coleoptra* subquadrata, thoracis latitudine, viridi-vel nigro-aenea.

Habitat in montosis sylvosis, in stercore equino et bovino.

58 *St. tenuis*, niger, nitidus; thorace, coleoptrorum dimidia parte posteriore, pedibusque rufo-testaceis.

*Habitu* caeterarum hujus familiae specierum; thorace autem longiore; antennarum articulo ultimo haud oblique-truncato, sed obtuso ovato.

*Longitudo* 2 lin.

*Caput* ovatum, glaberrimum, laevissimum, thorace paulo angustius.

*Thorax* subovatus, antice vix angustatus vel deflexus, nitidus, seriebus dorsalibus sex-punctis; punctura *St. fulvipedis* (n. 33.).

*Pedes* fusci, femoribus testaceis.

Habitat sub lapidibus, in colle graminoso aprico, prope  
Brunsuigam, rarissimus; semel tantum captus, tempore  
vernali.

*St. tenuis* Fabr. Ent. Syst. St. n. 43.

*Paederus dimidiatus* Panzer Fn. Germ. H. 27. t. 24.

#### Fam. IV.

*Corpus* lineare, nitidum.

*Caput* angulatum, angulis obtusis, punctum, thoracis cir-  
citer magnitudine. *Antennis*, articulo primo magno cla-  
vato; secundo et tertio brevioribus clavatis, ultimo ova-  
to - acuto.

*Thorax* oblongus, angulis obtusis; punctus.

*Coleoptra* elongata, thoracis magnitudine.

*Haemaphysalis*

59 *St. rufipennis*, niger, nitidus; antennis pedibusque fuscis;  
clytris rufis; capite thoraceque multipunctis.

*Longitudo*  $4\frac{2}{3}$  lin.

*Caput* orbiculato-angulatum, thorace paulo latius, mul-  
tipunctum. Mandibulis palpisque gracilibus longis. Anten-  
nis capite longioribus, articulis mediis campanulatis.

*Thorax* latitudine paulo longior, basin versus subangu-  
stus; angulis anticis deflexis; multipunctus, subpuncto-  
striatus; medio nitidissimus, laevissimus.

*Coleoptra* latitudine paulo longiora, thoracis latitudine,  
nitida, puncta.

*Pedes*, tarsi tenuibus.

Habitat — Mus. Prof. Hellwig.

60 *St. splendidulus*, nitidus, obscurus; antennis, elytris, segmentorum marginibus, pedibusque pallidioribus; thorace seriebus dorsalibus quinque-punctis.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  — 2 lin.

*Caput* oblongum, thoracis latitudine, laeve; punctis aliquot impressum; nigrum; palpis, antennisque rufis; his capite paulo longioribus, articulis sexto ad decimum pateraeformibus.

*Thorax* oblongus, basin versus subangustatus, coleoptris paulo angustior; punctura *St. opaci* (n. 35.).

*Coleoptra* subrectangula, nitida, puncta, depilia.

Color hujus speciei variat:

*Var. 1* *St. niger*; antennis, elytris, segmentorumque marginibus fuscis; pedibus rufis Adultior.

*Var. 2* *St. fuscus*; capite nigro; pedibus, segmentorumque marginibus testaceis — Junior.

*St. splendidulus* — Mus. Prof. Knoch.

61 *St. nigrutilus*, nitidus, nigricans; antennarum basi, pedibus, palpisque rufescentibus; thorace ovato, seriebus dorsalibus quinque-punctis.

*Habitu* *St. praecedentis*; differt autem thorace subovato, nec basin versus angustato; antennis longioribus.

*Longitudo*  $1\frac{1}{3}$  lin.

Habitat Brunsvigae.

*St. aterrimus*, niger, nitidus; palpis, antennis, pedibusque fuscis; thorace seriebus dorsalibus sexpunctis.

*Habitu*, *St. splendidulo* (n. 60.) paulo gracilior; nitore minus fulgido, antennis rigidioribus.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* oblongum, angulis obtusis, basin versus paulo angustatum, nitidissimum, laeve, in angulis basis punctum; nigrum; antennis rigidis capite paulo longioribus, palpisque obscure fuscis.

*Thorax* rectangulus, angulis obtusis; punctura *St. fulvipedis* (n. 33.).

*Coleoptra* subrectangula, thorace paulo longiora et latiora, confertim puncta, pilis brevibus tenuibus parvis vestita.

*Pedes* rufo-fusci.

Habitat sub vegetabilibus putrescentibus, tempore vernali, haud frequens.

*in var. 60.*

63 *St. parvulus*, niger, nitidus; pedibus, antennis, palpisque rufo-testaceis, thorace scribebus dorsalibus quinque-punctis.

*Habitu*, *St. praecedentibus* gracilior; capite apicem versus angustato; articulo primo antennarum crassissimo &c.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Corpus* filiforme, gracile, nitidum.

*Caput* oblongum; basi latum obtusum, apicem versus sensim angustatum; punctum, medio nitidissimum laevissimum; nigrum, palpis antennisque rufis apice fuscis. *Antennis* capite paulo longioribus; articulis, primo longissimo crassissimo clavato, secundo et tertio brevibus, quarto ad decimum pateraeformibus, latitudine crescente.

*Thorax* basin versus paululum angustatus; angulis anticis deflexis; nitidissimus, punctura *St. opaci* (n. 35.).



*Coleoptera* rectangula, thoracis magnitudine, nitida, confertim puncta, pilis brevibus tenuibus sparsim vestita, obscure picea.

*Abdomen* elongatum, apicem versus sensim attenuatum, nigrum; marginibus segmentorum obscure rufis.

Habitat sub cortice arborum demortuarum, rarissimus; Semel etiam captus in flore *Crataegi Oxyacanthae*.

<sup>Staphylinus</sup> 64 *St. linearis*, niger, nitidus; pedibus testaceis; thorace seriebus dorsalibus multipunctis.

*Habitu* *St. sequentis*; statura autem multo minore, thoracisque punctura differt.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Thorax* seriebus marginalibus bi-, lateralibus tri-, dorsalibus sex- ad octo-punctis.

*St. linearis* — Mus. Prof. *Knock*.

<sup>linearis</sup> 65 *St. ochraceus*, nitidus; colore variabili; thorace seriebus dorsalibus et lateralibus multi-punctis.

*Habitu* *St. parvuli* (n. 63.) thorace autem longiore et basin versus angustiore, abdomine obtuso &c.

*Longitudo* 2 — 3 lin.

*Caput* nitidum, punctum; punctis subtilissimis, haud confertis; medio nitidissimum laevissimum.

*Thorax* oblongus, basin versus sensim angustatus; seriebus dorsalibus novem- ad sedecim-punctis, lateralibus septem- vel octo-punctis, marginalibus tri-punctis; punctis subtilibus. — Series lateralis et marginalis apice ita inclinatae sunt, ut, junctim, figuram pedi episcopalis exhibeant.

*Coleoptera* rectangula, puncta, vel subpuncto-striata.

Color variabilis est:

*Var. 1 St. niger*; elytris obscure piceis; pedibus antennisque rufis.

*Var. 2 St. niger*; thorace, elytris, antennisque fuscis; pedibus rufo-testaceis.

*Var. 3 St. niger*; antennis, elytris, pedibusque rufis.

*Var. 4 St. fuscus*; capite nigro; elytris piceis; pedibus antennisque rufis.

Habitat sub cortice arborum putrescentium, sub lapidibus in uliginosis.

*St. ochraceus* — Mus. Prof. Knoch.

*affinis Payk.* Fn. Suec. St. n. 16?

- *linearis Olivier* Ent. St. n. 21. pl. IV. f. 38?

- *fulvipes Panzer* Fn. G. H. 27. t. 9.

*Paederus fulvipennis Panzer* Fn. Germ. H. 27. t. 23?

*Paederus testaceus Olivier* Ent. Paed. n. 3. pl. I. f. 6? ?

Omnia hic citata insecta, habitu et magnitudine corporis, partiumque forma ac proportione *St. ochraceo Knochii* simillima sunt, uti figurae et descriptiones eorum exhibitae probant. Plurima autem seriebus punctorum thoracis carent, et, nisi incuria delineatorum hae series omissae sint, quod jure suspicor, ad alias species removenda sunt. Quam parum autem rationis hucusque serierum punctorum thoracis habitum est, figurae nec non descriptiones Staphylinorum, in Olivieri Entomologia exhibitae, Panzeri Fauna Insectorum Germaniae, et multa alia opera, in quibus Staphylini tractantur, probant, seriebus punctorum vel omnino omissis, vel horum numero neglecto. — His coactus, synonyma *St. ochracei* interrogative tantum allegavi, *St. fulvipede Panzeri* excepto, qui, seriebus thoracis in figura exhibitis,

omni jure huc referri potest, nec ad *St. fulvipedem Fabr.*, quem Fabricius ipse, ratione staturae et magnitudinis, cum *St. marginato*, insecto satis distincto, comparat. — *Paederum fulvipennem Panzeri* potius ad hunc Knochii Staphylinum, quam ad *P. fulvipennem Fabr.* referre volui, cum Fabricius ipse dixerit, hunc Paedero elongato paulo majorem et ei affineum esse, quod e figuris, in Panzeri Fauna delineatis, nemini sane apparebit.

*specimens Panzeri*

66 *St. elongatus*, nitidus, thorace seriebus dorsalibus quinque-vel sex-punctis, lateralibus septem-vel octo-punctis.

*Habitu* omnino *St. praecedentis*; statura autem paulo majore; punctis capitis thoracisque crassioribus

*Longitudo*  $2\frac{1}{2}$  —  $3\frac{1}{2}$  lin.

*Thorax*, seriebus lateralibus et marginalibus eodem modo junctis ut in *St. praecedente*.

*Color* variat:

*Var. 1 St. fuscus*; antennis, elytris, pedibusque rufescentibus.

*Var. 2 St. niger*; antennis, elytris, ano, pedibusque fuscis.

*Var. 3 St. niger*; antennis, ano, pedibusque fuscis.

*Var. 4 St. niger*; pedibus, segmentorumque marginibus rufescentibus.

*Var. 5 St. nigerrimus*; elytris semper puncto-striatis. — Punctura crassissima, magnitudine maxima insignis.

*Habitat* haud raro in fimo equino et bovino, primo vere.

*St. elongatus Fourcr. Ent. Par. St. n. 27.*

*Staphylinus fuscus*  
 67 *St. glaber* niger, nitidus; antennis fuscis; elytris pedibusque rufo-testaceis; thorace seriebus dorsalibus sex - ad novem - punctis.

*Habitu* omnino *St. duorum* praecedentium; ratione autem numeri et crassitiei punctorum, inter illos medium tenet. Thoracis seriebus lateralibus et marginalibus *St. praecedentium*.

Longitudo  $2\frac{3}{4}$  — 4 lin.

Caput, thorax et abdomen glaberrima, colore semper nigerrimo. Elytra et pedes rufi vel testacei.

Habitat in stercore sicciorum.

*St. nitidus* Panzer Fn. G. H. 27. t. 8.

Geoffr. Hist. St. n. 10. N. B.?

*tricolor F.*  
 68 *St. elegans*, nigro-fuscus; thorace nigricante, antice rufescente, seriebus dorsalibus quinque - punctis; elytris pedibusque testaceis.

*Habitu* *St. praecedentium*; punctorum numero *St. elongati*, subtilitate *St. ochracei*.

Longitudo  $3\frac{1}{2}$  — 4 lin.

Habitat Mus. Prof. Hellwig.

*St. elegans* Olivier Ent. St. n. 20. pl. V. f. 50.

- *tricolor* Payk. Mon. St. n. 23.

- Payk. Fn. Suec. St. n. 15.

An *Paederus tricolor* Fabr. eadem sit species, dubito, quia punctorum thoracis nulla facta est mentio.

*Staphylinus*  
 69 *St. ustulatus* niger, nitidus; limbo coleoptorum, ano, pedibus, antennis, palpisque rufis; thorace laevissimo.

*Habitu* *St. praecedentium*; statura autem minus gracili.

*Longitudo* 4 lin.

*Caput* oblonguin, nitidissimum, laeve; punctis aliquot lateribus impressum, vix thoracis longitudine et latitudine; nigrum; antennis, capitis longitudine, palpisque rufis.

*Thorax* basin versus vix angustatus, niger, nitidissimus; punctis paucissimis, quatuor vel sex, impressus.

*Coleoptera* thorace paulo longiora, ejus vero latitudine, nitida, subpuncta, rufa, medio nigra.

*Abdomen* nitidum, obscure fuscum; ano rufo.

*Pedes* rufi; tarsi anticis dilatatis.

*Habitat* Brunsvigae.

*Staphylinus fulminans*

70 *St. fulminans*, nitidus, nigro-fuscescens; antennis, elytris, pedibusque rufis; thorace laevi.

*Habitu* et *statura* *St. praecedentis*, et forte mera ejus varietas. — A *St. sequente*, cui caeterum habitu similis est, *statura* minore et angustiore, thorace punctis paucissimis obsoletis impresso, pedibus totis rufis, capite angustiore, antennis gracilioribus, differt.

*Longitudo*  $3\frac{2}{3}$  — 5 lin.

*Caput* ovatum, nitidum, subpunctum, thoracis magnitudine.

*Thorax* subrectangulus, laevis, punctis vagis, quatuor vel sex, impressus.

*Coleoptera*, thoracis magnitudine, puncta, puncto-striata.

*Abdomen* obscurum, ano pallido.

*Pedes*, tarsi anticis dilatatis.

*Habitat* — Mus. Prof. Hellwig.

*St. fulgidus* Olivier Ent. St. n. 19. pl. IV. f. 34.

*Paederus fulgidus* Panzer Fn. Germ. H. 43. t. 20.

*St. fulgidus* niger, nitidus; antennis fuscis; elytris tarsisque rufis; thorace seriebus dorsalibus quinque-punctis.

- 71 *St. fulgidus* niger, nitidus; antennis fuscis; elytris tarsisque rufis; thorace seriebus dorsalibus quinque-punctis.  
*Habitu* omnino *St. praecedentis*; statura autem majore et latiore, thoracis punctura, femoribus tibiisque nigris, diversus.

*Longitudo* 5 lin.

*Habitat* — Mus. Prof. Hellwig.

*St. fulgidus* Payk. Mon. St. n. 22.

— *Payk.* Fn. Succ. St. n. 14.

*Paederus fulgidus* Fabr. E. S. Paed. n. 6.

- 72 *St. alternans*, nitidus, rufus; capite, elytris, abdominisque apice nigris; capite quadrato.

*Habitu* *St. praecedentium*; statura autem graciliore, capite quadrato.

*Longitudo*  $2\frac{3}{4}$  — 4 lin.

*Corpus* filiforme, gracile, nitidum.

*Caput* suborbiculatum vel quadratum angulis obtusis, nitidissimum, laeve, punctis perpaucis basi impressum; antennae capite longioribus.

*Thorax* nitidissimus, punctis perpaucis vagis impressus, capite angustior.

*Coleoptera* nitidissima, laevissima, nec puncta, nec puncto-striata.

*Abdomen* rufum, apice nigrum; ano attamen rufo.

*Pedes*, tarsi anticis dilatatis.

Color coleoptrorum variat.

*Var. 1 St.* major; coleoptris totis nigris.

*Var. 2 St.* minor; coleoptris nigris, basi albescentibus.

Habitat sub cortice arborum demortuarum.

*St. alternans* — Mus. Prof. Knoch.

73 *St. palmula* niger, nitidus; abdominis basi rufa; antennis, pedibusque testaceis; capite quadrato.

Longitudo  $2\frac{1}{3}$  lin.

*Caput* quadratum, nitidum, punctum, thorace vix latius, nigrum; ore antennisque testaceis; his, structura et longitudine ut in *St.* praecedente.

*Thorax* latitudine paulo longior, subquadratus, nitidus, coleoptrorum magnitudine, punctis perpaucis vagis impressus.

*Coleoptra* subquadrata, nitida, laevia.

*Abdomen*, longitudine dimidii corporis, apicem versus sensim dilatatum, coleoptris multo latius, nitidum, punctum, rufum; segmentis penultimo et antepenultimo nigris.

*Pedes* rufo-testacei.

*St. palmula* — Mus. Prof. Knoch.

74 *St. cinerascens*, niger, subopacus; elytris pedibusque rufescentibus; thorace puncto-substriato.

*Longitudo* 2 lin.

*Caput* quadratum, angulis obtusis, thorace paulo latius, subnitidum, confertim punctum (antennae desunt.).

*Thorax* oblongus, subrectangulus, angulis obtusis; punctus, subpuncto-striatus, medio laevis nitidissimus; coleoptris angustior et brevior.

*Coleoptra* rectangula, subtilissime puncta, opaca, subfuscescente-sericantia.

*Abdomen* subfuscescente-sericans.

*Pedes* pallidi, rufo-fusci.

*St. cinerascens* — Mus. Prof. Knoch.



## Genus II.

## Lathrobium.

Palpi acuminati.

Thorax oblongus, punctus.

*Corpus* elongatum.

*Caput* supra convexum, infra planum; punctum — *Palpi* acuminati; anteriores quadri-articulati; posteriores tri-articulati — *Antennae* filiformes; articulis primo maximo, secundo brevi, tertio majore, clavatis; sequentibus suborbiculatis; ultimo ovato acuto — *Oculi* parvi.

*Thorax* elongatus, angulis obtusis, convexus, lateribus declinatus, punctus. *Ora* laterali deflexa, glaberrima, basi lata, apicem versus angustata.

*Coleoptra* rectangula, subdepressa, thorace paulo longiora, lateribus deflexa.

*Abdomen* marginatum, supra et infra convexum.

*Pedes* cursorii — *Capitibus* femorum approximatis; anterioribus femore duplo brevioribus et multo gracilioribus; posticis brevissimis, absconditis — *Femoribus* crassiusculis (brevioribus et validioribus quam in genere praece-

dente) — Tibiis ciliatis — Tarsis; articulis brevibus, omnibus longitudine aequali; anticis plerumque dilatatis.

1 *L. castaneum*, fuscum, nitidum; infra pallidum; pedibus testaceis; thorace, seriebus dorsalibus multi-punctis.

*Habitu* L. sequentium; seriebus autem punctorum thoracis, nitore splendidiore, pedibus gracilioribus, hoc genus cum familia ultima Staphylinorum nectitur

*Longitudo*  $2\frac{1}{3}$  lin.

*Caput* magnitudine thoracis; nitidum, punctum, rufo-fuscum; infra testaceum.

*Thorax* paulo convexior et angulis rotundioribus, quam caeteris Lathrobiis; nitidus; lateribus multi-punctus; dorso laevissimus, seriebus duabus decem-punctis; rufo-fuscus, infra testaceus.

*Coleoptra* subrectangula, nitida, puncta, rufo-fusca.

*Abdomen* supra fuscum, infra basi rufum seu testaceum.

*Pedes* graciles (ut in Staphylinis); testacci.

*Staphylinus* — Mus. Prof. Knoch.

2 *L. multipunctum*, nitidum, rufo-piceum, abdomine fusco.

*Longitudo* 3 lin.

*Caput* suborbiculatum sive quadratum angulis obtusis, nitidum, confertim punctum, rufescens; oculis nigris; thorace latius sed brevius.

*Thorax* subrectangulus; angulis obtusis; basin versus subangustatus; punctus; linea media longitudinali, obsoleta, laevissima; rufescens.

*Coleoptra* rectangula, thorace latiora, puncta, piceo-testacea.

*Abdomen nigricans.*

*Pedes rufo-testacei; tarsis anticis subdilatis.*

*Paederus multip.* — Mus. Prof. Knoch.

- 3 *L. badius*, fuscum, infra pallidius; antennis palpisque rufis; pedibus testaceis.

*Longitudo 5 lin.*

*Caput* ovatum; thorace latius; nitidum, subtiliter punctum; supra fuscum, infra testaceum seu rufum. Clypeo testaceo. Mandibulis arcuatis, gracilibus, acutis. Palpis, antennisque pallide rufis.

*Thorax* rectangulus, capitis longitudine, nitidus, rufofuscus, punctus; punctis irregularibus rugosis.

*Coleoptera* rectangula, thorace latiora, nitida, puncta, ad suturam subpuncto-striata; rufescentia.

*Abdomen* rufo-fuscum, versus apicem pilosum.

*Pedes* tenues, rufi; femoribus testaceis; tarsis anticis tenuibus.

*Paederus badius* — Mus. Prof. Knoch.

- 4 *L. longulum*, nigrum, nitidum; ore, antennis, pedibusque rufo-testaceis.

*Habitu* *L. praecedentis*; statura autem multo minore et graciliore.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* ovatum; basi latum, thorace latius, apicem versus angustatum; punctum, nitidum, nigrum; ore antennisque rufis vel fuscis, his capite duplo longioribus.

*Thorax* rectangulus, angustus, nitidus, punctus, niger; linea media longitudinali glaberrima.

*Coleoptra* *rectangula*, thorace paululum latiora, nitida, subtiliter puncta.

*Pedes* rufi vel testacei; tarsis anticis dilatatis.

*Paederus longulus* — Mus. Prof. Knoch.

- 5 *L. fracticorne* nigrum, nitidum; pedibus testaceis; antennarum articulo primo longissimo clavato.

*Habitu* *L. elongati* (n. 8.); statura autem graciliore, nitore paululum splendidiore, antennarum articulo primo capitatis fere longitudine.

*Longitudo*  $2\frac{1}{3}$  lin.

*Caput* magnum, oblongum, thoracis latitudine, nitidum, punctum. Ore productø. Antennis capite thoraceque vix brevioribus; articulis, primo longissimo clavato, secundo minimo, caeteris subcrescentibus, ultimo obtusiusculo; articulus primus plerumque cum reliqua antennae parte angulum format, recto paululum majorem,

*Thorax* nitidus, niger, punctus, medio laevissimus; punctis, in strias interdum subdispositis, impressus.

*Pedes* testacei; tarsis anticis subtenuibus.

*Habitat* Brunsvigae.

*Paederus fracticornis* Payk. Fn. Suec. P. n. 5.

*Paed. filiformis* Fabr. Ent. Syst. P. n. 8.

*Staph. glaberrimus* Payk. Mon. Car. App. p. 137. n. 17.—18.

- 6 *L. lineare*, nigricans; antennis elytrisque fuscis; pedibus rufis.

*Habitu et punctura* *L. elongati* (n. 8.); statura autem graciliore, thorace multo angustiore.

*Longitudo*  $3\frac{1}{2}$  lin.

*Paederus linearis* — Mus. Prof. Hellwig.

- 7 *L. terminatum*, nigrum, nitidum; ore, antennarum basi, angulo inferiore exteriore elytrorum, pedibusque rufo - testaceis.

*Habitu* *L. sequentis*; statura autem multo graciliore, capite minore.

*Longitudo*  $2\frac{3}{4}$  —  $3\frac{1}{2}$  lin.

*Corpus* nitidum, filiforme, gracile, confertim et subtiliter punctum.

*Caput* orbiculatum, thorace minus, nigrum; antennis fuscis, basi rufis; ore rufo, palpis anterioribus apice fuscis.

*Thorax* coleoptris paulo angustior et brevior, punctus, linea media nitida longitudinali.

*Elytra*, angulo inferiore exteriore, vel pustula hujus anguli, rufo vel testaceo.

*Abdomen* apicem versus attenuatum.

*Pedes* testacei; tarsi anticis latis.

*Habitat* in fimetis, sub lapidibus.

*Paederus terminatus* — Mus. Prof. Knoch.

*Paed. filiformis* Payk. Fn. Suec. P. n. 4. var.  $\beta$ .

- 8 *L. elongatum*, nigrum, nitidulum; coleoptrorum apice sanguineo - rufa, pedibus rufo - testaceis.

*Habitu* *L. praecedentium*; statura autem paulo latiore et majore.

*Longitudo*  $3\frac{1}{2}$  —  $4\frac{1}{4}$  lin.

*Corpus* filiforme, subnitidum confertim punctum.

Caput suborbiculatum, thoracis latitudine, subtilissime punctum. Antennis moniliformibus; capite thoraceque brevioribus.

Thorax subrectangulus; latitudine paulo longior; angulis obtusis; capite paulo longior, punctus, linea media longitudinali laevissima nitida.

Coleoptera thorace paulo latiora et longiora; basi nigra, apice rufo-sanguinea.

Abdomen apicem versus subattenuatum.

Pedes, tarsiis anticis dilatatis.

Habitat in fimetis, sub lapidibus.

*Paederus elongatus* Fabr. Ent. S. P. n. 3.

- Payk. Fn. Suec. P. n. 3.

1 Panzer-Fn. Germ. H. 9. t. 12.

*Staphyl. elongatus* Payk. Mon. St. n. 17.

2 Schrank Austr. n. 439.

9 *L. pilosum*, nigricans, nitidum, antennis pedibusque fuscis.

Habitu *L.* praecedentis; statura autem minus gracili; thorace, vix latitudine longiore; subtilius puncto.

Longitudo  $3\frac{1}{8}$  lin.

Corpus nigrum vel nigro-fuscum, nudum vel pilosellum.

*Paederus pilosus* — Mus. Prof. Knoch.

10 *L. brunripes*, nigrum, subopacum; pedibus antennisque rufo-fuscis.

Habitu *L. elongati* (n. 8.); statura autem plerumque paulo latiore, punctura subtiliore. A *L.* praecedente statura plerumque paulo longiore, nitore fere nullo, differt.

Longitudo 3 — 4 lin.

Habitat in fimetis, sub vegetabilibus putrescentibus.

*Paederus brunnipes* Fabr. E. S. P. n. 5.

*Staphyl. punctatus* Fourcr. E. Par. St. n. 14.

*Geoffr.* Hist. St. n. 14.

*Paederus filiformis* Payk. Fn. Suec. P. n. 4. v. α?

Nescio, an *P. filiformis* Payk. meliore jure ad hanc vel ad praecedentem speciem referri possit, credo autem, cum ad unam alteramve speciem numerandum esse. Certe non est idem cum *P. filiformi* Fabr., cui primus antennarum articulus „magnus incurvus“ est, Paykull enim dicit ipse de suo *P. filiformi* „antennae, articulo baseos reliquis non „multo longiore“ — An *St. quadratus* Payk. (Møn. St.) idem sit, dubito, quia, in hujus descriptione, punctorum capitae thoracis elytrorumque nulla mentio facta est — Fabricius *St. quadratum* Payk. sub *P. filiformi* (Lathrob. fracticorne n. 5.) citavit.

## Genus III.

## P a e d e r u s.

Palpi anteriores triarticulati.

Palpi posteriores acuminati.

Antennae articulo ultimo ovato.

*Corpus* elongatum.

*Caput* convexum, magnum. *Antennis* filiformibus; articulis, primo clavato, ultimo ovato acuto. *Palpis* anterioribus triarticulatis, clavatis, articulo ultimo caeteris crassiore.

*Thorax* crassus, convexus.

*Coleoptra* rectangula, convexa, puncta, thorace longiora et latiora; lateribus deflexa.

*Abdomen* marginatum, longum, obtusum.

*Pedes* cursorii. *Capitibus femorum* approximatis; anticis femore brevioribus, hujus autem crassitie; mediis femore duplo brevioribus, hujus autem crassitie; posticis brevissimis absconditis. *Tibiis* gracilibus subciliatis. *Tarsis* gracilibus.



*P. ochraceus* nitidus, fuscus; capite nigro, thoraceque subquadratis.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* quadratum, angulis obtusis, thoracis magnitudine, nigerrimum, nitidissimum; palpis antennisque rufescentibus; his capite thoraceque longioribus.

*Thorax* quadratus, angulis obtusis, longitudine latitudinem vix superante, coleoptris paulo angustior, nitidus, rufescens; linea media longitudinali elevata, obsoleta.

*Coleoptra* subrectangula, thorace paulo longiora, nitidiuscula, subtilissime puncta, picco-testacea.

*Abdomen* nigricans, griseo-subsericeum, segmentorum marginibus rufescentibus.

*Pedes* testacei.

*Aleochara ochracea* — Mus. Prof. Knoch.

*P. bicolor*, nitidus, nigro-fuscus; elytris pallidioribus; capite nigro; thorace, pedibus, antennisque rufis.

*Habitu* *P.* praecedentis; statura autem graciliore.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Corpus* filiforme, gracile, nitidum, punctum.

*Caput* suborbiculatum, seu quadratum angulis obtusis, thoracis magnitudine, nitidissimum, subtilissime punctum, nigrum; ore antennisque rufis; his capite longioribus, moniliformibus, articulis, primo majore clavato, mediis campanulatis.

*Thorax* subquadratus, vix subrectangulus; coleoptrorum latitudine, rufus, nitidus, subtilissima punctus; linea media longitudinali laevissima nitidissima.

*Coleoptra* subrectangula, thorace longiora, depressiuscula, puncta, nitida, piceo-fusca, marginibus pallidiora.

*Abdomen* obscure fuscum, marginibus segmentorum pallidioribus.

*Pedes* rufo-testacei; femoribus crassioribus quam in caeteris Paederis.

Habitat sub lapidibus in locis altioribus, apricis, graminosis, tempore verno, — rarior.

*P. bicolor* Olivier Ent. P. n. 7. pl. I. f. 4.

○ 3 *P. castaneus* subnitidus, fuscus; capite, abdominisque medio nigricantibus.

*Habitu* *P. ochracei* (n. 1.); statura autem majore, thorace basin versus angustiore &c.

*Longitudo* 4 lin.

*Caput* quadratum, angulis obtusis; thorace paulo majus, confertissime subtilissimeque punctum, nitidulum, nigricans; ore antennisque rufescentibus; his capite duplo fere longioribus, articulis mediis campanulatis.

*Thorax* suborbiculatus, seu subquadratus angulis obtusis; basin versus paulo angustatus; coleoptris angustior; confertissime subtilissimeque punctus, nitidulus, rufo-fuscus.

*Coleoptra* subrectangula, subtilissime puncta, fuscescencia.

*Abdomen* subgriseo-sericeum, nigricans; infra pallidius, apice rufescente.

*Pedes* rufi.

*Paederus castaneus* — Mus. Prof. Knoch.

4 *P. littoralis*, rufus; geniculis, capite, abdominisque apice nigris; elytris coeruleis; thorace globoso, suborbiculato.

*Habitu*, caeteris cospeciebus crassior, teretior.

*Corpus* nitidum, crassum; pilis crebrioribus rigidioribus, quam in cospeciebus, tectum.

*Caput* suborbiculatum, seu quadratum angulis obtusis; thorace majus, nitidum, laevissimum, nigrum. *Antennis*, capite thoraceque paulo longioribus; articulis, primo longiore, secundo brevi, tertio paulo longiore quam secundus, brevior autem quam primus, sequentibus, longitudine decrescente, subcylindricis seu oblongo-campanulatis, ultimo ovato acuto, fuscis; articulis tribus primis totis, quarto autem basi tantum, rufis. *Palpis* rufis; anterioribus, articulo ultimo apice nigricante tuberculato, tuberculo brevi obtuso.

*Thorax* convexior quam in *P.* praecedentibus, globosus, sub-orbiculatus, quibusdam basin versus angustatus; coleoptris angustior, nitidus, glaber, punctis paucis vagis impressus. Ora laterali deflexa, basi latiore, apicem versus angustata.

*Coleoptra* rectangula, thorace longiora, punctis confertis crassis cicatricosis impressa, nitidula, convexa.

*Abdomen* teretiunculium, apicem versus subangustatum.

*Pedes*, tibiis ciliatis.

Variat forma thoracis.

*Var. 1* *P.* thorace, longitudine latitudinem paululum superante, cordato; capite magno orbiculato; longitudine 4 lin.

*Var. 2* *P.* thorace globoso orbiculato; capite magno; longitudine 4 lin.

Habitat circa Blankenburg.

*P. littoralis* — Mus. Prof. *Knoch*.

Hic Paederus hucusque saepius cum *P. sequente* confusus et pro ejus varietate declaratus est. Characteribus autem constantibus, capite magno, thorace globoso, statura majore, distinctus est. Nec habitat cum *P. sequente*; in regionibus humilioribus, circa Brunsvigam nunquam captus.

5 *P. riparius* rufus; geniculis, capite, abdominisque apice, nigris; elytris coeruleis; thorace oblongo, lateribus parallelis.

*Habitu* *P. praecedenti* simillimus; capite autem parvo, paulo minore quam thorax; thorace oblongo, pedibus gracilioribus; statura minore.

*Longitudo* 3 lin.

Habitat in gramine, ad radices arborum, primo vere, haud infrequens.

*P. riparius* *Fabr.* Ent. Syst. P. n. 1.

- *Payk.* Fn. Suec. P. n. 2.

- *Rossi* Fn. Etr. n. 626.

- *Panzer* Fn. Germ. H. 9. t. 11.

- *Olivier* Ent. P. n. 2. pl. I. f. 2.

*Staphyl. riparius* *Linn.* Fn. St. n. 846.

- *Payk.* Mon. St. n. 19.

- *De Geer* Mem. St. n. 14.

- *Schrank* Austr. n. 441 et *Boic.* n. 893.

- *Fourcr.* Ent. Par. St. n. 21.

*Geoffr.* Hist. St. n. 21.

*Staph. gregarius* *Scop.* Carn. 11. 308.

6 *P. orbiculatus* niger, palpis, antennis, margine coleoptrorum apicis, pedibusque pallide fuscis.

*Longitudo*  $2\frac{1}{3}$  lin.

*Corpus*, confertissime punctum.

*Caput* orbiculatum, thorace multo latius, confertissime punctum, opacum. Clypeo prominente, transverso, rotundato. Antennis capite longioribus; articulis mediis campanulatis.

*Thorax* subovatus, globosus; antice posticeque valde angustatus; capitis longitudine, opacus, confertissime punctus; linea media longitudinali, subelevata, laevi, nitida; ora laterali deflexa, basi lata, apicem versus angustata.

*Coleoptera* subrectangula, convexiuscula, thorace longiora et latiora, puncta, nitida, nigra, margine apicis plerumque rufescente; pilis tenuibus, brevissimis, subflavo-sericantibus interdum tecta, interdum omnino nuda nitidissima.

*Abdomen* obtusum, nitidiusculum, nigrum, subflavo-sericans.

*Pedes* graciles, fusco-testacei; tibiis nudis, laevibus.

Habitat in quisquiliis, sub lapidibus, primo vere.

*P. orbiculatus* Payk. Fn. Suec. P. n. 6.

- Panzer Fn. Germ. H. 43. t. 21.

- Olivier Ent. P. n. 6. pl. I. f. 7.

*Staphyl. orbicul.* Payk. Mon. St. n. 26.

Huc non est referendus *P. orbiculatus* Fabr. (Ent. Syst. Paed. n. 6.) qui cum *Paed. filiformi* (Lathrobium fracticorne n. 5.) comparatur.

7 *P. angustatus* niger; antennis, pedibusque fuscis; coleoptris apice testaceis.

*Habitu* P. praecedentis; statura autem graciliore, defectu lineae longitudinalis thoracis &c. differt.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  — 2 lin.

*Caput* magnum, subquadratum, angulis obtusis, thorace longius et latius, opacum, confertissime punctum. Ore producto. Antennis capite longioribus; articulis, primo longiore, secundo et tertio brevioribus, clavatis, sequentibus suborbiculatis, ultimo ovato, mediis crassiore.

*Thorax* globosus, suborbiculatus, opacus, confertissime punctus.

*Coleoptra* subrectangula, convexiuscula, thorace longiora et latiora, subnitida, confertim puncta, nigra; margine apicis, vel apice et sutura ultra medium, testaceis.

Caetera ut in P. praecedente.

Habitat etiam cum illo, rarior autem.

*P. angustatus* Payk. Fn. Suec. P. n. 7. var.  $\alpha$ .

*Staph. angustatus* Fabr. Ent. S. St. n. 41.

- Payk. Mon. St. n. 27.

- Panzer Fn. Germ. H. n. t. 12.

## Genus IV.

## Callicerus.

Palpi anteriores triarticulati.

Antennae articulo ultimo longo cylindrico.

*Corpus* gracile, filiforme, depile.

*Caput* orbiculatum, thoracis circiter magnitudine, subnitidum, subtilissime punctum. *Antennis* extrorsum paulo crassioribus; articulis, primo validiore, secundo et tertio brevioribus, clavatis; quarto ad nonum suborbiculatis; decimo longiore, cylindrico vel elongato - campanulato; undecimo longissimo, longitudine fere tertiae partis totius antennae, cylindrico, apice rotundato. *Mandibulis* exsertis, validis, apice incurvis acutis, margine interiore denticulatis. *Palpis* anterioribus triarticulatis, articulo ultimo clavato, caeteris crassiore; posterioribus acuminatis.

*Thorax* suborbiculatus, coleopterorum latitudine; ora laterali deflexa.

*Coleoptera* subquadrata, thorace longiora.

*Abdomen* crassum, obtusum, marginatum.

*Pedes* omnino generis sequentis.

1 *C. obscurus*, niger, nitidulus; antennis, ore, pedibusque rufo-testaceis; coleoptris fuscis, margine pallidis.

*Longitudo* 1 lin.

*Caput*; antennis, capite thoraceque multo longioribus, rufis, basi obscurioribus.

*Thorax* suborbiculatus vel subquadratus angulis obtusis, basin versus paulo angustior.

*Elytra* fusca; humeris et sutura, imprimis apicem versus, pallidioribus.

Habitat in quisquiliis sub lapidibus, rarissimus; semel tantum captus Brunsuigæ in horto aulico.



## Genus V.

## Aleochara.

Palpi acuminati.

Tibiae graciles, nudaе.

*Corpus* elongatum, crassiusculum.

*Caput* suborbiculatum. *Antennis* extrorsum plerumque crassioribus; articulis, primo longiore, secundo et tertio brevioribus, clavatis, sequentibus brevibus, ultimo ovato.

*Abdomen* marginatum; dorso planiusculo, ventre convexo.

*Pedes* cursorii, graciles, nudi. Capitibus femorum anticis approximatis, femore crassioribus; ejus autem longitudine; mediis subremotis, femore vix brevioribus, ejusque crassitie; posticis approximatis, brevibus, absconditis. Tibiis tarsisque gracilibus.

*Familia* I. Coleoptris quadratis, thorace latioribus; thorace convexo.

*Familia* II. Coleoptris quadratis vel longioribus, thoracis circiter latitudine; thorace convexo.

*Familia III.* Coleoptris transversis, thoracis latitudine; thorace convexo.

*Familia IV.* Coleoptris transversis, thorace latioribus; thorace convexo.

*Familia V.* Thorace deplanato.

### Fam. I.

*Caput* globosum, thoracis magnitudine, vel paulo minus.

*Antennis*, articulis mediis subtransversis.

*Thorax* orbiculatus vel globosus.

*Coleoptra*, thorace latiora, quadrata.

○ 1 *Al. canaliculata*, rufo-fusca; capite, abdominisque segmento antepenultimo, nigris; thorace canaliculato.

*Habitu* *Al.* sequentis; statura autem majore, thorace longiore. Ab *Al. foveolata* (n. 3.), thorace ovato oblongo, capitis latitudine, differt.

*Longitudo* 2 —  $2\frac{1}{3}$  lin.

*Corpus* subfiliforme, nitidulum.

*Caput* subtilissime punctum, thoracis latitudine. *Antennis*, capitis thoracisque longitudine; articulo ultimo oblongo, ovato, acutiusculo, valido; basi testaceis.

*Thorax* oblongo-ovatus, crassus, subtilissime punctus, capite longior; disco late foveolato, fovea canaliculata; interdum basin versus paulo angustatus.

*Coleoptra* subquadrata, subtransversa, thoracis longitudine, puncta, opaca.

*Abdomen* longum, obtusum, nitidum; dorso pilis brevibus rigidiusculis subsparsis tectum; rufo-fuscum; segmen-

tis penultimo et antepenultimo, vel penultimo solo, obscurioribus vel nigricantibus.

*Pedes testacei.*

Habitat sub lapidibus, in quisquiliis et inter segetes, haud rara.

*Staph. canaliculatus Fabr.* Ent. S. St. n. 42.

- *Payk. Mon. St. et Fn. Suec. St. n. 23.*

- *Panzer Fn. Germ. H. 27. t. 13.*

- *Olivier Ent. St. n. 25. pl. III. f. 31.*

*Paederus impressus Rossi* Fn. Etr. n. 627.

*Al. linearis*

2 *Al. linearis*, nigro-fusca; antennarum basi pedibusque testaceis; thorace subfoveolato.

*Habitu* *Al. praecedentis*; statura autem minore, thorace brevior.

*Caput* thorace angustius, confertissime et subtiliter punctum, obscure fuscum, opacum; palpis, antennarumque basi testaceis vel rufis; fronte planiuscula.

*Thorax* suborbiculatus, longitudine latitudinem vix excedente, opacus, confertim punctus, disco deplanato vel foveolato; fovea lata, haud canaliculata.

*Coleoptera* thorace paulo longiora, confertissime puncta, nitidula,

*Abdomen* nigrum, nitidulum; ano rufescente.

*Pedes* rufo-testacei.

Habitat sub arborum demortuarum cortice.

*Al. linearis* — Mus. Prof. *Knoch.*

*Al. limbata*

3 *Al. limbata*, nitida, fusca; antennarum basi, elytrorum humeris, abdominis basi, pedibusque rufis; thorace foveolato.

*Habitu* Al. sequentis; thoracis autem foveola longitudinali latiore. Ab Al. *canaliculata* (n. 1.) thorace brevi, subgloboso &c. satis differt,

*Longitudo* 2 lin.

*Corpus* crassum, subnitidum.

*Caput* orbiculatum, globosum, thorace angustius, retractum, laeve, obscure fuscum; oculis nigris; antennis fuscis, basi palpisque rufis.

*Thorax*, latitudine longitudinem paulo excedente, subglobosus, apice truncatus, lateribus et basi rotundatus, coleoptorum latitudine, laevis, fuscus, marginibus lateralibus pallidioribus, dorso fovea longitudinali lata impressus,

*Coleoptera* subtransversa, convexiuscula, laevia, nitida, rufo-fusca; humeris elytrorum pallidioribus.

*Abdomen* rufum, nitidum; medio, segmentis tribus vel quatuor, fuscum seu nigricans,

*Habitat* — Mus. Prof. *Hellwig*.

*Staph. limbatus* Payk. Mon. St. II, 54.

— Payk. Fn. Suec. St. n. 41.

Dom. *Paykull*, in Fn. Suec. citavit *St. flavescens* *Fabr.*, interrogative quidem, sed, uti mihi videtur, minus apte; Fabricius enim hunc *St.* ratione staturae, cum *St. fulvipede*, *marginato* &c. comparavit.

Quamquam haec Al., proportionem thoracis et coleopterorum, a reliquis hujus familiae Aleocharis decedere videtur, habitu attamen toto eis affinis est,

○ 4 Al. *lucida*, obscure rufa, nitida; capite, elytrorum angulo apicis exteriori, pectore, abdominisque apice nigricantibus; thorace, ad basin, foveolato,

*Habitu* Al. sequentis; statura autem crassiore.

*Longitudo*  $1\frac{3}{4}$  —  $2\frac{1}{4}$  lin.

*Corpus* crassum, teretiusculum, nitidum, subtilissime punctum.

*Caput* globosum, obscurum, nigricans, nitidum; oculis nigris; antennarum basi palpisque rufis; illis capitibus thoracisque longitudine, articulis, tertio paulo longiore quam secundus, quarto suborbiculato, sequentibus transversis latitudine crescente, ultimo ovato.

*Thorax* capite major, orbiculatus, subglobosus; apice angustior, angulis deflexis; basi latus; foveola transversa, ante basis marginem, impressus; rufescens seu fuscus, basis margine pallidiore.

*Coleoptera* subplaniuscula, subquadrata, latitudine longitudinem paululum excedente, thorace longiora et latiora; rufa vel fuscescentia, angulis apicis exterioribus fuscis vel nigris.

*Abdomen* rufescens, segmentis penultimo et antepenultimo nigris.

*Pedes* testacei.

*Al. lucida* — Mus. Prof. Knob.

*M. lucida* v. a.

5 *Al. proluxa*, nitida, infra rufescens, supra nigricans; antennis fuscis; elytris, ano, pedibusque rufis.

*Habitu* Al. praecedentis; statura autem paulo graciliore.

*Longitudo*  $1\frac{3}{4}$  lin.

*Caput* nigrum; antennis palpisque fuscis.

*Thorax* obscure rufescens.

*Coleoptera* quadrata, rufa, basi nigricante.

*Abdomen* nigricans; ano rufo.

*Pedes* rufo - testacei.

*Al. proluxa* — Mus. Prof. *Knoch*.

- qu. mo*  
 ○ 6 *Al. collaris*, nitida, rufa; capite, pectore, elytris, vel elytrorum angulo apicis exteriori, anoque nigris; thorace, ad basin, foveolato,

*Habitu* omnino *Al. lucidae* (n. 4.) statura autem minore,

*Caput* nigrum; antennis fuscis, apice rufis, articulo ultimo paulo validiore quam in *Aleocharis* confinibus; palpis rufis.

*Thorax*, quibusdam speciminibus, longitudine paulo latior, subpubescens.

*Coleoptra* subtransversa, convexiuscula, subpubescentia, nigricantia, vel rufa angulis apicis exterioribus obscurioribus.

*Abdomen* rufum; apice nigrum; ano rufescente.

Habitat in boletis, tempore aestivo, haud frequens.

*Staph. collaris* Payk. Fn. Succ. St. n. 43.

= *Olivier* Ent. St. n. 54. pl. II. f. 13.

- qu. mo*  
 ○ 7 *Al. impressa*, nitida; thorace, punctis duobus majoribus, sulcisque tribus longitudinalibus abbreviatis, impresso, rufescente.

*Longitudo* 1 lin.

*Corpus* crassiusculum, nitidum.

*Caput* globosum, thorace paulo majus, nitidissimum, laevissimum, collo tenuissimo cum thorace cohaerens, nigrum seu obscure fuscum; palpis antennisque rufescentibus; his, basi pallidioribus, capitis thoracisque longitudine, articulis, secundo et tertio brevibus clavatis, quarto

suborbiculato, sequentibus transversis latitudine crescente, ultimo orbiculato acuto.

*Thorax* globosus, apice rotundatus angustior, basi truncatus latior, nitidissimus; rufescens, seu rufo-fuscus margine basis pallidior; sulcis tribus, mediis, longitudinalibus, abbreviatis, una ad apicem, duabus ad basin, punctisque duobus magnis ad basin, impressus.

*Coleoptra* latitudine paulo longiora, convexa, thorace longiora et multo latiora, glaberrima, nitidissima, fusca, sulculis quatuor brevissimis longitudinalibus ad basin impressa,

*Abdomen* obtusum, nitidum, rufum, apice, segmentis tribus vel quatuor, nigrum,

*Pedes* graciles, rufo-testacei.

Habitat frequens in boletis et agaricis,

*Staph. impressus Olivier* Ent. St. u. 28, pl. V. f. 41.

*notata*

♂ *Al. rivularis*, thorace, punctis duobus majoribus, sulcisque tribus abbreviatis longitudinalibus, impresso; nigerrima, nitidissima, pedibus antennisque rufescentibus.

*Habitu* toto, partiumque proportione et sculptura, omnino *Al. praecedentis*; statura autem multo minore.

*Longitudo*  $\frac{5}{8}$  lin.

Habitat in sylvis, in fimo bovino, rarior; sub cortice arboris demortuae semel tantummodo capta,

*Al. rivularis* — Mus. Prof. Knoch.

*serena*

♂ *Al. sulcata*, thorace, fovea media longitudinali impresso; fusca, pedibus rufis.

*Habitu* Al. praecedentium; thorace autem cordato, unisulcato.

*Longitudo* 1 —  $1\frac{1}{3}$  lin.

*Corpus* glabrum, nitidum.

*Caput* globosum, thoracis magnitudine, fovea transversali inter antennis impressum, nigro-fuscum; palpis antennisque rufo-testaceis; his basi pallidioribus.

*Thorax* globosus, cordatus; apice rotundatus latus, basi subtruncatus angustus; coleoptris angustior et brevior; sulca media longitudinali, profunda, lata, impressus; nigricans, vel fuscescens, margine basis pallidiore; rarius colore fugaci griseo sericans.

*Coleoptra* longitudine vix latiora, convexiuscula, nitidissima, glaberrima, fusca vel rufo-fusca, basi foveolis duobus, saepius obsoletis, impressa.

*Abdomen* fuscum vel nigricans.

Habitat Brunsuigae.

*Staph. sulcatus* Olivier Ent. St. n. 27. pl. VI. f. 52.

- Payk. Mon. St. et Fn. Succ. St. n. 24.

10 *Al. obscura*, nitida, nigro-fusca, subsericans; antennis, elytris, pedibusque rufescentibus; thorace subunifoveolato.

*Habitu* Al. praecedentis; capite autem minore, thoracis fovea subtiliore, nitore sericante, differt.

*Longitudo* 1 lin.

*Caput* globosum, orbiculatum, thoracis magnitudine; occipite parvulum depresso; nigricans, palpis antennisque rufescentibus; his capite thoraceque sublongioribus.

*Thorax* globosus, nitidissimus, cordatus; sulca media longitudinali, saepius obsoletiore, impressus.



*Coleoptra* glabra, quadrata, rufescentia, basi foveolis duabus impressa,

*Pedes* testacei.

Habitat, primo vere, locis apricis, sub lapidibus, inter quisquilias.

*Paederus obscurus* — Mus. Prof. Hellwig.

*Nr. 12.*

11 *Al. picea*, nigra, nitidissima; pedibus, antennis, coleoptrorum margine apicis pallide fuscis; thorace, puncto ante basis marginem, impresso.

*Habitu* *Al.* praecedentis; statura autem multo minore, thorace haud sulcato.

*Longitudo*  $\frac{3}{4}$  lin.

*Corpus* subtilissime punctum, nitidum.

*Caput* globosum, thorace vix majus, laevissimum, nigrum; palpis antennisque fuscis; his capite thoraceque paulo longioribus.

*Thorax* suborbiculatus, basin versus paululum angustior; puncto magno, interdum obsolete, ante basis marginem, impressus.

*Pedes* fusco - testacei.

*Al. picea* — Mus. Prof. Knoch.

*Falsivola*

12 *Al. nigra*, nigra, nitidissima; antennis pedibusque fuscis; thorace unisulcato,

*Habitu* omnino *Al.* praecedentis; thorace autem paulo rotundiore, sulca media longitudinali impresso.

*Longitudo*  $\frac{3}{4}$  lin.

*Al. nigra* — Mus. Prof. Knoch.

- 13 *Al. corticalis*, nigra, nitida, laevis; coleoptrorum apice, pedibus, antennisque rufis.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Corpus* gracile, subfiliforme, nitidum, subtilissime punctum.

*Caput* orbiculatum, thorace vix minus, nigrum; palpis, antennisque rufis; his capitis thoracisque longitudine, extorsum paulo crassioribus, articulo primo paululum validiore quam in affinis Aleocharis; caeterum ut in *Al. praecedentibus*.

*Thorax* suborbiculatus, apice subangustior, coleoptris paulo brevior et angustior.

*Coleoptra* quadrata, convexiuscula, basi nigra, apice rufa.

*Abdomen* obtusum, nigrum; ano pallidiore.

*Pedes* testaceo-fusci.

*Habitat* rarior sub cortice arborum demortuarum.

- 14 *Al. analis*, nigra, nitida; palpis, elytris, pedibus, anoque testaceis; thorace, puncto ante scutellum, impresso.

*Habitu* gracili et filiformi *Al. praecedentis*; differt autem statura minore nec non colore.

*Longitudo* 1 lin.

*Caput* thorace paulo minus, nigrum; basi antennarum palpisque testaceis.

*Thorax* transversus, rotundatus, coleoptrorum fere magnitudine.

*Coleoptra* subtransversa, piceo-vel fusco-testacea, basi nigricantia.

*Abdomen* coleoptris plus quadruplo longius, nigrum; ano testaceo.

Habitat? Brunsuiga.

*aleochara*

15 *Al. Aethiops*, nigerrima, nitida, griseo-subsericea; plantis antennisque fuscis.

*Habitu* *Al. corticalis*; corpore autem graciliore, nitidiorre; capite minore; pedibus tenuioribus &c.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Corpus* gracile, nitidissimum.

*Caput* orbiculatum, thorace vix minus, nigrum; palpis antennisque fuscis; his articulo ultimo ovato.

*Thorax* suborbiculatus, coleoptris paulo brevior et angustior, niger, subgriseo-sericeus, foveola media, ad basin, impressus; subtilissime subpunctus.

*Coleoptra* quadrata, convexiuscula, subtilissime puncta, griseo-subsericantia.

*Abdomen* nigrum, nitidum, infra praesertim griseo-sericans.

*Pedes* tenues, longiores et graciliores quam in reliquis Aleoch.

Semel tantum capta in gramine prope Ildehausen, die XX Junii anno 1800.

## Fam. II.

*Caput* orbiculatum, thoracis latitudine, vel paulo angustius.

*Thorax* coleoptrorum latitudine vel subangustior convexus.

*Coleoptra* quadrata, vel rectangula, thorace longiora.

- Meloidae*  
 16 *Al. inquinula*, picea; capite abdomineque nigris, nitidis; pedibus testaceis; antennis fuscis.

*Longitudo* vix  $\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* orbiculatum, nitidulum, thoracis latitudine, nigrum; antennis fuscis, capitis thoracisque longitudine; articulis, primo validiore, secundo et tertio brevioribus, clavatis; sequentibus latitudine crescentibus; ultimo ovato acuto.

*Thorax* opacus, piceus; foveola media, ante marginem basis, impressus; transversus, rotundatus.

*Coleoptra* opaca, picea, quadrata.

*Abdomen* obtusum, depressiusculum.

*Pedes* testacei vel fuscescentes.

Variat colore obscuriore vel pallidiore.

Habitat in fimo bovino; rarior sub arborum demortuarum cortice.

- Meloidae eximiae*  
 17 *Al. pusilla*, nigra, nitidula; elytris, antennis pedibusque testaceis.

*Habitu* *Al.* sequentis; capite autem majore, antennis crassioribus, coleoptris longioribus — *Ab Al.* praecedente, statura graciliore, satis distincta est.

*Longitudo*  $\frac{2}{3}$  lin.

*Corpus* gracile, filiforme, nitidulum.

*Caput* thoracis magnitudine, nigrum, nitidulum; palpis, antennisque fuscescentibus; his, capitis thoracisque longitudine.

*Thorax* subtransversus; quibusdam obsolete longitudinaliter bi-sulcatus, lateribus rotundatus.

*Coleoptra* *rectangula*, thorace duplo fere longiora, depressiuscula, fusca vel piceo-testacea.

*Abdomen* obtusum, teretiusculum, nitidum, nigerrimum.

*Pedes* testacei vel fuscescentes.

*Al. pusilla* — Mus. Prof. Knoch.

*rhoda*

18 *Al. elongatula*, filiformis, tenuis, opaca, nigricans; antennis, elytris, pedibusque pallidioribus.

*Habitu* gracili *Al. praecedentis*; statura autem et antennis longioribus, capite coleoptrisque minoribus.

*Longitudo* 1 —  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* thorace paulo angustius, subnitidum, nigrum; palpis rufis; antennis fuscis, capite thoraceque duplo fere longioribus, extrorsum subcrassioribus, articulo ultimo ovato acuto.

*Thorax* orbiculatus, depressiusculus, nigro-fuscus.

*Coleoptra* quadrata, thorace paulo longiora, nitidula, subtilissime puncta, pallida; vel obscure fusca, vel picea, vel piceo-testacea.

*Abdomen* elongatum, obtusum, fusco-nigrum, marginibus segmentorum pallidioribus.

*Pedes* testacei.

Habitat *Brunsvigae*; semel tantummodo capta in gramine prati uliginosi.

*Melanocephala*

19 *Al. teres*, gracilis, nitidissima, nigerrima; elytris picescentibus; pedibus testaceis.

*Habitu* gracili *Al. praecedentium*; ab *Al. pusilla* (n. 17.), statura majore, coleoptris quadratis; ab *Al. elongatula* (n. 18.), nitore splendidiore, capite majore &c. differt.

*Longitudo* 1 lin.

*Caput* thoracis magnitudine; antennis, capitis thoracisque longitudine.

*Thorax* orbiculatus, coleoptris paulo angustior.

*Coleoptra* quadrata.

*Abdomen* gracillimum, coleoptris quadruplo longius, nitidissimum, nigerrimum.

*Al. teres* — Mus. Prof. Knoch.

20 *Al. longiuscula*, gracilis, nigra, nitidissima; pedibus fuscis; elytris nigro-fuscescentibus.

*Habitu* *Al.* precedentis; statura autem majore, capite minore, abdomine brevior et latior.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  —  $1\frac{2}{3}$  lin.

*Caput*, thorace paulo angustius, nigrum; antennis nigricantibus vel fuscescentibus, capitis thoracisque longitudine, vel paulo longioribus.

*Thorax* suborbiculatus, convexiusculus, coleoptris angustior.

*Coleoptra* quadrata, piceo-nigricantia vel fuscescentia.

*Abdomen* obtusum, coleoptris triplo longius, nitidissimum.

*Al. longiuscula* — Mus. Prof. Knoch.

21 *Al. boleti* nigricans, nitidula; antennis, elytris, pedibusque plerumque pallidioribus.

*Habitu*, *Al.* precedentibus crassior.

Inter omnes hujus generis species haec sane maxime variat, ratione tum magnitudinis, tum formae, proportionis et coloris partium singularium. Longitudo antennarum,

forma thoracis, color elytrorum antennarum et pedum, inconstantissimi sunt.

I. *Al.* nigra nitidula; pedibus elytrisque testaceis; his, circa scutellum et angulo apicis exteriori, obscurioribus.

*Var. 1*, thoracé orbiculato; antennis capite thoraceque longioribus, gracilibus; longitudine  $1\frac{1}{4}$  — 2 lin.

*V. a.* antennis palpisque nigris.

*V. b.* palpis antennarumque basi testaceo-rufis.

*Var. 2*, thorace suborbiculato, longitudine vix latiore; antennis capitis thoracisque longitudine; longitudine  $1\frac{1}{4}$  lin.

*Var. 3*, thorace transverso; antennis, capitis thoracisque longitudine; longitudine 1 —  $1\frac{1}{4}$  lin.

*V. a.* antennis palpisque fuscis.

*V. b.* palpis, antennarumque basi rufo-testaceis.

*Var. 4*, thorace subtransverso; antennis capite thoraceque brevioribus; longitudine  $1\frac{1}{4}$  —  $1\frac{1}{2}$  lin. — rarior.

II. *Al.* nigra, nitidula; elytris fuscescentibus; pedibus pallidis; thorace transverso.

*Var. 1*, antennis, capite thoraceque longioribus, gracilibus; longitudine  $\frac{3}{4}$  —  $1\frac{1}{2}$  lin.

*V. a.* elytris fuscis; pedibus testaceis.

*V. b.* elytris pedibusque fuscis.

*V. c.* elytris fuscis, humero pallidiore.

*V. d.* elytris fuscis; circa scutellum et angulo apicis exteriori, nigricantibus.

*Var. 2*, antennis, capitis thoracisque longitudine; longitudine  $\frac{2}{3}$  —  $1\frac{1}{2}$  lin.

*V. a, b, c* et *d* ut in *Var.* praecedente.

*V. e*; elytris nigricantibus; pedibus obscure fuscis.

*Var. 3*, antennis, capite thoraceque brevioribus; elytris fuscis; pedibus rufis; longitudine 1 lin. — rarissime occurrit.

Quamquam autem hae Aleocharae satis inter se discrepare videntur, nihilominus persuadeo mihi, omnes unius ejusdemque speciei varietates esse. Copiam satis magnam speciminum collegi, quibus transitus a varietate ad varietatem, a maximis ad minimas, a pallidis ad obscuras &c. satis clare ostenditur. Figura thoracis orbiculati sensim in figuram thoracis suborbiculati et transversi dilatatur; antennae longissimae graciles sensim in antennis brevissimas crassiores contrahuntur; elytra et pedes testacei plus plusque cum nigredine miscentur, et tandem prorsum nigricantes apparent — Notatu autem dignissimum est, quod magnitudo corporis formae etiam thoracis et colori elytrorum pedumque respondeat, qui sensim cum illa mutantur: Individuis maximis sunt thorax orbiculatus; antennae longae, coleoptra pedes palpi et antennarum basis testacei; minoribus antennae breviores et palpi fuscescentes, coleoptra obscuriora, thorax suborbiculatus; minimis, thorax transversus, palpi antennae et pedes obscuriores, elytra nigricantia. Sunt autem, uti supra jam monui, specimina, quibus omnes hae varietates arcte nectuntur.

Quae autem omnibus communia sunt paucis proferam.

*Corpus* subnitidum, subtilissime punctum; statura minus gracili quam in praecedentibus hujus familiae Aleocharis.

*Caput* orbiculatum, thorace paulo angustius, nigrum; antennis plerumque pallidioribus.

*Thorax* coleoptris vix angustior, lateribus rotundatus, niger.



*Coleoptra* quadrata, thorace paulo longiora.

*Abiomen* obtusum, nigrum.

Vicitant gregatim in boletis et agaricis, frequentes per totum annum. Aliae vero habitant etiam alibi, semper autem rariores et singulae, et forsitan defectuantum boletorum et agaricorum: — In succo putrido sub cortice quercus, var. I, 1. — In fimo ovino, var. II, 2, b; semel tantum tacta. — In cadavere talpae, var. II, 2, a, specimina quaedam.

*Staph. Boleti* Linn. Fn. n. 859.

- *Schrank* Austr. n. 453.

- *De Geer* Mem. St. n. 13.

- *Scopoli* Carn. n. 305.

- *Staph. socialis* Payk. Fn. Suec. St. n. 5t.

- *Olivier* Ent. St. n. 53. pl. III. f. 25.

*Staph. Boleti* Linn. et *Schrank* ad var. I; 1, b; 3, b. II; 1, a; 2, a referendi sunt. — *St. Boleti* *De Geer* et *Scopoli* ad var. II; 1, a; 2, a. — *St. socialis* *Payk.* et *Olivier* ad var. I; 1, b; 3, b.

Huc autem non referendus est *St. Boleti* *Payk.* (Moss. St. n. 44 et Fn. Suec. St. n. 62.), qui potius *Tachinus* esse videtur, cum *cel.* auctor eum, (Fn. Suec. n. 62.) inter *Staph. lunulatum* et *melanocephalum* ponat, qui ambo *Tachini* sunt. Dicit etiam „*St. Boleti* differt a *St. sociali* elytrorum convexitate.“

*Al. aterrima*, nigra, nitidula; pedibus antennisque fuscis; his dimidii corporis longitudine.

*Habitu*, *Al.* praecedentis varietati minori obscurae similis; statura autem crassiore, antennis multo longioribus.

*Longitudo*  $\frac{3}{4}$  lin.

*Al. aterrima* Mus. Prof. Knoch.

- <sup>Zin. Tier 19.</sup>  
 ○ 23 *Al. tenuis*, nigra, nitidula; antennis fuscis; elytris rufis, humero nigro; pedibus pallidioribus; thorace quadrato.

*Longitudo* 1 lin.

*Corpus* filiforme, gracile, nitidulum.

*Caput* subquadratum, angulis obtusis; thoracis magnitudine, nigrum; antennis fuscis, basi palpisque pallidioribus; oculis parvis prosilientibus.

*Thorax* quadratus, angulis obtusis, convexiusculus, coleoptris angustior et paulo brevior, laevis, niger.

*Coleoptra* subquadrata, nitidula; planiuscula, laevia, rufa, humeris nigris.

*Abdomen* obtusum, coleoptris quadruplo longius.

*Pedes* testacei seu rufi.

*Al. tenuis* — Mus. Prof. Hellwig.

- <sup>Hydrobius</sup>  
 ○ 24 *Al. nigricollis*, rufo-fusca; elytris pedibusque pallidioribus; capite thoraceque scabriculis, nigris.

*Longitudo* 2 lin.

*Corpus* gracile, filiforme.

*Caput* orbiculatum, thorace angustius, opacum, scabrum seu confertissime punctum; punctis crassioribus; nigricans; palpis, antennisque rufescentibus; his dimidia totius corporis longitudine, extrorsum crassioribus.

*Thorax* suborbiculatus, convexus scaber, vel confertissime punctus; punctis crassis; coleoptris paulo angustior et brevior, opacus niger.

*Coleoptra* quadrata, convexa, confertissime puncta, nitidula.

*Abdomen* crassum, obtusum, coleoptris quadruplo longius, nitidissimum, fusco-rufum.

*Pedes* testacei.

Habitat — Mus. Prof. Helliwig.

*Staph. nigricollis* Payk. Fn. Suec. St. n. 42.

<sup>Al. nigritula</sup>  
25 *Al. nigritula*, nitida, nigricans; elytris fuscescentibus; antennis pedibusque testaceis.

*Habitu*, *Al. Bolleti* (n. 21.) gracilior; nitore etiam, capite majore, thorace angustiore &c.; ab illa differt.

*Longitudo*  $\frac{4}{5}$  lin.

*Caput* orbiculatum, thorace vix angustius, nigrum; palpis antennisque testaceis seu dilucide ochraceis; his, capitibus thoracisque longitudine, extrorsum valde crassioribus, articulis quarto ad decimum transversis, latitudine crescentibus, ultimo, illis longiore, ovato, obtusiusculo.

*Thorax* orbiculatus, coleoptris paulo angustior et brevior, niger.

*Coleoptra* quadrata, nitida, subtilissime puncta, castaneo-fusca; marginibus suturaque subobscurioribus.

*Abdomen* obtusum, nitidulum, coleoptris plus duplo longius.

*Pedes* ochracei.

Habitat in fimo, praesertim ovillo et hominum.

<sup>Al. alternans</sup>  
26 *Al. alternans*, nitidula, rufo-testacea; capite, thoracis disco, angulis coleoptrorum apicis exterioribus, segmentisque penultimis, obscurioribus.

*Habitu gracili,*

*Longitudo* 1 —  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* orbiculatum, thorace angustius, subtilissime subpunctum, nigro-fuscum; antennis ochraceis, capitibus thoracisque longitudine; palpis testaceis.

*Thorax* suborbiculatus, apice vix paulo angustior, subtilissime punctus, fusco-testaceus; disco obscuro,

*Scutellum* obscurum.

*Coleoptera* quadrata, thorace longiora et paulo latiora, confertissime puncta, rufo-testacea; circa scutellum, sutura, et angulis apicis vel apice tota, fuscis vel nigris.

*Abdomen* obtusum, coleoptris duplo longius, rufum; segmentis penultimo et antepenultimo nigris, vel fuscis.

*Pedes* testacei.

Habitat gregatim in boletis, per totum annum frequens, rarius capta in fimo humano; rarissime in cadavere avis,

*Al. alternans* — Mus. Prof. Knoch.

*Altera*

27 *Al. pygmaea*, nigricans, nitida; elytris testaceis, basi nigricantibus; pedibus testaceis.

*Habitu* *Al.* duarum sequentium. Differt autem ab *Al. obfuscata* nitore splendidiore, antennis longioribus, thorace paulo latiore; ab *Al. longicorni*, antennis gracilioribus, thorace paulo latiore, elytris minime nitidis, nec punctis.

*Longitudo* 1 lin.

*Corpus* breve, crassiusculum.

*Caput* thorace angustius, subretractum, nitidum, nigrum; antennis capite thoracisque longioribus, gracilibus, fuscis, basi pallidioribus; articulis, mediis campanulatis, ultimo ovato obtuso,

*Thorax* transversus, rotundatus, coleoptris vix angustior, nitidus, rufo-nigricans.

*Coleoptra* quadrata, minus nitida, laevia, testacea; basi nigricante subsericea.

*Abdomen* nigricans, griseo-subsericeum; ano rufescente.

*Al. pygmaea* — Mus. Prof. Knoch.

*Al. n. 28.*

28 *Al. obfuscata*, nigricans, subopaca; thorace elytrisque pallidioribus; antennis pedibusque rufescentibus.

*Habitu* *Al.* praecedentis; multis autem differt.

*Longitudo*  $\frac{3}{4}$  — 1 lin.

*Corpus* breve, crassum, subtilissime punctum, nitidulum.

*Caput*, thorace angustius, nigrum; antennis fuscis; palpis pallidioribus; illis capitis thoracisque longitudine, extorsum crassioribus.

*Thorax* rotundatus, subtransversus, apicem versus paulo angustatus, angulis anticis deflexis; convexior quam in *Al.* affinibus, obscure fuscus, marginibus lateralibus plerumque pallidioribus; coleoptrorum latitudine.

*Coleoptra* quadrata, pallidiora, seu fusco-picea.

*Abdomen* nigricans, subobtusum, coleoptris vix triplo longius.

*Pedes* testacei.

Habitat in fimo ovillo et humano, haud frequens.

*Al. n. 29.*

29 *Al. longicornis*, nigra, nitida; elytris piceis; pedibus pallide testaceis; antennis longis.

*Habitu* *Al. pygmaeae* (n. 27.); corpore autem toto nitido, puncto, pilosello, satis distincta est — Ab *Al.* praecedente omnino differt.

*Longitudo* 1 lin.

*Corpus* breve, crassum, nitidum, punctum; punctis distinctioribus quam in *Al. affinis*; pilosellum; pilis rigidis,

*Caput* thorace angustius, nigrum; antennis fuscis, capite thoraceque duplo fere longioribus.

*Thorax* rotundatus, subtransversus, apicem versus vix paululum angustatus, coleoptris subangustior, nitidulus, nigro - piceus.

*Coleoptra* quadrata, picea, circa scutellum obscuriora; nitida.

*Abdomen* breve, obtusum, nigro - fuscum, setosum.

Habitat in aridis, in fimo ovillo; semel tantummodo capta die XIX Junii; anno 1800.

*Al. cinnamomea*

30 *Al. cinnamomea*, nitida, cinnamomea; capite abdomineque obscurioribus,

*Habitu* *Al. Boleti* (n. 21.) Var. I, 3; thorace autem transverso, latiore et convexiore, colore &c. distincta.

*Longitudo*  $1\frac{1}{4}$  —  $2\frac{1}{4}$  lin.

*Corpus* nitidulum, subtilissime confertissimeque punctum,

*Caput* thorace angustius, retractum, nitidulum, nigricans seu nigro - fuscum, oculis nigerrimis majoribus; palpis rufis; antennis, capitis thoracisque longitudine, vel fusciscentibus basi pallidior, vel rufis.

*Thorax* convexus, transversus, lateribus rotundatus, coleoptris vix angustior, sulca interdum media longitudinali obsoleta impressus, rufo - vel nigro - fuscescens.

*Coleoptra* subtransversa.

*Abdomen* obtusum, nitidum, nigro - fuscum.

*Pedes* pallidi.

Variat colore thoracis, elytrorum &c.

*Var. 1*, major; elytris thoraceque rufo-fuscis; pedibus, antennarumque primo articulo ochraceis.

*Var. 2*, minor; antennis ochraceis; coleoptris piceo-testaceis, angulis apicis nigricantibus ut in v. 1; pedibus testaceis.

*Var. 3*, minor; antennis ochraceis; coleoptris piceo-testaceis; pedibus, antennarumque articulo primo testaceis.

Habitat in succo putrido sub arborum cortice.

*Al. opaca*, nigricans, opaca, subgriseo-sericea; elytris, pedibusque pallidis.

Habitu quibusdam *Al.* familiae sequentis, e. g. *Al. fumatae* (n. 42.) similis; coleoptris autem quadratis.

*Longitudo* 2 —  $2\frac{1}{2}$  lin.

*Corpus* crassum, subtilissime punctum; supra infraque, imprimis vero pectore et ventre, tomento tenui griseo-sericante tectum.

*Caput* thorace minus, retractum, nigro-fuscum; antennis basi pallidis, capitibus thoracisque longitudine.

*Thorax* convexior quam in reliquis hujus familiae *Aleocharis*, apicem versus paululum angustatus.

*Abdomen* apicem versus subangustatum, nigricans; marginibus segmentorum pallidioribus.

Variat colore:

*Var. 1*, major; coleoptris fusco-testaceis, angulis inferioribus suturaque circa scutellum obscurioribus; pedibus testaceis.

*Var. 2*, minor; coleoptris obscure fuscis, apice rufescente; pedibus antennisque ochraceis.

*Var. 3*, minor; thorace, lateribus pallidioribus; caetera ut in var. 1.

Habitat Brunsvigae — Unicum specimen var. 1 captum in flore Echii vulgaris,

*spec. no. 27.*

32 *Al. umbrata*, opaca, nigra, subsericans; elytris pallidioribus; pedibus testaceis.

Habitu omnino *Al. praecedentis*; statura autem multo minore semper distincta.

*Longitudo* 1 lin.

Variat elytris pallide fusciscentibus, seu nigricantibus apice pallide fusciscente.

Habitat Brunsvigae

*Hyemalis*

33 *Al. humeralis*, nitidula, obscure fusca; pedibus, antennarum basi, elytrorumque humeris, ochraceis.

*Longitudo* 3 lin.

Caput thorace angustius, nigricans; antennis fuscis, articulo primo palpisque ochraceis,

Thorax subrotundatus, subtransversus, coleoptris paulo angustior, planiusculus, nigricans; foveis quatuor obsoletis, una scilicet longitudinali media, altera minima media ad basin, tertia et quarta lateralibus, impressus.

Coleoptra quadrata, depressiuscula, nigricantia, macula elytrorum humerali ochracea.

Abdomen coleoptris plus duplo longius, obtusum, fuscum, apice nigricante.

*Al. humeralis* — Mus. Prof. Knoch.



## Fam. III,

*Caput* parvum, orbiculatum, retractum, thorace multo minus.

*Thorax* transversus, coleoptrorum longitudine et latitudine, convexus, apice plerumque angustior,

*Coleoptra* transversa,

34 *Al. ruficornis*, nitida, fusca; antennis, thoracis lateribus, coleoptris, pedibusque rufo-testaceis,

*Longitudo*  $2\frac{2}{3}$  lin.

*Corpus* totum, imprimis capite thorace coleoptrisque, pilis brevibus fulvo-subsericeis tectum; subtilissime punctum; minus coactum et convexum quam in speciebus sequentibus.

*Caput* atrum; antennis, capitis thoracisque longitudine, extorsum crassioribus, palpisque ochraceis.

*Thorax* subrotundatus, convexiusculus.

*Abdomen* nigro-fuscum, segmentorum marginibus pallidioribus, obtusum, coleoptris triplo longius.

*Pedes* testacci.

Habitat in agaricis, rarissima, semel modo capta.

35 *Al. strumosa* rufo-fusca; thorace, marginibus elevatis.

*Habitu* omnino Aleocharae hujus familiae; statura autem corporis et figura thoracis a conspeciebus valde discedens.

*Longitudo* 3 — 4 lin.

*Corpus* crassum; coactum, latum, nitidulum,

*Caput* parvum, supra impressum, thorace multo angustius, subtilissime punctum, subopacum, fuscum; oculis nigris; antennis, capite thoraceque longioribus, filiformi-

bus, moniliformibus; articulis, primo crassissimo, secundo brevissimo, sequentibus globosis aequalibus, ultimo ovato acuto.

*Thorax* nitidus, punctus, fuscus; angulis apicis rotundatis, basis acutis; marginatus; marginibus apicis et basis subelevatis angustioribus, laterum adscendentibus latioribus; supra scutellum productus; disco convexiusculo, sulca media longitudinali obsoleta, impresso.

*Coleoptra* subgibbosa, thorace vix paulo longiora et latiora, nitidissima, impuncta, rufescentia, angulis acutis.

*Abdomen* crassum, latum, coleoptris triplo longius; segmento penultimo sinuato; marginibus lateralibus elevatis; nitidum, fuscum.

*Pedes* pallidi, validi; tibiis autem laevissimis, tarsis tenuissimis.

Habitat Blankenburg.

*Al. strumosa* — Mus. Prof. Hellwig.

*Staph. strumosus* Fabr. Ent. Syst. St. n. 28.

- *emarginatus* Payk. Mon. St. n. 56.

- *Payk.* Fn. Succ. St. n. 44.

Species huc non referenda *St. Strumosus* Payk. (Fn. Succ. St. n. 45.) „thorace antrorsum emarginato, longitudine vix „latiore“ esse videtur — *St. emarginatus* Olivier (Ent. St. n. 44 pl. II.-f. 12.) hae multo minor et idem est, quem *Fabricius* (Ent. Syst. St. n. 46.) sub hoc nomine descripsit.

*Al. fuscipes*, nigra, nitidula; disco elytrorum rufo - sanguineo; pedibus fuscis.

*Habitu* *Al.* sequentis; statura autem majore, thorace minus convexo.

*Longitudo*  $2\frac{1}{2}$  —  $3\frac{1}{4}$  lin.

*Corpus* coactum, crassum, confertissime subtiliterque punctum, tomento tenui brevi griseo-sericante tectum.

*Caput* atrum, palpis fuscis; antennis brevibus, validis, extrorsum multo crassioribus, capite longioribus; articulis, primo valido clavato, tertio et secundo brevioribus gracilioribus clavatis, quarto orbiculato, sequentibus transversis latitudine crescente, ultimo, mediis longiore, obpyriformi.

*Thorax* transversus, convexus, apice angustior, angulis anticis deflexis, basis margine medio paululum producto.

*Coleoptera* vix longitudine thoracis.

*Abdomen* obtusum, crassum, coleoptris triplo longius.

Habitat in cadaveribus, boletis, et fimo humano, haud rara.

*Staph. fuscipes* Payk. Mon. St. n. 38.

- Payk. Fn. Succ. St. n. 39.

- Rossi Fn. Etr. n. 619?

Huc, uti credo, *St. fuscipes* Fabr. (Ent. Syst. St. n. 38.) non referendus est, cum sit „parvus, clytris pedibusque „piccis“ — Nec *St. fuscipes* Linn. cui sunt „thorax, caput et maxillae ratione magnitudinis insignes; magnitudo pediculi“ &c. — *St. fuscipes* Panzevi (Fn. Germ. H. 27. t. 12.) longe est diversa species, ad *Tachinum* quemdam referenda:

*A. bicolor* Linn.

37 *Al. bipunctata*, nigra, nitidula; pedibus ochraceis; clytris macula apicis rufo-sanguinea; thorace gibboso.

*Habitu* *Al.* praecedentis et sequentis; differt autem statura crassiore, thorace convexiore, coleoptris minus nitidis crassius punctis.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  —  $2\frac{1}{3}$  lin.

*Corpus* crassum, confertim punctum, pilis brevissimis, supra rarioribus, infra crebrioribus, griseo-sericantibus, tectum; nitidum.

*Caput* antennis ut in Al. praec.

*Thorax*, marginibus rotundatis, apicem versus angustior, lateribus deflexus, antice posticeque declinatus, nitidus, nigricans.

*Coleoptra* vix thoracis longitudine, brevissima; elytris quadratis, subnitidis, punctis crassioribus impressis; nigris, apice rufo-sanguinea; vel rufo-sanguineis, sutura marginibusque basis et laterali nigris.

*Abdomen* vel obtusum vel apicem versus paulo angustatum.

*Pedes* rufo-fusci vel rufo-testacei.

*Habitat* in fimo bovino, equino, ovis, humano &c. haud infrequens.

*Staph. bipunctatus* Oliv. Ent. St. n. 43. pl. V. f. 44.

38 *Al. lanuginosa*, nigra, nitida; summo coleoptrorum apicis margine pedibusque fuscis; lanugine mollissima tenuissima tecta.

*Habitu* toto Al. praecedentium; differt autem ab Al. *fusipede*, statura minore; thorace convexiore; ab Al. *bipunctata* thorace minus convexo, lateribus quidem deflexo, postice vero haud declinato; statura minus coacta; ab omnibus autem Aleocharis, lanugine, seu pilis tenuibus erectis, nudo oculo vix conspicuis, quibus totum corpus obsitum est.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  — 2 lin.

Habitat in fimo equino et bovino, tempore vernali; haud frequenter occurrit.

*Al. laevis* Payk.

39 *Al. laevis*, nigra, nitida, griseo-sericans; antennis pedibusque fuscis.

Habitu *Al. ruficornis* (n. 34.):

Longitudo  $2\frac{1}{2}$  lin.

Caput thorace duplo minus, nigrum, palpis antennisque fuscis; his capite thoraceque paulo longioribus, caeterum ut in *Al.* praeced.

Thorax coleoptris paulo angustior, puncto majore ante scutellum impressus.

Abdomen nigricans, segmentorum marginibus rufescentibus; tomento rufo-griseo-sericante, ventre imprimis, tectum.

*Al. laevis* — Mus. Prof. Knoch.

*Al. lugens*

40 *Al. lugens*, nigra, nitidula; elytris fusciscentibus; pedibus, palpis, antenarumque basi, fusco-ochraceis.

Habitu *Al.* praecedentis; statura autem paululum crassiore, minore.

Longitudo  $1\frac{1}{2}$  lin.

Corpus subsericeo-nitens.

Thorax coleopterum latitudine.

Coleoptra thoracis longitudine, convexiuscula, nitida, laevissima, omnino impuncta, obscure fusca.

Abdomen obtusum, coleoptris plus triplo longius, nitidissimum, nigrum, sericeo-nitens.

Habitat — Mus. Prof. Hellwig.

41 *Al. moesta*, nigra, nitida; antennis, pedibus, elytrisque fuscis vel obscure ochraceis.

*Habitu* omnino *Al. sequentis*; thorace autem angustiore et minus convexo; elytris crassius punctis.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  —  $2\frac{1}{3}$  lin.

*Habitat* — Mus. Prof. Hellwig:

42 *Al. fumata*, nigra, subnitida; abdomine nigro-fusco; antennis, elytris, pedibusque pallidioribus.

*Habitu* *Al. lanuginosae* (n. 38.); thorace autem minus declinato, corpore minus nitido, elytris fuscis, lanac defectu &c. satis distincta est.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  — 2 lin.

*Corpus* crassum, nitidulum, subtilissime punctum; pilis brevibus griseo-subsericantibus, praecipue infra, tectum.

Variat colore elytrorum et antennarum:

*Var. 1*, major; elytris, antennarumque articulo primo pallide fuscis.

*Var. 2*, minor; elytris antennisque totis obscure fuscis.

*Habitat* in boletis, haud frequens.

*gr. var. 2.*

43 *Al. pulla*, subnitida, fusco-nigricans; elytris pallidioribus, pedibus testaceis.

*Habitu* *Al. praecedentis*; statura autem minore, abdomine graciliore, nitore caeciore; thorace paulo angustiore &c. differt.

*Longitudo*  $1\frac{1}{3}$  lin.

*Corpus* subgriseo-sericans.

*Caput* thorace quadruplo minus; nigricans; opacum; antennis capitibus thoracisque longitudine.

*Thorax* opacus, nigricans vel fuscescens, marginibus lateralibus interdum pallidioribus.

*Coleoptera* subtransversa, fusca, opaca, subtilissime puncta.

*Pedes* ochracei.

*Al. pulla* — Mus. Prof. Knoch.

*Al. nitida* L.

44 *Al. nitida*, nigerrima, nitidissima; elytris, macula apicali rufa; pedibus fusciscentibus.

*Habitu* *Al. fuscipedis* (n. 36.) et similium; nitore autem splendidissimo, colore aterrimo, punctis crassioribus paucioribus distincta.

*Longitudo* 1 —  $1\frac{3}{4}$  lin.

*Corpus* crassum, punctum, nitidissimum, interdum pilis brevibus tenuibus griseis sparsim tectum.

*Elytra*, macula, anguli apicis interioris, majore vel minore, orbiculari, circuito distincto vel evanescente, rufa, rarius rufo-testacea, suturam attamen haud attingente.

*Pedes* obscure fuscis seu ochracei.

*Habitat* in aridis, in fimo ovillo, haud frequens.

*Al. nitida* — Mus. Prof. Knoch

45 *Al. morion*, nigra, opaca; pedibus antennisque nigro-fuscis.

*Habitu* crasso, gibboso, omnino *Al. bipunctatae* (n. 37.); thorace etiam lateribus deflexo, antice posticeque declinato; differt autem statura multo minore, colore nigerrimo opaco — Colore toto nigro opaco ab omnibus *Alcocharis* distincta est.

*Longitudo* 1 lin.

*Corpus* crassum, opacum, pilis perpauca sericantibus, interdum planè nullis, sparsim tectum, confertim punctum.

*Antennae* obscure fuscae seu nigrae.

Habitat in fimo bovino, haud frequens; in fimo humano semel tantummodo capta, die XXV. Maji, anno 1800.

*Diatoma*

○ 46 *Al. pumilio*, nigra, opaca; elytris antennisque nigro-fuscis; pedibus testaceis.

*Habitu* et punctura omnino *Al. praecedentis*; statura autem duplo minore; coleoptris, apice, ad suturam, profundius sinuatis.

*Longitudo*  $\frac{1}{2}$  lin.

Habitat in aridis, in fimo ovillo, rarissima; semel tantummodo capta, die XXIX Junii, anno 1800.

#### Fam. IV.

*Corpus* nitidum, depressiusculum, breve.

*Caput* transversum; oculis prominulis; antennis extrorsum valde crassioribus; articulis, primo validiore, secundo et tertio brevioribus gracilioribus, clavatis, quarto suborbiculato, sequentibus transversis, latitudine crescente, ultimo ovato acuto.

*Thorax* transversus, latus; longitudine duplo fere latior; lateribus rotundatis; convexiusculus.

*Coleoptra* transversa, thorace latiora et duplo fere longiora, laevia.

*Abdomen* obtusum.

*Prothorax*

○ 47 *Al. nana*, nitida, testacea; thorace, angulis coleoptrorum apicis, segmentis penultimis, obscurioribus; capite nigro.



*Longitudo*  $\frac{3}{4}$  — 1 lin.

*Caput* thoracis fere latitudine; antennis, capite thoraceque longioribus; nigrum, antennis palpisque testaceis.

*Thorax* punctis aliquot; duobus ante basin distinctioribus, impressus; nigricans seu fuscus, marginibus pallidioribus.

Speciminibus majoribus sunt thorax, anguli apicis coleoptorum, segmenta penultimum et antepenultimum, nigri; minoribus fusi.

Habitat gregatim in boletis et agaricis.

*Staph. nanus* Payk. Fn. Suec. St. n. 52.

*Staph. melanurus* Schrank in Füssly N. M. II. p. 324.

48 *Al. polita*, nigra, nitida; antennis pedibusque testaceis.

*Habitu* *Al.* praecedenti simillima; statura autem minore; capite angustiore.

*Longitudo*  $\frac{3}{4}$  lin.

Habitat cum *Al.* praecedente; multo autem rarior.

### Fam. V.

*Corpus* planiusculum, nitidum, laeve, subpunctum.

*Caput* orbiculatum; thorace paulo angustius; antennis extorsum crassioribus; articulis, primo validiore longiore, secundo et tertio brevioribus gracilioribus, clavatis, quarto et quinto suborbiculatis, sequentibus transversis, latitudine crescente, ultimo ovato acutiusculo.

*Thorax* transversus, coleoptris brevior et paulo angustior, disco plano.

*Coleoptra* quadrata.

*Stenocera Muls. conuulsa F.*  
 49 *Al. depressa*, nitidula, pallide fusca; capite abdomineque obscurioribus.

Longitudo  $1\frac{1}{2}$  —  $2\frac{1}{4}$  lin.

Caput suborbiculatum; nigrum; antennis, capitis thoracisque longitudine, fuscis; ore, antennarumque articulo primo testaceis.

Thorax, lateribus rotundatis, rufescens, maculis interdum duabus magnis obscurioribus.

Elytra rufo-testacea; marginibus, imprimis circa scutellum, subobscurioribus.

Abdomen obtusum, coleoptris plus duplo longius, fuscum; ano pallido.

Pedes testacei.

*Al. depressa* — Mus. Prof. Knoch.

*Musa*  
 50 *Al. deplanata*, nitida, fusca; pedibus testaceis.

Longitudo 1 lin.

Caput planum; thorace vix angustius, nigrum; antennis fuscis, capitis thoracisque longitudine.

Thorax basin versus angustatus, coleoptris vix angustior, nigro-fuscus, medio longitudinaliter subcanaliculatus.

Coleoptra thorace duplo fere longiora, depressiuscula, obscure picea.

Abdomen obtusum, coleoptris duplo longius, nigro-fuscum.

Habitat in aridis, in fimo ovillo; rarissima; semel tantum capta.

## Genus VI.

## Oxytelus.

Palpi acuminati.

Thorax brevis, sculptus.

Tibiae validae, spinosae.

*Corpus* elongatum, plurimis depressiusculum; nudum, depile.

*Caput* suborbiculato-angulosum, rugosum; oculis prosili-entibus. *Antennis* extrorsum crassioribus; articulis, primo maximo, valido, secundo parvo, gracili, sequentibus latitudine crescentibus, ultimo ovato acuto. *Palpi* anterioribus quadriarticulatis.

*Thorax* coleoptris paulo angustior, punctis sulcisve impressus; ora laterali infra dextera.

*Coleoptra* subquadrata, thorace longiora.

*Abdomen* obtusum, marginatum.

*Pedes* validi. Capitibus femorum approximatis; anticis femore brevioribus, ejus autem crassitie; mediis femore duplo brevioribus, vixque ejus crassitie; posticis brevissimis, absconditis. *Tibiis* validis, subincurvatis, spi-

nosis. Tarsis; articulo ultimo, sive ungula, longo, clavato, articulis reliquis brevibus, subtransversis.

*mus. opulentes*

1 *O. fuliginosus*, niger, nitidus; pedibus testaceis; thorace laeviusculo,

*Longitudo* 1 lin.

*Corpus* gracile, filiforme.

*Caput* orbiculatum, thorace paulo minus; antennis vix capitis thoracisque longitudine.

*Thorax* transversus, convexiusculus, apice latior, basin versus angustatus, nitidus, coleoptris vix angustior, laevis; scrobibus duobus, haud profundis, lateralibus, oculo bene armato conspicuis, impresso.

*Coleoptra* latitudine paulo longiora, subtilissime puncta, linea longitudinali elytrorum prope suturam impressa, subnitida, cinerascens.

*Pedes* testacei; tibiis validis, vix autem spinosis.

Haec species, uti e descriptione apparet, inter Aleocharas et Oxytelos medium tenet; tibiis attamen validis, thorace transverso, basin versus angustiore, subfoveolato, potius ad hoc genus spectare videtur.

*Al. fuliginosa* — Mus. Prof. Knoch.

2 *O. pedicellus*, niger, nitidulus; elytris, pedibus, abdominisque basi pallidis; thorace rugoso,

*Longitudo*  $\frac{1}{4}$  —  $\frac{1}{3}$  lin.

*Corpus* crassiusculum, filiforme.

*Caput* thoracis latitudine, nigrum; antennis fuscis, capite longioribus.

*Thorax* transversus, coleoptris vix angustior, longitudine duplo latior; lineis tribus longitudinalibus, marginibusque omnibus elevatis.

*Coleoptra* atro-picea, subnitida.

*Abdomen* obtusum, coleoptris vix duplo longius, nitidum, nigrum, basi fusco-testaceum,

*Pedes* fusco-testacei.

*Habitat* in fimis, haud rarus.

*Stenocarinatus* Block.

3 *O. depressus*, niger, opacus; antennis fuscis; pedibus fusco-testaceis; thorace, lineis quatuor elevatis.

*Longitudo*  $\frac{2}{3}$  — 1 lin.

*Corpus* depressum, filiforme, opacum.

*Caput* subtransversum; vel paulo majus quam thorax, quadratum, angulis obtusis; vel thorace paulo minus, suborbiculatum; nigrum; antennis fuscis.

*Thorax* transversus, planus, longitudinaliter quadrilincatus; lineis elevatis rectis; coleoptris vix angustior.

*Coleoptra* plana.

*Abdomen* obtusum, coleoptris longius.

*Pedes* testacei, femoribus fuscis.

Vivitat gregatim in excrementis. Lectus vero etiam, satis copiose, in floribus Echii vulgaris, die XVI. Julii anno 1800; nec non in gramine et in terra uliginosa.

*Staph. depressus* Olivier Ent. St. n. 51 pl. III. f. 26.

*St. piceus* Schrank Boica n. 885.

*Haplodermus*

4 *O. caelatus*, nigricans, nitidulus; antennis, elytris, pedibusque pallidioribus; thorace quadrifoveolato, foveis duabus mediis arcuatis.

*Longitudo*  $1\frac{3}{8}$  — 2 lin.

*Corpus* vix depressiusculum, nitidulum, punctum.

*Caput* vel thorace majus, mandibulis validioribus; vel thorace minus, mandibulis gracilioribus; nigrum; ore, antennisque fuscis; his, capite thoraceque longioribus; articulis quarto ad septimum suborbiculatis crescentibus, octavo ad decimum transversis, ultimo suborbiculato acuto.

*Thorax* convexiusculus, coleoptris paulo angustior, basi versus angustatus, longitudinaliter quadri-foveolatus; foveis duabus mediis profundioribus arcuatis, concavitate extrorsum versa; lateralibus obsoleteioribus; foveis omnibus punctis.

*Coleoptra* confertim puncta, thorace duplo fere longiora,

*Abdomen* obtusum, coleoptris duplo longius.

Color variabilis est:

*Var. 1* *O.* niger seu obscure fuscus; pedibus, ore, antennarum basi, ochraceis,

*Var. 2* *O.* niger; antennis fuscis; ore rufo; elytris piceo-testaceis; pedibus ochraceis.

*Var. 3* *O.* niger; ore, antennarumque basi ochraceis; coleoptris pedibusque testaceis,

*Var. 4*, minima; *O.* fuscus; abdomine nigro; pedibus testaceis.

Habitat frequentissime in stercore bovino, per totum annum. Captus vero etiam in succo putrido, sub cortice quercus, die VIII Junii, et in terra uliginosa, die XVI Julii, anno 1800. — Varietatem 4 semel tantummodo, cum speciminibus quibusdam var. 2, in terra uliginosa cepi; licet autem, statura graciliore et minore, nec non colore, a varietatibus praecedentibus, discrepet, in essentia-

libus tamen cum illis congruit, et ego non ausus sum, hanc pro specie peculiari habere, cum specimen tantum unicum hujus varietatis possideam — Varietatem simillimam, statura autem adhuc graciliore, longitudine modo  $\frac{2}{3}$  lin., vidi in collectione Prof. Knoch.

*Al. caelata* — Mus. Prof. Knoch.

05 *O. piceus*, niger nitidus; thorace quinque-foveolato; fovea media recta; elytris pedibusque testaceis.

*Habitu* Ox. praecedentis; statura autem latiore et minus convexa; thorace quinque-foveolato &c.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  — 2 lin.

*Corpus* nitidum, planiusculum, latiusculum, punctum.

*Caput* rugosum, punctis quibusdam impressum; vel thorace majus, mandibulis exsertis, longis, denticulatis; vel thorace minus, mandibulis minoribus; antennis capite longioribus, caeterum ut in sp. praecedente.

*Thorax* subtransversus, lateribus rotundatis, medio latior; angulis obtusis; quinque foveolatus, foveis tribus disci profundioribus, lateralibus obsoletioribus; media recta; duabus, mediae adjacentibus, subobliquis vel subarcuatis, concavitate extrorsum versa, lateralibus latis obsoletis; interstitiis fovearum, thoracisque marginibus subelevatis. Hae foveae, interstitiis quatuor elevatis linearibus, sejunguntur, unde thorax etiam „quadrilineatus“ nominari potest.

*Elytra* planiuscula, ante humerum depressa; linea longitudinali prope suturam, punctisque cicatriculosis confertis, impressa.

*Abdomen* obtusum, coleoptris plus duplo longius.

Vicitat in fimo bovino, equino, ovillo, suillo, per totum annum; rarius in stercore humano; primo vere etiam locis apricis, in quisquiliis, sub lapidibus.

*Staph. piceus Fabr.* Ent. Syst. St. n. 55.

- *Payk.* Mon. St. n. 12.  $\alpha$ .

- *Payk.* Fn. Succ. St. n. 22.  $\alpha$ .

- *Panzer* Fn. Germ. H. 27. t. 14.

- *Olivier* Ent. St. n. 23, pl. III. f. 30.

- *Schrank* Austr. n. 449.

- *Rossi* Fn. Etr. n. 622?

- *Müller* Zool. Dan. Pr. n. 1094 p. 97.

- *rugosus Schrank* Boica n. 886.

- *piceus Rossii* huc pertinere videtur, quamquam ei sunt „magnitudo pediculi, elytra laevissima“ et quamquam „in ligno putrido habitat.“

*rugosus F.*

6 *O. carinatus*, niger, nitidulus; elytris fuscescentibus; pedibus pallidioribus; thorace quinquefoveolato.

*Habitu O. picei*; thorace autem angulis anticis acutioribus, elytris nunquam testaceis,

*Longitudo* 1 —  $2\frac{1}{3}$  lin.

Variat capite majore et minore, colore elytrorum antenarum et pedum &c.

*Var. I.* *O.* thorace convexiusculo nitido;

1. niger; ore, antennis, pedibusque rufis; elytris nigro-subrufescentibus; longitudine  $2\frac{1}{3}$  lin.

2. niger; ore, antennis, elytrisque fuscescentibus; pedibus rufis; longitudine  $2\frac{1}{3}$  lin.

3. niger; antennis pedibusque fuscis; longitudine  $1\frac{1}{3}$  — 2 lin.



4. niger; elytris obscure fuscis; pedibus rufo-testaceis, femoribus fuscis; longitudine  $1\frac{2}{3}$  lin.

*Var. II.* O. thorace planiusculo opaco.

1. niger; elytris obscure fuscis, pedibus testaceis, femoribus obscurioribus; longitudine  $1\frac{1}{3}$  —  $1\frac{3}{4}$  lin.

2. niger; elytris pedibusque fusco-piceis; longitudine  $1\frac{1}{3}$  lin.

3. niger; elytris obscure fuscis; pedibus testaceis; longitudine 1 —  $1\frac{1}{4}$  lin.

Omnes hae varietates sensim una in alteram transeunt sicque unam speciem sistunt.

Habitat cum O. praecedente, frequentior attamen.

*Staph. carinatus* Panzer Fn. Germ. H. 57. t. 24.

- *sulcatus* Fourcroy Ent. Par. St. n. 16,

Geoffr. Hist. St. n. 16,

*triflorus* F. a. m.

7 O. *pulcher*, niger, nitidus; antennis, ore, elytris, pedibusque rufis; thorace quinquefoveolato.

*Habitu* O. praecedentis; statura autem graciliore; thorace longitudine vix paulo latiore,

Longitudo 2 —  $2\frac{1}{4}$  lin.

*Antennae* elytris paulo obscuriores.

*Thorax* vel subnigro-rufescens, vel obscure sanguineus.

*Coleoptera* dilute rufa, basi nigricantia.

Habitat cum O. *piceo* et *carinato* sub lapidibus in horto aulico, Brunsvigae, tempore verno; multo attamen rarior.

8 O. *nitidulus*, niger, nitidus; elytris picescentibus; pedibus pallidioribus; thorace quinquefoveolato.

*Habitu* inter varietates minimas *O. carinati* et *O. depressum* medium tenet; ab illis autem, statura semper multo minore, ab hoc, nitore splendidiore et capite rugis profundioribus impresso, satis differt.

*Longitudo*  $\frac{4}{5}$  lin.

*Thorax*, sulcis seu foveis tribus mediis parallelis.

Habitat in fimo, cum *O. piceo* et *carinato*, rarior autem.

An varietas minuta *O. carinati*?

*arenarius Geoffr.*  
 ○ 9 *O. morsitans*, nitidus; thorace, sulca media longitudinali, impresso,

*Habitu* *O. praecedentis*; statura autem brevior, crassiore, paulo convexiore; thorace unisulcato &c.

*Corpus* crassiusculum, breve, subdepressiusculum, nitidum.

*Caput* ut in specie praecedente, nitidum, magnitudine etiam variabili.

*Thorax* transversus, coleoptorum latitudine; apice, truncatus, latissimus; lateribus et basi rotundatus; convexiusculus, nitidus; subtiliter, nec confertissime, punctus; punctis minorum speciminum cicatriculosis, minimorum crassioribus; sulca media longitudinali exaratus.

*Coleoptera* subtransversa, thorace paulo longiora, planiuscula, nitida, puncta, pallidiora.

*Abdomen* obtusum.

Color et magnitudo variant:

*Var. 1* *O.* totus niger; longitudine  $1\frac{1}{4}$  lin.

*Var. 2* *O.* niger; pedibus, elytrorumque disco testaceis; longitudine 1 —  $1\frac{2}{3}$  lin.

*Var. 3 O. niger*; elytris pedibusque fuscis; longitudine 1 —  $1\frac{3}{8}$  lin.

Habitat frequenter in stercore ovillo, bovino, humano; in terra etiam uliginosa.

*Staph. morsitans Payk.* Fn. Succ. St. n. 21.

- *trilobus Omer* Ent. St. n. 22. pl. V. f. 48.

- *pallidipennis* Panzer Fn. G. H. 27. t. 16.

Ad var. 2 solus *St. pallidipennis* Pz. referendus est; reliqui Staphylini, a me citati, ad var. 3.

*O. 10 O. cornutus*, nitidus; capite bispino; thorace unisulcato.

Habitu omnino *O. praecedentis*; capite autem, thoracis magnitudine, bispinoso; spinis, inter antennis sedentibus, porrectis, acutis.

Longitudo  $1\frac{1}{2}$  lin.

Corpus nigrum; elytris tarsisque fuscis.

*Aleoch. cornuta* — Mus. Prof. Knoch.

*Bledius*

*O. 11 O. tricornis*, thorace quadrato, convexo, scabro, unisulcato — maris cornuto; feminae mutico.

Longitudo  $1\frac{1}{2}$  — 3 lin.

Corpus subnitidum, punctum, longius et teretius quam in conspeciebus hujus generis.

Caput angulosum, thorace paulo angustius, punctum, opacum, nigrum; antennis et ore fuscis; feminae muticum, maris bicornutum; cornubus seu spinis validis, porrectis, ante oculos sedentibus; antennis capite thoraceque vix brevioribus, articulis, primo longissimo crasso, secundo brevioribus, tertio tenuissimo, clavatis, quarto ad septimum or-

biculatis crescentibus, octavo ad decimum transversis, ultimo ovato acuto.

*Thorax* subquadratus, angulis basis obtusis, convexus, coleoptrorum latitudine vel paulo angustior, niger, opacus, punctus; punctis confertis crassis cicatricosis; sulca media longitudinali impressus; feminae muticus, maris unicornutus; cornu, apicis thoracis medio insidente, porrecto, longitudine capitis.

*Coleoptra* subquadrata, convexiuscula, subnitida, confertissime puncta; vel tota rufo-fusca; vel sutura, imprimis circa scutellum, nigra.

*Abdomen* tertiusculum, obtusum, nitidum, coleoptris plus duplo longius, nigrum, apice fuscescente.

*Pedes* testacei, interdum femoribus obscurioribus.

Habitat Brunsvigae; — mas autem rarior.

*Staph. bicornis* Payk. Fu. Succ. St. n. 38.

- *Olivier* Ent. St. n. 41. pl. VI. f. 56.

- *armatus* Panzer Fu. G. H. 66. t 17 (mas.).

## Genus VII.

## O m a l i u m.

Palpi filiformes.

Thorax marginibus lateralibus elevatis.

Antennae extrorsum crassiores.

*Corpus* elongatum, depressiusculum, punctum.

*Caput* rugosum, angulosum, thorace minus. *Oculi* prosili-  
entes. *Palpi* filiformes; anteriores quadriarticulati, po-  
steriores triarticulati. *Antennae* extrorsum crassiores; ar-  
ticulis, primo longiore validiore, secundo minore, ter-  
tio paulo longiore, quam secundus, clavatis; sequenti-  
bus crescentibus; ultimo acuto.

*Thorax* transversus, marginatus, coleoptris paulo angustior,  
antice posticeque truncatus; ora laterali deflexa, glaberri-  
ma, basi lata.

*Coleoptra* rectangula, thorace longiora; elytris, angulis api-  
cis interioribus acutis.

*Abdomen* obtusum, planiusculum, latiusculum, breve.

*Pedes*; capitibus femorum approximatis, anticis, femore brevioribus, ejus autem crassitie, posterioribus brevissimis, absconditis; tibiis gracilibus ciliatis; tarsis tenuibus.

*Familia I.* Coleoptris, thorace paulo longioribus.

*Familia II.* Coleoptris thorace duplo et plus duplo longioribus.

Fam. I.

*O. planum*, nitidum, deplanatum, nigricans; elytris, antennis, pedibusque pallidis; thorace subfoveolato.

*Longitudo*  $1\frac{7}{8}$  lin.

*Corpus* nitidum, subtilissime punctum, deplanatum; planius quam in reliquis cospeciebus.

*Caput* triangulare, thoracis fere latitudine, nigrum; ore antennisque rufis; his, capitis thoracisque longitudine, basi pallidiore.

*Thorax* coleoptris paulo angustior; disco plano, foveis tribus sublaevibus, saepius obsolete, impresso; niger, vel obscure fuscus, marginibus pallidioribus, lateralibus rotundatis.

*Coleoptra* confertim puncta, picca, elytris trilineatis; lineis elevatis, longitudinalibus, laevibus nitidissimis, saepius obsolete.

*Abdomen* nigro-fuscum.

*Pedes* ochracei, tibiis subciliatis.

*Habitat?* — Quaedam specimina volatu cepti.

*Staph. planus* Payk. Fn. Succ. St. n. 48.

2 *O. depressum*, nitidulum, rufescens; capite, thorace, abdomineque obscurioribus; thorace laevi, convexiusculo.

*Longitudo*  $1\frac{1}{3}$  —  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Corpus* nitidulum, subtilissime punctum.

*Caput* subtransversum, thorace paulo angustius, nigrofuscum; ore antennisque rufis; his capitis thoracisque longitudine.

*Thorax* coleoptris paulo angustior, nigro-fuscus, convexus; marginibus lateralibus et basis rufis; illis subelevatis, basin versus latioribus.

*Abdomen* fuscum; apice obscuriore.

*Pectus* nigro fuscum.

*Pedes* testacei.

Victitat? — Copiam speciminum domi ad fenestras legi, diebus vernalibus et autumnalibus anno 1800.

*Xylotrupes brunneum* F.

3 *O. brunneum*, nitidum, rufescens; capite, elytrorum et abdominis apice plerumque obscurioribus; antennarum articulo ultimo orbiculato, acuto.

*Habitu* Om. praecedentis; statura autem majore, punctura crassiore.

*Longitudo*  $\frac{3}{4}$  —  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Corpus* nitidum punctum.

*Thorax* rufus; disco, foveolis duabus, saepius obsoletis, impresso.

*Coleoptra* confertim puncta, interdum subpuncto-striata.

*Pedes* testacei.

Variat magnitudine et colore:

*Var. 1* *O. rufum*; capite, elytrorum abdominisque apice nigris — minus.

*Var. 2* *O. rufum*; oculis, anoque nigris; elytris puncto-striatis. — majus.

*Var. 3* *O. totum rufum*; coleopttris punctis, haud puncto-striatis. — minimum.

Habitat Brunsvigae.

*Staph. brunneus* Payk. Mon. St. n. 45.

- Payk. Fn. Suec. St. n. 47.

- Fabr. Ent. Syst. Supl. p. 180?

*Staph. crenatoides*

4 *O. crenatum*, fuscum, nitidulum; pedibus pallidioribus; coleopttris crenato-striatis; antennarum articulo ultimo ovato acuto.

*Habitu* omnino *Om.* praecedentis varietatis majoris; statura autem latiore et majore; antennis, capite thoraceque paulo longioribus, articulo ultimo ovato, gracilioribus; coleopttris semper puncto- seu crenato-striatis; punctura crassiore.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  —  $2\frac{1}{4}$  lin.

Variat antennarum basi, thorace et elytris, concoloribus vel pallidioribus.

Habitat — Mus. Prof. Hellwig.

*Staph. crenatus* Payk. Fn. Suec. St. n. 46.

Dom. Paykull, loco citato, allegavit etiam *St. crenatum* Fabr. (Ent. Syst. St. n. 26.) cui Fabricius ipse, comparatione cum *St. striatulo* et *St. fulgido*, staturam et magnitudinem *St. politi* tribuit.

*Argyria*

5 *O. brachypterum* fuscum, nitidulum; antennis, thorace, elytris, pedibusque pallidioribus; capite nigro.



*Habitu* omnino Om. praecedentis; differt autem: thorace subquadrato, basin versus sensim subangustato; coleoptris brevibus, thorace vix longioribus, crenato-punctis, vix striatis.

Longitudo 2 lin.

Habitat — Mus. Prof. Hellwig.

*Endothia crenata* F.

6 *O. rufum*, rufum, nitidum; pedibus pallidioribus; oculis nigris; thorace quadrato; coleoptris puncto-striatis.

*Habitu* O. praecedentis; coleoptris autem longioribus — Ab O. brunneo et crenato, statura longiore, thorace quadrato, coleoptris paululum brevioribus crassius punctis, distinguitur.

Longitudo  $2\frac{1}{3}$  lin.

Corpus crassius punctum quam in conspecibus.

Thorax marginatus; margine autem tenui.

Coleoptra puncta, disco puncto-striato.

Habitat Brunsvigae.

*Propylaea rugosum* F.

7 *O. rugosum*, nigro-fuscum, nitidulum; antennis pedibusque pallidioribus; thorace foveolato; coleoptris crenato-striatis.

Longitudo  $2\frac{1}{2}$  lin.

Corpus nitidulum, punctum; punctis crassioribus, quam in Om. praecedentibus; depressum.

Caput; antennis, capitis thoracisque longitudine, extorsum subcrassioribus.

Thorax subquadratus, basin versus subangustatus, planiusculus, foveolatus; foveis tribus; una media longitudi-

nali abbreviata, duabus obliquis basi convergentibus abbreviatis; ita positus, ut quasi formam anchorae exhibeant.

*Coleoptra*, thorace paulo longiora, crenato - et puncto-striata.

Habitat in quisquiliis; semel modo captum, tempore verno, sub lapide, in horto aulico, Brunsvigae.

*Staph. rugosus Olivier* Ent. St. n. 42. pl. V. f. 43.

## Fam. II.

8 *O. rivulare*, nigrum, nitidum; coleoptris pallidioribus; pedibus rufis; thorace foveolato.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  —  $1\frac{2}{3}$  lin.

*Corpus* depressiusculum, latiusculum, nitidum, punctum.

*Caput* thorace duplo minus, nigrum, rugosum; rugis duabus longitudinalibus abbreviatis inter antennis positus; palpis, antennisque fuscis; his capitis thoracisque longitudine, articulo primo rufo.

*Thorax* basin versus vix paulo angustatus; lateribus rotundatis, marginibus lateralibus basi latioribus; foveolatus, foveis tribus disci longitudinalibus, abbreviatis, nec basin nec apicem thoracis attingentibus, media, ad apicem, minima, saepius obsoleta, duabus alteris majoribus, constantibus, basi latioribus, apicem versus attenuatis; niger, marginibus lateralibus interdum pallidis.

*Coleoptra* confertissime puncta, interdum subpuncto-striata, fusciscentia, elytrorum humeris subpallidioribus.

*Abdomen* breve, obtusum, ano acuto, ventre interdum rufescente.

Habitat frequens in floribus, in gramine, in agaricis et boletis, in fimo bovino et humano. Specimen unicum, longitudine  $1\frac{1}{8}$  lin, thoracis marginibus lateralibus pallidioribus, cepi in cadavere talpac, die X. Maji, anno 1801.

*Staph. rivularis* Payk. Mon. St. n. 46.

- Payk. Fn. Suec. St. n. 50.

- Olivier Ent. St. n. 49. pl. III. f. 27.

- Panzer Fn. Germ. H. 27. t. 15?

Quem Dom. Panzer, loco citato, exhibuit *St. rivularis*, coleoptris nimis brevibus delineatus est, nec conveniens cum descriptione ejus Paykulliana „clytra, capite thorace, que fere longiora“ — An hujus speciei?

~~Staph. rivularis~~ *Staph. rivularis*

9 *O. Viburni*, nigrum, nitidum; ore pedibusque fuscescentibus; thorace vix subfoveolato; coleoptris nigricantibus seu fuscis,

*Habitu*, medium tenet inter sp. praecedentem et sequentem; statura, illa paululum latius, hac paululum angustius; punctura, paulo subtiliore quam illa, paulo crassiore quam haec &c.

*Longitudo*  $1\frac{1}{4}$  —  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* Om. praecedentis; antennis totis nigris.

*Thorax* nitidus, punctus; foveis duabus obsolete, ante scutellum, impressus; caeterum Om. sequentis.

*Abdomen et coleoptra* Om. sequentis; his autem vel nigricantibus, vel fuscescentibus, vel picescentibus.

*Pedes* vel ochracei, vel piceo-testacei femoribus fuscis.

*Anthophagus Viburni* — Mus. Prof. Knoch.

*Pygostolus*  
 10 *O. florale*, nigrum, nitidum; antennis, ore, pedibusque rufis; thorace laevi.

*Habitu* *O.* praecedentis; statura paululum latiore; punctura subtiliore, thorace haud foveolato.

*Longitudo*  $1\frac{1}{4}$  —  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* laeve, vix subrugosum.

*Thorax* convexiusculus, lateribus rotundatus, nitidissimus, subtilissime punctus; margine laterali elevato basin versus latiore; disco interdum punctis duobus majoribus impresso.

*Coleoptera* obscure fusca; oblique, a margine laterali ad suturam, truncata.

*Abdomen* *Om.* rivularis (n. 7).

*Habitat* in floribus.

*Staph. floralis* Panzer Fn. G. H. II. t. 20.

- Payk. Mon. St. n. 47.

- Payk. Fn. Succ. St. n. 49.

Fabricii (Ent. Syst. St. n. 52.) *St floralis* huc non referri potest, quia est „parvus, depressus, thorace plano,“ et quia coleoptrorum longorum nulla mentio facta est.

*Pygostolus*  
 11 *O. Ranunculi*, nigrum, nitidum, ore, antennarum basi, pedibusque rufis; thorace subopaco, laevi.

*Habitu* *Om.* praecedentium; statura autem paulo crassiore; thorace convexiore; coleoptris longioribus, abdomen fere totum tegentibus.

*Longitudo* 1 lin.

*Corpus* nitidum; confertissime, subtiliter punctum.

*Caput* subrogosum, nigrum; antennis fuscis, basi rufis; ore rufo; caeterum ut in sp. praecedente.

*Thorax* convexus, subopacus, subtilissime confertissimeque punctus; disco interdum punctis quibusdam majoribus impresso; caeterum ut in sp. praec.

*Coleoptra* thorace plus duplo longiora, subpuncto-striata, picea, oblique truncata, quibusdam speciminibus praeterea appendiculata, angulo scilicet interiore apicis elytrorum producto (uti in *Silpha* appendiculata.).

*Abdomen*, maximam partem a coleoptris tectum; ut in Om. praec.

*Anthoph. Ranunculi* — Mus. Prof. Knoch.

*Silpha minuta* Fabr. Ent. Syst. S. n. 26?

*O. striatum*, nigrum, nitidum; pedibus rufescentibus; elytris puncto-striatis.

*Habitu* O. praecedentium; statura autem minima.

*Longitudo* vix 1 lin.

*Corpus* punctum.

*Antennae* fuscae, basi interdum rufescentes — *Palpi* rufescentes.

*Thorax* longitudine duplo fere latior, plerumque foveis disci duabus obsolete impressus.

*Coleoptra* interdum subrufescentia.

*Habitat* in floribus.

## Genus VIII.

## Anthopagus.

Palpi filiformes.

Antennae filiformes.

cf. mendicis 20x  
XI

*Thorax cordatus*  
Corpus depressiusculum, depile.

Caput suborbiculatum, rugosum, thoracis magnitudine.

Oculi parvi prosilientes. Antennae filiformes; articulis, primo validiore clavato, sequentibus campanulatis, longitudine subdecreascentibus, ultimo ovato acuto.

Thorax subquadratus, convexiusculus, basin versus angustior, punctus, coleoptris angustior et brevior; ora laterali deflexa, laevissima, basi latiore.

Coleoptra rectangula, plana, puncta.

Abdomen deplanatum, latum, obtusum; ano acuto.

Pedes; capitibus femorum approximatis, anticis femore brevioribus, ejus autem crassitie, posterioribus brevissimis absconditis; tibiis laevibus tenuibus; tarsis gracilibus.

○ 1 *A. caraboides*, testaceus, nitidus; thorace antennisque rufis; capite, abdominisque apice nigris.

*Longitudo*  $1\frac{2}{3}$  lin.

*Corpus* gracile.

*Caput* nigrum; ore antennisque rufis; his capite thoraceque longioribus.

*Thorax* convexus, immarginatus, cordatus, vix latitudine paulo longior; angulis anticis rotundatis, posticis acutis; subtilissime confertissimeque punctus, rufus disco fusciscente.

*Coleoptera* confertim puncta; punctis crassioribus quam reliquae corporis partes.

*Abdomen* basi testaceum, apice nigrum; quibusdam specimenibus, segmentis duobus, quibusdam, segmentis tribus vel quatuor ultimis nigris.

Habitat in floribus Crataegi oxyacanthae, haud rarus.

*Staph. caraboides* Payk. Mon. St. n. 19.

- Payk. Fn. Suec. St. n. 25.

*Carabus abbreviatus* Fabr. Ent. S. C. n. 188.

*A. testaceus*, testaceus, nitidus; capite thoraceque rufis; abdominis apice obscuriore; oculis nigris.

*Habitu*, partiumque forma ac proportione, A. praecedenti simillimus; statura autem majore; punctis thoracis capitisque distinctioribus, haud subtilioribus quam puncta coleoptrorum,

*Longitudo* 2 lin.

*Abdomen* segmentis ultimo et penultimo nigris vel fusciscentibus.

Habitat in floribus Crataegi Oxyacanthae, cum A. praecedente; rarior autem — Nondum mihi specimina occurrerunt, quae, ratione puncturae, magnitudinis et coloris, hunc

et praecedentem Anthophagum, modo facili, conjunxissent, et me persuasissent, ambo ad unam eandemque speciem numerandos esse.

*Staph. caraboides* Linn. (Fn. Suec. n. 854.) et *Fabr.* (Ent. Syst. St. n. 53.) a quibusdam Entomologis huc referuntur; ille autem pediculi est magnitudine; hunc autem *Fabricius* vix tam procul a *Carabo abbreviato* suo (Anthoph. caraboides.) removisset, si ei adeo similis fuisset. Hac de causa ego illos citare nolui.

*Incom. Bloch.*  
 3 *A. armiger*, nitidus, rufus; elytris pedibusque testaceis; oculis abdomineque nigris.

*Habitu* A. praecedentium; statura autem majore.

*Longitudo*  $1\frac{3}{4}$  — 2 lin.

*Caput* maris, thorace latius, bicornutum; cornubus brevibus, porrectis, apice subaduncis, ad basin antennarum; mandibulis validis; *feminae* thorace subangustius, inerme, mandibulis tenuioribus.

*Thorax* confertim punctus; quibusdam specimenibus submarginatus, quibusdam inmarginatus.

*Coleoptra* confertim puncta, subpuncto-striata, abdomen plus dimidio tegentia.

*Anth. armiger* — Mus. Prof. Hellwig.

*Leskeva longelytrata Guze.*

4 *A. obscurus* niger, nitidulus; elytris pedibusque pallidioribus.

*Habitu*, A. praecedente paulo angustior; thorace convexiore.

*Longitudo*  $1\frac{3}{4}$  lin.



*Corpus minus nitidum et laeve quam in speciebus praecedentibus.*

*Caput nigrum; antennis fuscis.*

*Coleoptra confertissime puncta.*

*Variat colore elytrorum et pedum.*

*Var. 1 A. elytris pedibusque fuscis.*

*Var. 2 A. elytris pedibusque testaceis.*

*Var. 3 A. elytris fuscis, pedibus testaceis.*

*Habitat in floribus.*

*Staph. obscurus Payk. Fn. Succ. St. n. 28.*

Hunc Anthophagum olim sub nomine *Staph. tecti Payk.* accepi; persuasum autem me habeo, illum ab hoc prorsum diversum esse. *Anth. obscuro* sunt nec „thorax in medio „longitudine plus quam dimidio latior“ nec „antennae nigrae, basi pallidiores;“ id, quod Paykull *St. tecto* tribuit.

*Staph. obscurus*

5 *A. plagiatus*, niger, nitidulus; antennis pedibusque fuscis; elytrorum disco sanguineo.

*Habitu omnino A. praecedentis; statura autem multo majore.*

*Longitudo*  $2\frac{1}{3}$  lin.

*Elytra*, striga discoidali longitudinali, subobliqua, nec basin nec apicem attingente, sanguinea.

*Habitat* — Mus. Prof. *Hellwig.*

*Staph. plagiatus Payk. Fn. Succ. St. n. 26.*

An *St. plagiatus Fabr.* (Ent. Syst. Suppl. p. 180.) cui „thorax planus“ est?

## Genus IX.

## Tachyporus.

Palpi acuminati.

Thorax brevis glaber.

Tibiae spinosae.

*Corpus* laevissimum, nitidum, elongatum, convexum, apicem versus attenuatum.

*Caput*, retractum, thorace angustius. *Palpi* anteriores quadriarticulati; posteriores triarticulati. *Antennae* extrorsum crassiores, capitis thoracisque longitudine, articulis, primo brevi valido, secundo tenuissimo, subclavatis, sequentibus crescentibus subcampanulatis, ultimo ovato longiore.

*Thorax* convexus, brevis, glaber; lateribus deflexis; latitudine coleoptrorum, vel paulo latior; ora laterali infra reflexa, abscondita.

*Coleoptera*, thorace longiora.

*Abdomen* apicem versus attenuatum, pilosellum.

*Pedes* cursorii; capitibus femorum approximatis, anticis femore crassioribus nec longioribus, mediis femore duplo

brevioribus ejus autem crassitie, posticis brevissimis absconditis; tibiis subciliato-spinosis; tarsis gracilibus, articulo primo longiore.

Familia I. thorace suborbiculato.

Familia II. thorace transverso.

Fam. I.

Corpus gracilius quam in familia sequente, antice posticeque attenuatum.

*Confusus*  
 O *T. dissimilis*, niger, nitidus; pedibus antennisque rufo-testaceis.

Longitudo  $1\frac{1}{4}$  —  $1\frac{3}{4}$  lin.

Corpus laevissimum, nitidissimum.

Caput subovatum, thorace paulo angustius, nigrum; antennis; capituli thoracisque longitudine, fuscis, articulo primo rufo vel testaceo; palpis rufis.

Thorax suborbiculatus, apicem versus vix subangustior, basi subrotundatus, fuscus, vel nigricans marginibus summis pallescentibus.

Coleoptera subquadrata, nitida, convexiuscula, confertissime subtiliter puncta, vel obsolete puncto-striata; nigrofusca, marginibus subpallidis.

Abdomen nigro-fuscum.

Habitat Brunsvigae.

*Oxyporus rufipes* Panzer Fn. G. H. 27. t. 20?

## Fam. II.

*Corpus* minus gracile quam in familia prima; abdomine attenuato.

*Caput* orbiculatum.

2 *T. nitidulus*, nitidissimus, laevis, gracilis; coleoptris planiusculis; colore variabili.

*Habitu* graciliore quam *Tachyp.* sequentes; coleoptris autem planis praecipue differt.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Caput*, thorace multo angustius.

*Thorax* transversus, lateribus rotundatus, antice posticeque truncatus, coleoptris paulo latior.

*Coleoptra* rectangula, plana, impuncta.

*Pedes* rufi vel testacei; tibiis ciliato-spinosis.

*Var. 1* *T. fuscus*; capite atro; antennis, thoracis lateribus, elytris, pedibus, segmentorumque marginibus, testaceis.

*Var. 2* *T.* varietati 1 similis; vitta autem elytrorum marginis exterioris nigra.

*Var. 3* *T. niger*; thorace nigro-rufescente; antennis, pedibus, coleoptrorum margine apicali, segmentorumque marginibus, rufo testaceis.

*Habitat* in fimo; haud frequens.

*Staph. nitidulus* *Fabr.* Sp. Ins. St. n. 17.

- *Olivier* Ent. St. n. 48. pl. III. f. 28.

*Oxyp. minutus* *Fabr.* Ent. Syst. O. n. 20.

3 *T. abdominalis*, rufus, nitidus; antennis pedibusque pallidioribus; abdomine fusco; oculis nigris.

*Habitu* T. praecedentis; thorace autem coleoptrorum latitudine; coleoptris convexis.

*Longitudo*  $1\frac{1}{3}$  lin.

*Habitat* Brunsv. — Mus. Pr. *Hellwig*.

*Oxyp. abdomin.* Fabr. Ent. S. O. n. 17.

4 *T. lateralis*, niger, nitidus; antennis, palpis, thorace, pedibus, elytrisque rufis; his, basi vittaque marginis exterioris, nigris.

*Habitu* T. praecedentis; statura autem latiore; coleoptris thorace paulo angustioribus.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Habitat* Brunsvigae.

*Tachyp. lateralis* — Mus. Pr. *Knoch*.

5 *T. marginatus* niger, nitidus; antennis, pedibus, thoracisque lateribus testaceis; elytris rufis, vitta marginis exterioris nigra.

*Habitu* T. praecedentis; statura paululum latiore.

*Longitudo*  $1\frac{1}{3}$  —  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Thorax* niger, marginibus lateralibus, praecipue basin versus, testaceis.

*Habitat* in quisquilliis et in floribus, haud infrequens.

*Oxyp. marginatus* Fabr. Ent. S. O. n. 6.

- *Panzer* Fn. Germ. H. 27. t. 17.

*St. dispar* var.  $\beta$ . *Payk.* Mon. St. n. 54.

- *Payk.* Fn. Suec. St. n. 69. v.  $\beta$ .

- *chrysomelinus* *Rossi* Fn. Etr. n. 616. v. 2.

*St. Blattinus* Schrank Austr. n. 447.

- Schrank Boica n. 878.

Dom. Paykull *Oxyp. brunneum* et *Hypnorum* Fabr. cum hac specie conjunxit. Dubito, an juste? Hic *Tach. marginatus* elytrorum vitta marginali nigra distinctus est. *Staph. nitidulus* Fabr. meliore jure ad *Tach. nitidulum* (n. 2.) refertur.

6 *T. ruficollis*, nitidus, nigricans; coleoptrorum summo apice pallidiore; thorace pedibusque rufis.

Habitu omnino *T. praecedentis*; colore constantissimo differt.

Longitudo  $1\frac{1}{4}$  lin.

Caput nigrum; antennis palpisque fuscis.

Coleoptra subquadrata, thoracis latitudine, nigro-fusca; margine apicis plus minusve pallescente.

Habitat — Mus. Prof. Hellwig.

*St. chrysomelinus* Rossi Fn. Etr. n. 616. Var. I. a. β.

- *dispar* Payk. Mon. St. n. 54. d. et Fn. S. St. n. 69. d.

7 *T. chrysomelinus*, rufus, nitidus; capite, scutello, coleoptrorum basi et marginibus lateralibus, abdomine et pectore nigris.

Habitu omnino *T. praecedentium*; colore autem semper differt.

Longitudo  $1\frac{1}{4}$  —  $1\frac{1}{2}$  lin.

Caput nigrum; ore, antennarumque fuscarum basi, testaceis.

Thorax, coleoptris latior, plerumque rufo-testaceus seu testaceus, rarissime nigro-fuscus.

*Coleoptra* plerumque dilute rufo-testacea, marginibus lateralibus et circa scutellum nigra; rarius rufo-castanea, basi lateribusque nigris.

*Pedes* testacei.

\* Vicinat frequens in floribus, in foliis, et in gramine; rarior in fimo bovino.

*Staph. chrysom.* Linn. Fn. Suec. n. 855.

- *Rossi* Fn. Etr. n. 616. var. I. a. α.

- *Schrank* Austr. n. 448.

- *Schrank* Boica n. 879.

- *Fourcr.* Ent. Par. St. n. 18.

- *Olivier* Ent. St. n. 47. pl. III. f. 22.

*Oxyporus chrysom.* Fabr. Ent. S. O. n. 15.

- *Panzer* Fn. Germ. H. 9. t. 14.

*Staph. dispar* Payk. Mon. St. n. 54. var. α.

- *Payk.* Fn. Suec. St. n. 69. var. α.

Dom. Paykull, loco e Fn. Suecica allegato, citavit etiam *Ox. pygmaeum* Fabr. (Ent. Syst. O. n. 13.), quem ad *Tachynum melanocephalum* retuli (v. n. 15.). *Tachyp. chrysom.* nunquam in boletis mihi occurrit — Dom. Fabricius, loco allegato, *St. obtusum* citavit, quem ipse in Mantissa Insectorum descripsit. Apparet autem ex hac descriptione, illum ad *Tachyporum* sequentem pertinere — Nec var. γ *St. disparis* Payk. (Mon. St. n. 54 et Fn. Suec. St. n. 69.) ad *Tach. chrysomelin.* referenda est, uti Dom. *Panzer* (Fn. Ins. Germ. H. 9. n. 14.) credit, sed ad *T.* sequentem.

*Chrysom. L.*

8 *T. aialis*, nitidus, rufo-testaceus; oculis, pectore, elytrorum basi, scutello, abdominisque apice, nigris.

*Habitu* T. praecedentibus simillimus; colore autem semper distinctus.

*Longitudo*  $1\frac{1}{4}$  —  $2\frac{1}{4}$  lin.

*Caput* rarius nigricans.

*Coleoptra* seminigra, semirufo-testacea.

Victitat cum T. praecedente.

*Oxyporus analis* Fabr. Ent. S. O. n. 10.

- Panzer Fn. Germ. H. 22. t. 16.

*Oxyp. obtusus* Schwank Boica n. 892.

*Staph. obtusus* Fabr. Syst. Ent. St. n. 10.

- Schwank Austr. n. 451.

- Rossi Fn. Etr. n. 621.

- *chrysemelinus* Rossi Fn. Etr. n. 616. Var. I. b.

- *dispar* Payk. Mon. St. n. 54. v.  $\gamma$ .

- Payk. Fn. Suec. St. n. 69. v.  $\gamma$ .

Non credo, Dom. Paykull, loco citato, *St. chrysemelinum* Linn. (Fn Suec. n. 855.) jure allegasse. Vide sp. praecedentem.

Dom. Paykull hanc et tres praecedentes species; sub nomine speciali *St. disparis* (Mon. St. n. 54 et Fn. Suec. St. n. 69.) conjunxit. Licet autem omnibus eadem sit statura, eadem magnitudo, eademque partium forma et proportio, licet omnes iisdem locis habitent, color attamen constantissimus et satis distinctus singularium specierum me inhibuit, quo minus exemplum viri cel. secutus sim; inter magnam enim multitudinem speciminum ne unicum quidem intermedium reperi, quod unam alteramque speciem connexisset.

9 *T. pubescens* nitidulus, fuscus, subrufescens, subsericans; pedibus antennisque pallidioribus.



*Habitu*, T. praecedentibus convexior et gracilior; abdomine brevior et angustior; colore obscuro subopaco.

*Longitudo*  $1\frac{2}{3}$  —  $2\frac{1}{4}$  lin.

*Tibiae* subspinosae.

Variat corpore subnitido et opaco, plus minus sericante; colore rufescente vel fusco.

Habitat passim in succo putrido sub arborum demortuarum cortice.

*Staph. pubescens* Payk. Mon. Carab. ap. p. 138. n. 53 — 54

var.  $\beta$ .

*Staph. cellaris* Payk. Fn. Suec. St. n. 67. v.  $\beta$ .

*T. cellaris*, nitidulus, sericeo-fuscus; ore, antennis, thoracis angulis basis, macula magna clytrorum humerali, pedibusque; rufo-testaceis.

*Habitu*, T. praecedente brevior et latior.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  — 2 lin.

*Coleoptra* et *abdomen* plus minusve, interdum vix, sericant — Abdomen breve, valde attenuatum et gracile, <sup>a</sup>co-  
leoptris maximam partem tectum.

Habitat cum T. praecedente; rarior attamen.

*Staph. cellaris* Payk. Fn. Suec. St. n. 67. v.  $\alpha$ .

- *pubescens* Payk. Mon. Carab. append. p. 138. n. 53 — 54

var.  $\alpha$ .

Si speciebus hac et praecedente, verum *St. cellarem* et verum *St. pubescentem* Payk. descripsi, quod utique credo, non intelligo, cur vir cel. ambo in unam speciem conjunxerit, cum satis inter se discrepent — *Oxyp. cellaris* et *bima-*

*culatus* Fabr. (Ent. Syst. Ox. n. 5 et 8.) valde invicem congruere videntur; unus illorum certo, forsan vel uterque, huc referri potest.

*Spinosus*

- 11 *T. bipustulatus*, nitidulus, nigricans; pedibus fuscis; macula elytrorum basis, prope suturam, rufescente.

*Habitu* omnino *T. praecedentis*; convexior attamen et paulo major.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  — 2 lin.

*Corpus* subtilissime griseo-subsericans.

*Caput*, ore antennisque fuscis; his, in individuis minoribus, articulis duobus ultimis testaceis.

*Elytra*, macula basis subquadrata rufa, magnitudine tertiae partis elytri, nec marginem exteriorem nec suturam attingente, huic autem propiore, speciminibus minoribus minus determinata.

*Anus et pedes* rufescentes.

*T. bipustulatus* — Mus. Pr. Knoch.

*Comzonus*

- 12 *T. binotatus*, niger, nitidus; antennis, macula elytrorum humerali, pedibusque fuscis.

*Habitu* *T. cellari* (n. 10.) similis; statura autem brevior, crassior, convexior; thorace nitidissimo, apicem versus angustato.

*Longitudo*  $1\frac{1}{4}$  lin.

*Thorax* lateribus subpallidior.

*Abdomen* subfuscum.

*Habitat* — Mus. Pr. Hellwig.

- 13 *T. bipunctatus* nigro-fuscus, subsericeo-nitens; puncto elytrorum humerali pedibusque rufis; antennis rufis, medio obscurioribus.

*Habitu* *T. praecedentis*; statura autem graciliore et convexiore.

*Longitudo*  $\frac{3}{4}$  lin.

*Habitat* — Mus. Pr. *Hellwig*.

*Conosoma*

- 14 *T. pedicularius* fuscus, subsericeo-nitens; antennis pedibusque testaceis.

*Habitu* *T. pubescenti* (n. 9.) simillimus; statura autem multo minore.

*Longitudo*  $\frac{3}{4}$  lin.

Thoracis margines, elytrorumque apex interdum pallidiores sunt.

*Habitat* — Mus. Pr. *Hellwig*.

## Genus X.

## T a c h i n u s.

Palpi filiformes.

Antennae extrorsum crassiores.

Thorax inmarginatus, basi truncatus.

*Corpus* laeve, nitidum, elongatum, convexum, apicem versus attenuatum.

*Caput* thorace angustius, retractum. *Clypeus* angustus, apicem versus angustatus, obtusus. *Palpi* filiformes, anteriores quadriarticulati, posteriores triarticulati. *Antennae* capitis thoracisque longitudine; articulis, primo valido, secundo tenuissimo tertioque, clavatis, sequentibus sensim validioribus, ultimo ovato.

*Thorax* convexus, lateribus deflexus; ora laterali infra reflexa; abscondita, vix conspicua.

*Coleoptera* convexa, thorace longiora.

*Abdomen* pilosum, apicem versus attenuatum.

*Pedes* ut in genere praecedente; tibiis spinoso-ciliatis; tarsis tenuibus, excepto *T. análi*, (n. 18.).

*Familia I.* thorace transverso.

*Familia II.* thorace suborbiculato.

Fam. I.

*Corpus* minus gracile quam in familia II subtilissime confertissimeque punctum; punctis oculo bene armato conspicuis.

*Caput* suborbiculatum, thorace triplo minus; ore producto.

*Thorax* transversus, lateribus leniter deflexis.

*Coleoptera* thoracis latitudine, angulis acutis.

1 *T. subterraneus* niger, nitidissimus; clytris, macula humerali oblonga testacea.

*Habitu* T. sequentium; statura autem angustiore, capite majore &c.

*Longitudo* 2 —  $2\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* thorace vix triplo minus, nigrum; antennis fuscis.

*Coleoptera* rectangula.

*Pedes* fusci.

*Habitat* Brunsvigae.

*Oxyporus subterr.* Fabr. Ent. S. O. n. 4.

*Staph. subterr.* Payk. Mon. St. n. 52.

- Payk. Fn. Suec. St. n. 66.

- Rossi Fn. Etr. n. 617.

- Linn. Fn. Suec. n. 849?

Linnei *St. subterraneum* interrogative allegavi, cum ejus corpus pediculo tantum duplo majus sit.

02 *T. bipustulatus*, niger, nitidus; antennis, pedibus, clytrorum macula humerali, rufescentibus.

*Habitu*, T. praecedente multo convexior et latior — A T. sequente antennis brevioribus, crassioribus, totis rufis, macula elytrorum humerali magna quadrata satis determinata, distingui potest.

*Longitudo* 2 lin. vel paulo longior.

*Caput* thorace plus triplo longius.

*Cleoptra* subquadrata.

*Habitat* in fimo; rarior.

*Oxyporus bipust.* Fabr. Ent. S. O. n. 9.

- Panzer Fn. Germ. H. 16, t. 21.

De *St. bipustulato Rossii* (Fn. Etr. n. 620.) superius, in descriptione *St. bipustulati* Fabr. (n. 54.) jam locutus sum.

3 *T. humeralis*, niger, nitidus; articulo antennarum primo, thoracis margine laterali, pedibusque rufis; colore elytrorum variabili.

*Habitu* omnino T. praecedentis; antennis autem longioribus gracilioribus, fuscis, articulo primo pallidiore — A T. sequente sat differt.

*Longitudo*  $2\frac{1}{2}$  — 3 lin.

Variat colore elytrorum.

*Var. 1* T. colcoptis nigris, basi summoque apicis margine rufis.

*Var. 2* T. elytris rufis, disco obscuriore.

*Var. 3* T. ut V. 2; thoracis margine basis summo rufescente.

*Habitat* cum T. praecedente et sequentibus in fimo.

*Oxyp. humeralis* Schneid.

- *marginellus* Panzer Fn. G. H. 9. t. 13?

*Steph. marginalis* Schwank Boica n. 881.

*Staph. rufipes* Payk. Mon. St. n. 53. v. γ.

- Payk. Fn. Succ. St. n. 65. v. β. δ.

Dom. Paykull (Fn. Succ. St. n. 65 v. ε.) *Staph. flavescens* Linn. et *Oxyp. marginellum* Fabr. cum hac specie conjunxit. Nolui autem ejus exemplum sequi, cum *Oxyp. marginellus* Fabr., statura, magnitudine, partiumque forma &c. ab hoc Tachino valde recedat — *St. flavescens* Linn. haud novi; forsitan varietas junior cujuspiam Tachini est — *Tachin. rufipes* nunquam lateribus thoracis testaceo - rufescentibus occurrit; rarissime margine tantum summo laterali pallescente. Quapropter haud cunctatus sum, varietates *St. rufipedis* Payk. allegatas hic citare.

*Oxyp. marginellum* Panzeri sub hac specie allegavi, quia, magnitudine et colore omnino ab *Oxyp. marginello* Fabr. diversus, huc potius spectat.

4 *T. rufipes*, niger, nitidus; antennis fuscis; pedibus pallidioribus; colore elytrorum variabili.

*Habitu*, T. praecedenti similis; statura autem paulo graciliore; thorace angustiore, minus convexo, lateribus minus rotundatis, concoloribus; antennarum articulo primo obscuro.

*Longitudo* 2 —  $2\frac{2}{3}$  lin.

*Thorax* apicem versus paulo angustatus, capite vix triplo major, niger; rarissime margine laterali summo subrufescente.

*Coleoptera* subrectangula.

*Abdomen* plerumque breve obtusum, rarius elongatum, apicem versus sensim attenuatum; segmento quinto reliquis longiore, infra vel sinuato seu (abdomine nempe angustio-

re) inciso, vel simplici, margine integro; penicillis tribus vel quatuor, et forcipe cornea brevi, saepius abscondita, infra segmento quinto provenientibus, a segmentis ultimo et penultimo tectis, penicillis attamen tribus anto longioribus — Ornamenta plane similia, eodemque modo differentia, in speciebus praecedentibus Tachinorum observavi. Revera differentiam sexus indicare videntur, nec vero differentiam speciei; id quod ex analogia concludo, cum nonnullis Staphylinorum speciebus similes sint sinus et incisioes segmentorum penultimi et antepenultimi — Confer quae huc pertinentia in praefatione monui.

Ratione coloris, varietates sequentes mihi occurrerunt:

*Var. 1* *T. Colcoptis* nigris; summo apicis margine, elytrorumque humeris rufis.

*Var. 2* *T. elytris* nigris; macula humerali, margine apicis, suturaque, haec autem tenuissime, rufis.

*Var. 3* *T. elytris* nigris; marginibus fuscis vel rufis.

*Var. 4* *T. elytris* rufis; disco obscuriore.

*Var. 5* *T. elytris* dilucide rufis.

Omnes haec varietates variant pedibus rufis vel fuscis.

Habitant in omnibus excrementis; varietates 3 et 4 frequentissimae, reliquae rariores.

*Staph. rufipes* Payk. Fn. Succ. St. n. 65. v.  $\alpha$ .

- Payk. Mon. St. n. 53. v.  $\alpha$ .  $\beta$ .

- Rossi Fn. Etr. n. 618.

- Olivier Ent. St. n. 46. pl. IV. f. 35.

- *spinipes* Pontopp. Naturh. in Dän. p. 211. t. 16.

- *marginalis* Fourcv. Ent. Par. St. n. 19.

- Geoffr. Hist. St. n. 19.

- De Geer Mem. St. n. 11.



Haud mirum videtur, hanc et praecedentes duas species, cum habitu invicem adeo similes sint, saepius etiam confusas, et, quia hucusque nondum characteribus satis firmis et distinctivis sejunctae essent, cum aliis, longe descendibus, commutatas esse. Contigit mihi, numero specimen majore, ut characteres eorum constantes distinctivos eruerim; et studui, has species, diagnosi descriptione et comparatione inter se, modo facili et plano, disjungere — *Oxyp. rufipes Panzeri* (Fn. G. H. 27. n. 20.) huc non pertinet. Ego saltem nunquam *Ox. rufipedem* aterrimum, antennae totis pedibusque rufis vidi; nec in agaricis putrescentibus degentem reperi — Dom. I. Sturm olim *Tach. rufipedem* verum, et quidem var. 4, sub nomine autem *Staph. fuscipedis*, mecum communicavit. Nec autem *Staph. fuscipes Panzeri* (Fn. G. H. 27. t. 12.) est, cui margo lateralis thoracis et antennae fusciscentes sunt; nec *St. fuscipes Fabr.* (Ent. S. St. n. 38.), qui jam ad *Aleocharas* relatus est — *Oxyp. rufipes Fabr.* (Ent. S. O. n. 21.) tottis „niger, pedibus rufis,“ huc non numerandus est — &c.

quæ Nr 4.

- 5 *T. signatus*, niger, nitidus; antennarum articulo primo, elytrorumque puncto humerali, rufis; pedibus fuscis.

*Habitu et longitudine* omnino *T. praecedentis*, imprimis varietatis 1; articulo autem primo antennarum constanter rufo.

Tribus hujus speciei individuis, quae examinavi, segmentum quintum abdominis infra margine simplici, nec sinuato nec fisso, erat, et tres penicilli, quos hoc segmentum exserit, ano longiores erant.

Variat elytrorum puncto humerali obsoleto, et margine summo apicis rufescente.

Habitat — Mus. Prof. *Hellwig*.

- in T. n. 4.*  
 ○ 6 *T. pullus*, niger, nitidus; antennarum articulo primo, pedibusque rufis.

*Habitu* omnino *T. humeralis* (n. 3.); statura autem paulo latiore; capite majore; thorace convexiore, latiore, margine laterali concolore; coleoptris quadratis &c. — A *T.* praecedente et antepaecedente satis distinctus est.

*Longitudo*  $2\frac{1}{4}$  lin.

*Antennae* fuscae; articulo primo rufo.

*Coleoptera* interdum summo apicis margine subrufescente.

*Abdominis* segmentum quintum variat ita, ut in *T. rufipede* (n. 4.)

*Tachyporus pullus* — Mus. Pr. *Knoch*.

- larvipes F.*  
 ○ 7 *T. castaneus*, niger nitidus; elytris pedibusque fuscis.

*Habitu* omnino *T. rufipedis* (n. 4.) statura autem brevior et paululum crassior.

*Longitudo*  $1\frac{2}{3}$  — 2 lin.

Variat colore pedum et elytrorum.

*Var. 1* *T.* elytris totis pedibusque fuscis.

*Var. 2* *T.* elytris fuscis, humeris margineque laterali et apicis pallidioribus; pedibus fuscis.

*Var. 3* *T.* elytris pedibusque pallide castaneis.

*Tachyporus castaneus* — Mus. Pr. *Knoch*.

*T. sordidus*, niger, nitidus; antennis, thoracis marginibus, elytris, pedibus, anoque fuscis.

*Habitu* T. praecedentis; capite autem paulo minore, thorace paululum angustiore fusco-marginato.

*Habitat* — Mus. Prof. Hellwig.

*Staph. fuscipes* Panzer. Fn. G. H. 27. t. 12?

*T. fimetarius*, niger, nitidus; pedibus, thoracis margine laterali, elytrorum humero et margine apicali, rufis.

*Habitu et longitudine* T. marginelli (n. 14.); differt autem thoracis lateribus paulo rotundioribus, antennis totis nigris, &c. — A T. castaneo (n. 7.) statura graciliore, thorace minus convexo lateribus rufo, dignoscitur.

*Habitat* in fimo.

*T. laticollis*, niger, nitidus; elytris pallidioribus; pedibus rufis — thoracis margine laterali vel unicolore vel pallido.

*Habitu* omnino T. humeralis (n. 3.); statura autem multo minore.

*Longitudo*  $1\frac{3}{4}$  lin.

Variat colore elytrorum:

*Var. 1* T. elytris nigricantibus, summo apicis margine rufo.

*Var. 2* T. elytris nigricantibus, margine laterali et apicis rufis.

*Var. 3* T. elytris fusciscentibus.

*Habitat* — Mus. Prof. Hellwig.

*T. corticinus*, nitidus, brevis, convexus, crassus; colore variabili.

*Habitu* breviorē, crassiorē, convexiorē quā reliquæ hujus generis species, *Tachyporo anali*, *chrysomelino* et affinis, similis; palpis autem hujus generis.

*Longitudo*  $1\frac{2}{3}$  lin.

*Color* variat;

*Var. 1* T. totus testaceus.

*Var. 2* T. testaceus; capite, antennarum abdominisque apice, obscurioribus;

*Var. 3* T. testaceus; capite obscuriore, antennarum apicē fusco; oculis nigris.

*Var. 4* T. testaceus; antennarum apice, abdomineque obscurioribus; oculis nigris.

*Var. 5* T. fuscens; thoracis disco obscuriore; capite abdomineque nigris; antennarum basi pedibusque rufis.

*Tachyporus corticinus* — Mus. Prof. Knoch,

*Oxyporus testaceus* Fabr. Ent. S. O. n. 18?

*Oxyp. brunneus* Fabr. Ent. S. O. n. 19?

Conjicere tantum queo, Oxyporos citatos huc referendos esse. Diagnoses et descriptiones eorum in *Fabr. Ent. Syst.* nimium sunt breves, insectorum autem huc pertinentium et varietatum eorum multitudo nimis magna, quam quod aliquid certi de eorum synonymia dici possit,

12 *T. immaturus* fuscus, nitidus; capite nigro; antennarum basi, thoracis elytrorumque limbis, segmentorum marginibus, pedibusque, rufo-testaceis.

*Statura, magnitudo, partiumque forma et proportio*, omnino *T. marginelli* (n. 13<sup>4</sup>); forsan mera ejus varietas junior; colore satis distinctus est.

Habitat in fimo bovino; semel tantummodo captus.

An *Oxyp. brunneus* Fabr. Ent. S. O. n. 19?

13 *T. collaris*, nigricans, nitidus; thorace pedibusque rufis.

Habitu *T.* sequentis; statura autem paulo graciliore.

Longitudo  $1\frac{2}{3}$  lin.

Caput, supra nigerrimum, infra rufescens; antennis, articulis tribus primis (reliqui deficiunt) rufis.

Coloptera thorace duplo ferme longiora, confertim et subtiliter puncta; punctis distinctis conspicuis; nigro-fuscescentiâ, margine apicis rufo.

*Tachypor. collaris* — Mus. Pr. *Knoch.*

14 *T. marginellus*, niger, nitidus; antennis basi pallidioribus; thoracis marginibus laterali et basis, pedibusque testaceis.

Habitu *T. laticollis* (n. <sup>10</sup> 9.); thorace autem paulo minus convexo, lateribus minus rotundatis, rectis.

Longitudo  $1\frac{1}{3}$  —  $1\frac{2}{3}$  lin.

Antennae fuscae, basi pallidae.

Variat elytris totis picco-fuscis; vel nigris, humero et margine apicis, interdum etiam margine laterali, testaceis.

Habitat in sylvis, in fimo bovino et equino.

*Oxyp. marginellus* Fabr. Ent. S. O. n. 23.

*Staph. rufipes* Payk. Fn. Suec. St. n. 65. v. 2.

Dubito, an *Oxyp. marginellus Panzeri* (Fn. Germ. H. 9. t. 13.) huc referri queat. Magnitudine et colore differt. Sub *T. humerali* (n. 3.) ejus jam mentionem feci — A *T. rufipede* (St. rufip. Payk.) satis est distinctus, et nullo modo ejus varietas.

15 *T. suturalis* niger, nitidus; thoracis lateribus pedibusque testaceis; elytris testaceis, strigis duabus latis, una disci, altera laterali, interdum medio confluentibus, nigris.

*Habitu* brevi, convexo, fere *T. corticini* (n. 10.).

*Coleoptra* subtransversa, vix quadrata.

*Habitat* in fimo; rarior.

*Oxyp. suturalis* Panzer Fn. G. H. 18. t. 20.

Hic Tachinus apud nos semper sic invenitur, uti in diagnosi descriptus est — D. Panzer, loco allegato, eum descripsit „ater nitidus, thorace margine, coleoptris sutura, „apice, puncto baseos, anoque flavis,“ et figuram, huic descriptioni respondentem, accuratam, exhibuit.

## F a m. II.

*Corpus* gracilius quam in familia prima, nitidum, impunctum.

*Caput*, thorace angustius, fere autem ejus longitudine, latissimum, nitidissimum.

*Thorax* suborbiculatus; apice angustior, angulis deflexis.

*Coleoptra* rectangula.

*Botobotus pygmaeus* F.

16 *T. melanocephalus*, capite subovato nigro; colore thoracis, elytrorum et abdominis variabili.

*Habitu* *T. sequentis*; statura autem minore et graciliore; thorace paulo angustiore &c.

*Longitudo* 1 — 2 lin.

*Thorax* coleoptris angustior.

*Elytra* lineis duabus longitudinalibus, una disci, altera prope suturam, crenulatis, interdum interruptis, obsoletis, impressa.

Varietatum hujus speciei numerus satis magnus est:

*Var. I.* Thorace rufo; antennis abdomineque fuscis:

1. elytris testaceis; longitudine  $1\frac{1}{3}$  — 2 lin.

*Staph. melanocephalus* Payk. Mon. St. n. 42 — an Fn. Suec.

St. n. 63?

*Oxyp. melanocephalus* Fabr. Ent. Syst. Ox. n. 16.

*Staph. trimaculatus* Payk. Fn. Suec. St. n. 68. v.  $\gamma$ .

2. elytris testaceis, angulo apicis exteriore nigro; longitudine  $1\frac{1}{3}$  — 2 lin.

*Oxyp. pygmaeus* Fabr. E. S. Ox. n. 13.

- *Panzer* Fn. Germ. H. 27. t. 19.

*Var. II.* Abdomine et thoracis disco fuscis.

1. elytris testaceis, angulo apicis exteriore nigro; longitudine  $1\frac{1}{2}$  —  $2\frac{1}{4}$  lin.

*Staph. trimaculatus* Payk. Fn. Suec. St. n. 68. v.  $\beta$ .

2. elytris testaceis, angulo apicis exteriore et puncto ante scutellum nigris; longitudine 2 —  $2\frac{3}{4}$  lin.

*Oxyp. trimaculatus* Fabr. Ent. Syst. Ox. n. 7.

*Staph. trimaculatus* Payk. Fn. Suec. St. n. 68. v.  $\alpha$ .

- *bimaculatus* Schrank Boica. n. 872.

- *littoreus* Payk. Mon. St. n. 55.

*Var. III.* T. fuscus, seu nigricans; pedibus antennarumque basi testaceis;

1. elytris testaceis, angulo apicis exteriore nigro; longitudine 1 —  $1\frac{2}{3}$  lin.

2. elytris rufis, angulo apicis exteriore nigro; longitudine  $1\frac{2}{3}$  lin.

3. elytris rufis, angulo apicis exteriore suturaque nigris; longitudine  $1\frac{1}{2}$  lin.

4. elytris nigris, macula magna humerali rufa; longitudine  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Var. IV.* rufo - fuscus; thorace rufo - testaceo; pedibus, coleoptris que testaceis; his, angulis apicis nigris.

*Var. V.* rufus; thorace rufo - testaceo; pedibus coleoptris que albicantibus, his, angulis apicis fuscis.

Omnes hae varietates videntur frequentissimae in boletis et agaricis; varietates  $\text{IV}$  et  $\text{V}$  vero reliquis rariores.

*Staph. littoreus* Payk, sub varietate II allegans, non idem est ac *St. littoreus* Linn., qui non solum oeconomia longe ab hoc discedit, sed, secundum ipsam descriptionem, insectum plane distinctum designare videtur — Dom. Paykull porro credit, *Oxyp. merdarium* Fabr. et *Staph. disparis* var.  $\epsilon$  Payk. ad *St. trimaculati* var.  $\gamma$  Payk. referendos esse; me autem persuasum habeo, ambo Tachypori generis esse — Tandem dubito, *Staph. melanocephalum* Payk Fn. Succ. (St. n. 68.) huc referri posse, cum, „oculo armato, pube brevissima adpersus“ appareat, uti Paykull, loco citato, ipse dicit. *Tach. melanocephalo*, quem hic descripsi, caput thorax et elytra nuda, omnino depilia, sunt.

*arphaceis*  
 17 *T. striatus*, fuscus; capite thoraceque obscurioribus; elytris rufis, apice nigris.

*Habitu* T. praecedenti simillimus; statura paulo major.

*Longitudo*  $2\frac{1}{5}$  —  $2\frac{3}{4}$  lin.

*Caput* orbiculatum, ore producto, thorace triplo minus, nigrum; antennis fuscis, basi rufis; ore ochraceo.

*Thorax* nigricans, margine laterali summo pallescens.



*Elytra* rufa; apice, nigra; lineis duabus longitudinalibus, subcrenato-punctatis, <sup>punctis</sup> una disci, altera prope suturam, saepe obsoletis, impressa.

*Abdomen* obscurum, segmentorum marginibus pallescentibus.

Variat colore elytrorum et pedum.

*Var. 1* *T. niger*; elytrorum macula magna humerali, margineque apicis summo, rufis; pedibus testaceis.

*Var. 2* *T. niger*; pedibus, coleoptrisque rufis; his, regione scutelli, maculaque magna angulorum apicis, nigris.

*Var. 3* *T. nigricans*; ano, pedibus, elytrisque rufis; his, apice nigris.

*Var. 4* *T. obscure fuscus*; ano rufo; coleoptris rufotestaceis, angulis apicis nigris; pedibus testaceis.

Habitat cum *T. praecedente*; minus autem frequens.

*Staph. striatus* Oliv. Ent. St. n. 37. pl. V. f. 47.

*punctato-striatus* Payk. Fn. S. St. n. 64.

18 *T. lunulatus*, rufus; capite, pectore, abdominisque apice nigris; elytris nigro-cocruleis, basi summoque apicis margine testaceis.

*Habitu* *T. praecedentium* hujus familiae, elytris etiam crenato-striatis; capite autem ovato.

*Longitudo*  $1\frac{3}{4}$  —  $2\frac{1}{4}$  lin.

*Caput* oblongo-ovatum, apicem versus sensim angustatum; ore rufo testacco; antennis, articulis, tribus primis et ultimo rufo-testaceis, mediis fuscescentibus.

*Coleoptra* subquadrata.

*Pedes* testacci; capitibus femorum posticis nigris.

*Anus* niger, annulo plerumque albicante.

*Oxyp. lunulatus* Fabr. Ent. S. O. n. 3.

*Staph. lunulatus* Linn. Fn. S. n. 845.

- Payk. Mon. St. n. 41 et Fn. Suec. St. n. 61.

Habitat in agaricis et boletis, cum T. praecedentibus.

- 2a* *Ta.* : 8.  
 19 *T. atricapillus*, nitidus, rufus; capite, pectore, scutello, abdominisque apice nigris; elytris nigro-coeruleis, macula humerali obliqua et margine apicali testaceis.

*Habitu* T. praecedenti simillimus; statura autem majore, scutello et elytris circa scutellum nigris, semper differt — Cactera omnia huic cum illo communia sunt.

*Longitudo* 3 —  $3\frac{1}{4}$  lin.

Habitat cum T. praecedente, multo autem frequentior.

*Staph. atricap.* Fabr. Sp. Ins. St. n. 19.

- Fabr. Ent. Syst. St. n. 40.

- Payk. Mon. St. n. 35.

- Payk. Fn. Suec. St. n. 60.

- Schrank Boica n. 877.

*Oxyp. lunulatus* Panzer Fn. G. H. 22. t. 15.

- Improbabilis*  
 20 *T. analis*, niger; antennis, elytris, anoque rufis; pedibus testaceis.

*Habitu* T. praecedentium; statura autem paulo majore; capite orbiculato; tarsis anticis brevibus dilatatis.

*Longitudo*  $3\frac{1}{5}$  lin.

*Caput* orbiculatum, nigrum; ore testaceo; antennis, capite thoraceque paulo longioribus, fuscis, articulis tribus primis ultimoque testaceis, hoc cylindrico, longiore quam in cospeciebus hujus generis, longitudine articuli primi, multo autem crassiore.

—*Thorax* coleoptrorum latitudine.

*Coleoptra* thorace multo longiora; elytris, punctis quibusdam disci majoribus obsoletis, vestigio quasi lineae crenato-punctae disci elytrorum specierum praecedentium, impressis.

*Abdomen* obtusum, nigricans; marginibus segmentorum fuscis; ano rufo.

*Peas* testacei; tarsis anticis brevibus dilatatis.

Habitat Brunsvigae.

*Staph. analis* Fabr. Ent. Syst. St. n. 35.

— Payk. Mon. St. et Fn. Suec. St. n. 34. α.

— Olivier Ent. St. n. 38. pl. III. f. 24.

*Oxyperus bicolor* Rossi Fn. Etr. n. 625.

21 *T. merdarius*, niger; antennis fuscis; thorace, pectore, elytris, anoque, rufis; pedibus testaceis.

Habitu *T. striati* (n. 16.); thorace autem latiore, apice minus angusto; coleoptris brevioribus, subpunctis.

*Longitudo* 3 lin.

Habitat Brunsvigae.

*Staph. merdarius* Oliv. Ent. St. n. 39. pl. V. f. 45.

— *analis* Payk. Mon. St. et Faun. Suec. St. n. 34. var. β.

## Genus XI.

## O x y p o r u s.

Palpi anteriores filiformes.

Palpi posteriores securidacei.

*Corpus* nitidissimum, elongatum, depile, convexiusculum.

*Caput* magnū, quadratum; angulis obtusis; laevè; quibusdam speciminibus thorace majus, quibusdam thorace minus. *Mandibulae* porrectae, validae. *Palpi*; anteriores quadriarticulati, filiformes; posteriores securidacei, triarticulati, articulo ultimo maximo transverso triangulari.

*Antennae*, capitis longitudine; extrorsum crassiores compressae; articulis, primo elongato clavato, secundo minimo, tertio et quarto suborbiculatis, sequentibus transversis, latitudine valde crescentibus, ultimo minore suborbiculato obtuso.

*Thorax* convexus, antice truncatus, lateribus posticeque rotundatus, longitudine paulo latior, coleoptris angustior, laevissimus; ora laterali deflexa.

*Coleoptra* quadrata, thorace longiora; elytris laevibus, lineis duabus longitudinalibus interruptis crenato-punctis, una disci, altera prope suturam, impressis.

*Abdomen* breviusculum, marginatum, obtusum; ano acutiusculo.

*Pedes*, capitibus femorum, anticis et posticis approximatis, mediis subremotis, anticis femore duplo brevioribus, ejus autem crassitie, mediis femore plus duplo brevioribus, ejus autem crassitie, posticis minimis absconditis; tibiis ciliatis; tarsis gracilibus, articulo secundo reliquis paululum longiore.

*O. rufus*, rufus; capite, pectore, scutello, coleoptrorum sutura et apice, abdominis apice, femorumque capitibus nigris.

*Longitudo* 3 — 4 lin.

*Caput* nigrum; antennis fuscis, basi rufis; palpis rufis.

*Elytra* nigra; macula magna humerali quadrata, rufo-testacea.

Habitat frequens in boletis; rarior in agaricis.

*Oxyp. rufus* *Fabr.* Ent. Syst. O. n. 1.

- *Payk.* Fn. Succ. O. n. 1.

- *Rossi* Fn. Etr. n. 624.

- *Olivier* Ent. O. n. 1. pl. I. f. 1.

- *Panzer* Fn. Ins. G. H. 16. t. 19.

*Staph. rufus* *Linn.* Fn. Suec. n. 844.

- *Scopoli* Carn. n. 307.

- *Schrank* Boica n. 891 et Austr. n. 438.

- *De Geer* Mem. St. n. 10.

- *Fourcroy* Ent. Par. St. n. 22.

- *nigrofulvus* *Fourcr.* Ent. Par. St. n. 32.

*Geoffr.* Hist. St. n. 22.

2 *O. maxillosus*, testaceus; capite, thorace, coleoptrorumque angulis apicis obscurioribus.

*Habitu*, partiumque proportionem forma et punctura *O.* praecedentis; thorace attamen minus transverso et rotundato, basin versus paululum angustiore.

*Longitudo*  $2\frac{1}{2}$  —  $3\frac{4}{5}$  lin.

Colore variat:

*Var. 1* *O.* capite, thorace, angulisque apicis coleoptrorum nigris.

*Oxyp. maxillosus* *Fabr.* Ent. Syst. O. n. 2.

- *Panzer* Fn. Germ. H. 16. t. 20.

*Var. 2* *O.* capite, thoraceque fuscis; angulis apicis coleoptrorum nigris.

*Var. 3* *O.* capite, thoraceque rufescentibus; angulis apicis coleoptrorum fuscis.

*Var. 4*, capite, angulis coleoptrorum apicis, thoraceque nigris, hoc punctis seu maculis duobus disci rufis.

*Var. 5*, minima, testacea; capite thoraceque rufis; oculis nigris; angulis coleoptrorum apicis fuscis.

Habitat in sylvis, in agaricis; *O.* praecedente rarior.

## Genus XII.

## S t e n u s .

Palpi anteriores triarticulati.

Palpi posteriores filiformes.

*Corpus* elongatum, teretiusculum, crassum, opacum, depile, cicatriculosum, seu punctum; punctis crassioribus.

*Caput* magnum, rugosum, thorace latius. *Oculi* maximi, prosilicentes. *Palpi*, anteriores longissimi, triarticulati, articulo ultimo clavato; posteriores triarticulati, breves, filiformes. *Antennae* medio tenues, apice crassae, capite longiores; articulis, primo valido, secundo brevioribus, clavatis, tertio longissimo tenuissimo, sequentibus longitudine decrescente, filiformibus, octavo crassiore campanulato, nono et decimo crassissimis orbiculatis, ultimo suborbiculato seu subovato acuto.

*Thorax* teretiusculus, medio latior, coleoptris angustior; ora laterali cicatricosa, vix, linea laterali subelevata, separata.

*Coleoptra thoracis longitudine.*

*Abdomen* subcylindricum, durum; ano acuto.

*Pedes* graciles, cursorii; capitibus femorum approximatis, omnibus brevissimis absconditis; tibiis laevibus, nudis; tarsis tenuibus.

1 *St. Juno*, niger; gutta elytrorum, pedibusque testaceis; geniculis nigris.

*Longitudo*  $2\frac{3}{4}$  lin.

*Caput* foveola media longitudinali impressum, nigrum; antennis, capite duplo longioribus, obscure fuscis, articulo primo nitido; palpis testaceis, anterioribus apice fuscis.

*Thorax* subfusiformis, canalicula media longitudinali, subobsoleta impressus.

*Elytra*, gutta disci, apici attamen paulo propiore quam basi, rufo-testacea, nitente.

*Pedes* testacei, capitibus femorum, femorumque apicibus nigris.

*Habitat* Brunsvigae; rarior.

*Staph. Juno Payk.* Mon. St. n. 33. v.  $\beta$ .

*Stenus Juno Payk.* Fn. Suec. St. n. 1. v.  $\beta$ .

2 *St. biguttatus* niger: gutta elytrorum rufo testacea.

*Habitus* toto, partiumque forma et proportione *St. praecedentis*; statura autem minore, punctis subtilioribus, palpis pedibusque nigricantibus, obscure fuscescentibus.

*Longitudo* 2 —  $2\frac{1}{3}$  lin.

*Habitat* frequentissime in arenosis humidis, sub vegetabilibus putrescentibus in lacunis exsiccatis, interdum etiam



sub lapidibus; semel in domo captus; nunquam autem cum St. praecedente.

*Staph. biguttatus* Linn. Fn. S. St. n. 851.

- *Fabr.* Ent. Syst. St. n. 36.

- *Rossi* Fu. Etr. n. 623. var. 2.

- *Schrank* Austr. n. 446.

- *Schrank* Boica n. 871.

- *Panzer* Fn. Germ. H. II. t. 17.

*Paederus bigutt.* Oliv. Ent. P. n. 4. pl. I. f. 3.

*Stenus Juno* Payk. Fn. Succ. St. I. v.  $\beta$ . v.

*Stenus 4 St.*

3 *St. oculatus*, niger; palpis testaceis; antennis rufo-testaceis, articulo primo nigerrimo nitido; pedibus testaceis, geniculis nigris.

*Habitu* toto, *longitudine*, *punctura*, *partiumque forma* et *proportione* St. praecedentis.

Capus in gramine, locis uliginosis, haud frequens.

*Staph. oculatus* Götze Beitr.

*Stenus Juno* Payk. Fn. Succ. St. n. I. v.  $\alpha$ .

4 *St. cicindeloides*, niger; antennis palpisque anterioribus testaceis, apicibus fuscis; pedibus testaceo rufis; geniculis nigris.

*Habitu*, *longitudine*, *punctura*, *partiumque forma* et *proportione* omnino *St. Junonis* (n. 1.); antennis autem palpisque testaceis, et defectu guttae elytrorum distinctus est. — A. St. praecedente, statura majore, punctura crassiore, antennarum articulo primo testaceo &c. satis differt.

Habitat Brunsuigae.

*Staph. cicindeloides* Schaller Act. Hallens. Tom. I. pag. 324.

*Staph. Buphthalmus Rossi* Fn. Etr. St. n. 623. v. 3.

- *clavicornis Scopoli* Carn. n. 303?

*Paeder. proboscideus Olivier* Ent. P. n. 5. pl. I. f. 5.

Dom. *Scopoli*, loco allegato, *St. clavicorni* suo tribuit, inter alios characteres, manifeste ad *Stenum* quendam referendos, „antennas semilineam longas, thoracem subtus rufo „villo pubescentem, abdomen villosum, elytris lucidius.“ Omnia haec ego in nullo *Steno* reperi, et suspicor ideo, *St. clavicornem Scop.* speciem distinctam esse.

5 *St. clavicornis niger*, antennis testaceis, apice et articulo primo nigris.

*Habitu St. oculato* (n. 3.) similis; statura autem minore; pedibus totis nigris.

*Longitudo*  $1\frac{2}{3}$  —  $2\frac{1}{3}$  lin.

*Habitat* Brunsuigae; captus, primo vere, in horto aulico, sub lapidibus in quisquiliis; et, cum *St. biguttato* (n. 2.) sub vegetabilibus putrescentibus in lacuna exsiccata.

*Staph. clavicornis Rossi* Fn. Etr. n. 623. var. 1.

6 *St. Buphthalmus* totus niger.

*Habitu St. praecedentium*; statura autem minore et brevior.

*Longitudo*  $1\frac{2}{3}$  lin.

*Habitat* in arenosis humidis; rarior; semel tantummodo captus, et quidem cum *St. biguttato* (n. 2.).

*Staph. buphthalmus Schrank* Austr. n. 445 et Boica n. 870.

- *clavicornis Panzer* Fn. G. H. 27. t. 11.

7 *St. pallipes*, niger; pedibus, palpis, antennisque testaceis; his autem articulis ultimis et primo nigris.

*Habitu* *St.* praecedentium; statura autem minore et paululum graciliore. Praeterea ab omnibus *Stenis*, pedibus totis testaceis, geniculis concoloribus, differt.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Habitat*, cum *St. oculo* (n. 3.) in gramine, locis uliginosis, ubi duo hujus speciei specimina, copula juncta, prehendi.

*Staph. clavicornis* Fabr. Ent. S. St. n. 37.

8 *St. fuscipes*, niger; palpis, antennis, pedibusque fuscis.

*Habitu* quidem *St.* praecedentium; omnium autem minimus; thorace paulo brevior, pedibus rufo-fuscis, distinctus.

*Longitudo*  $1\frac{1}{4}$  lin.

*Habitat?* — Brunsvigae.

9 *St. circularis*, niger, nitidulus; thorace brevi, latitudine vix longiore.

*Habitu*, *St.* praecedentibus brevior.

*Longitudo*  $\frac{4}{5}$  lin.

*Antennae* et *palpi* fuscescentes; *labrum* testaceum.

*St. circularis* — Mus. Pr. Knoch.

Non potui sustinere, exemplum plurimorum Entomologorum sequi, omnes has *Stenorum* species in unam speciem redigentium. Characteribus gaudent constantissimis, proveniunt locis et temporibus diversis, et vicitant nimis separatae, quam quod mihi persuadere possim, esse subspecies

tantum speciei unius communis Saepius magnam individuorum hujus illiusve speciei multitudinem, uno eodemque loco et tempore, reperi, rarissime autem cum aliis diversae speciei mixtam; si hoc vero aliquando contigerit, semper attamen individua, eaque perpauca, speciei fuerunt, quam forsitan omnium minime cum illa conjunxissem, (E. g. *St. buphthalmi* et *St. biguttati*; *St. clavicornis* et *St. biguttati*.) — Multo minus autem credo, varietatem magnitudinis et coloris partium quarundam differentiam sexualem respicere; experientia obstat. Dom. Paykull individua duo *Steni*, „gutta elytrorum testacea,“ copula juncta vidit; ego ipse duo individua *Steni pallipedis*.

# Coleoptera Microptera

## exotica.

---

### Genus I.

### Staphylinus.

#### Fam. I.

*St. hirtus*, niger; capite, thorace, abdominisque apice fulvis; coleoptris cinereis, basi nigris.

*Habitu et partium forma ac proportione St. maxillosi.*

*Longitudo* 8 — 10 lin.

*Corpus*, supra lanuginosum; infra nudum nigrum nitidum, excepta segmenti penultimi basi fulvo-lanuginosa.

*Caput* fulvum; oculis, ore antennisque nudis nigris.

*Thorax* fulvus, basi nuda nigra; linea media longitudinali nitida.

*Scutellum* nigro-sammetinum.

*Coleoptra* pilosa, basi nigra, apice cinerea subobscura nebulosa.

*Abdomen* nigrum; segmentis tribus ultimis fulvis.

Habitat Bremæ &c.

*St. hirtus* Linn. Fn. Suec. n. 839.

- *Fabr.* Ent. Syst. St. n. 2.

- *Payk.* Mon. St. et Fn. Suec. St. n. 1.

- *Panzer* Fn. Ins. Germ. H. 4. t. 19.

- *Bombylius De Geer* Mem. St. n. 5.

- 2 *St. villosus*, niger, nitidus; thoracis angulis anticis, pectore, coleoptrorum vitta transversali, abdominisque medio, cinereis.

*Habitu*, partiumque forma ac proportione, *St. maxilloso* simillimus; angulis autem anticis thoracis, pectore, segmentisque modo duobus mediis cinereo-villosis distinctus.

*Longitudo*  $5\frac{3}{4}$  lin.

*Abdomen* supra nigrum, segmentis duobus mediis lateribus cinereis.

Habitat in America septentr.

*St. villosus* — Mus. Pr. *Knoch.*

## Fam. II.

- 3 *St. macrocephalus*, nigricans, subnitidus; clypeo testaceo; coleoptris fuscis.

*Habitu* *St. similis*; statura autem majore, clypeo testaceo, capite thoraceque subaeneis &c. satis differt.

*Longitudo* 8 — 9 lin.

*Caput*, thorace latius, nitidum, nigro-aeneum, linea media longitudinali obsoleta laevi nitida; clypeo testaceo; antennis, capite longioribus, extrorsum tenuioribus, arti-

culis tribus ultimis rufescentibus; palpis fuscis, articulis apice pallidioribus.

*Thorax* subnitidus; nigro-aeneus; linea media longitudinali obsoleta laevissima; coleoptris paulo angustior et longior.

*Coleoptra* transversa, opaca, rufo-fusca.

*Abdomen* subnitidum, fusco-nigrum.

*Pedes* nigro-fusci; tarsi pallidioribus.

Habitat in montibus Hercyniae.

*St. macroceph.* — Mus. Pr. Hellwig.

4 *St. tomentosus*, niger, opacus; antennis extrorsum subcrassioribus.

*Habitu St. olentis*; capite autem orbiculato minore, antennis extrorsum paulo crassioribus, thorace coleoptrisque paulo longioribus, et statura graciliore.

*Longitudo* 6 lin.

*Corpus* opacum, subtilissime confertissimeque punctum, pilis brevissimis depressis vestitum.

*Caput* orbiculatum, thorace paulo minus.

*Thorax* latitudine paululum longior.

*Coleoptra* subquadrata.

Habitat in America septentr.

*St. tomentosus* — Mus. Pr. Knoch.

5 *St. ater*, niger, nitidus; antennis tarsisque fuscis.

*Habitu St. Morionis*; capite autem et thorace nitidioribus, parcius punctis; coleoptris latitudine paulo longioribus.

*Longitudo*  $7\frac{1}{2}$  lin.

*Caput et thorax nitidiora quam reliquae corporis partes, linea media longitudinali laevi nitidissima.*

*Habitat in America septentr.*

*St. ater* — Mus. Pr. *Knoch.*

6 *St. violaceus*, niger, nitidulus; coleoptris violaceis.

*Habitu St. cyanei*; capite autem et thorace nitidioribus, crassius, nec confertissime, punctis; thorace paululum convexiore.

*Longitudo*  $6\frac{1}{4}$  lin.

*Caput punctum*; linea media longitudinali laevi, nitida; nigrum, subviolaceo-nitens.

*Thorax niger*, subviolaceo - et cyaneo-nitens; linea media longitudinali deficiente.

*Habitat in America septentr.*

*St. violaceus* — Mus. Pr. *Knoch.*

7 *St. zonatus*, cupreus, subnitidus; femoribus, abdomineque nigris; segmentorum marginibus cinnabarinis.

*Habitu St. aeneocephali*; statura autem longiore, punctura crassiore et colore differt.

*Longitudo*  $7\frac{1}{2}$  lin.

*Caput punctum*, linea longitudinali deficiente, cupreo-aeneum, infra nigrum nitidum; clypeo testaceo; oculis et mandibulis nigris.

*Thorax cupreo-aeneus*, punctus, linea media longitudinali obsoleta, laevi, basin versus latiore.

*Abdomen nigrum*, apice rufum, marginibus segmentorum cinnabarinis.

*Pedes nigri*, tibiis tarsisque rufis.



Habitat in America septentr.

*Staph.* — Mus. Pr. *Hellwig.*

8 *St. baltimorensis*, fuscus, nitidus; capite thoraceque nigris nitidissimis.

*Habitu* transit ex hac Staphylinorum familia in sequentem. Capite scilicet nitido, parumpuncto, medio laevi, et thoracis punctis in series subdispositis, potius ad familiam sequentem numerandus est. Thorace autem quadrato, apice haud angustiore, cum reliquis huius familiae Staphylinis congruit.

*Longitudo* 5 — 6 lin.

*Caput* orbiculatum, thorace latius, punctum; punctis paucis subtilibus; medio laevissimum nitidissimum, nigrum; antennis capite longioribus, extrorsum subcrassioribus fuscescentibus.

*Thorax* quadratus, coleoptris angustior, convexior quam reliquis huius familiae Staphylinis, nitidissimus, medio laevissimus, lateribus punctus; punctis haud confertis, in series decem vel duodecim subdispositis.

*Coleoptera* quadrata, subtiliter cicatriculosa.

*Pedes*, tarsi anticis dilatatis.

Habitat in America septentr.

*St. baltimorensis* — Mus. Pr. *Knoch.*

9 *St. pedator*, niger, subnitidus; antennis pedibusque rufis.

*Habitu*, partiumque forma ac proportione *St. geneocephali* maximi; statura autem paulo maiore, capite thoraceque crassius punctis et minus nitidis.

*Longitudo* 7 lin.

*Caput* nigrum, linea media nitida laevi; palpis antennisque fuscis, his articulo primo rufo.

*Thorax* linea media longitudinali nitidissima subelevata.

*Habitat* — Mus. Com. de *Hoffmannsegg*.

10 *St. fuscatus*, niger, opacus; capite thoraceque nitidis; hoc subtiliter nec confertim puncto.

*Habitu* partiumque forma ac proportione varietati *St. aeneocephali* simillimus; capite autem thoraceque paulo crassius nec confertissime punctis.

*Longitudo* 6 lin.

*Caput* et *thorax* linea media longitudinali obsoleta laevissima nitidissima.

*Antennae* et *pedes* fusi.

*Coleoptra* et *abdomen* opaca, nigricantia, subgrisescenti-sericantia.

*Habitat* — Mus. C. de *Hoffmannsegg*.

11 *St. cinnamopterus*, nigricans, subnitidus; coleoptris, segmentorum marginibus, tarsis, tibiisque rufescentibus.

*Habitu* *St. aeneocephali*; capite autem et thorace crassius punctis, et minus nitidis.

*Longitudo*  $5\frac{1}{2}$  — 6 lin.

*Caput* et *thorax* aenei, subobscurè rufescentes.

*Abdomen* subgriseo-sericans.

*Habitat* Baltimore.

*St. cinnamopt.* — Mus. Pr. *Knoch*.

12 *St. fossator* niger, subopacus; clytris nigro-fuscis, macula apicis fulvo-testacea.

*Habitu St. fossori similis*; thorace autem brevior, coleoptris paulo latioribus.

*Longitudo*  $6\frac{1}{2}$  lin.

*Caput et thorax* quadrati; linea media longitudinali laevi, basi nitidissima.

*Coleoptra* longitudine paulo latiora, nigro-fusca, macula elytrorum apicis subquadrata.

Habitat in America septentr.

*St. fossator* — Mus. Pr. Knoch.

13 *St. maculosus*, pubescens, griseo-nebulosus, infra flavo-sericans; coleoptris fusciscentibus; tibiis et tarsis testaceis.

*Habitu St. pubescentis*; statura autem maiore, colore et pube differt.

*Longitudo* 9 — 11 lin.

*Corpus* pube brevissima tenui tectum.

*Caput* quadratum, angulis obtusis, thoracis fere magnitudine; supra subolivaceo-aeneum, punctum; infra nigrum, nitidum; linea media longitudinali deficiente; fronte circa oculos rufescente; clypeo flavescente seu rufo-testaceo; antennis, capitis longitudine, extrorsum subcrassioribus, fuscis, apice rufo-sericantibus, articulo primo apice rufo.

*Thorax*, colore et punctura capitis; linea media longitudinali, laevi, nitida, basin versus latiore.

*Coleoptra* obscure rufescentia, subfusco-nebulosa.

*Scutellum* nigrum, medio samuctinum.

*Abdomen* supra pilis griseo-flavescentibus tenuibus tectum, segmentis, medio, punctis duobus obscuris; infra subflavescenti-sericans, marginibus segmentorum flavis.

*Pectus* nigrum, pilis brevibus tenuibus flavis sericans.

*Pedes* testacco-rufi; capitibus femorum nigris; femoribus anticis et posticis nigris, marginibus et geniculis rufescentibus; femoribus mediis nigris, margine inferiore et geniculis rufis.

Habitat Baltimore.

*St. maculosus* — Mus. Pr. Knoch.

- 14 *St. cingulatus*, nebulosus; pedibus antennisque fusciscentibus; pectore, abdominis apice, segmentorumque basi ventre, fulvo-sericantibus.

*Habitu*, partiumque forma, proportione, punctura, colore et signaturis *St. nebulosi*; pectore autem, segmentis tribus ultimis supra totis, omnibus vero infra basi, fulvo-sericantibus, nec non statura maiore differt.

*Longitudo* 7 — 9 lin.

Habitat in America septentr.

*St. cingulatus* — Mus. Pr. Knoch.

- 15 *St. chloropterus*, viridi-aeneus; abdomine nigricante, marginibus segmentorum rufis; pedibus testaceis, femoribus nigro-annulatis.

*Habitu* et partium forma ac proportione *St. murini*.

*Longitudo* 4 lin.

*Caput* nitidulum, confertissime punctum; linea media longitudinali, laevi, nitida; subviridi-vel cupreo-aeneum; antennis palpisque rufescentibus.

*Thorax* nitidulus, colore capitis, confertissime punctus; linea media longitudinali, laevi, basin versus, latiore nitidissima.

*Scutellum* nigro-sammetinum.

*Coleoptra* nitidula, viridana, smaragdi colore, subobscure nebulosa, margine apicali ciliis brevibus flavescentibus fimbriata.

*Abdomen* nigrum, opacum; apice, segmentorumque marginibus rufis.

*Pectus* pilis tenuibus flavo-griscentibus sericans.

*Pedes* testacei; macula seu annulo femorum, capitibusque femorum nigris; his griscenti-sericantibus.

*St. chloropterus* (Creutzer) *Panzer* Fn. Ins. Germ. H. 20 t. 36.

Habitat in Austria.

### Fam. III.

16 *St. cinctulus*, niger, nitidus; pedibus antennisque fusciscentibus; elytris aeneis; marginibus segmentorum primi et secundi albidis.

*Habitu* quidem *St. aeneocephalo* e familia secunda similis; thorace autem suborbiculato, seriebus dorsalibus tripunctis.

*Longitudo* 5 lin.

*Caput* orbiculatum, thorace paulo minus, laeve, nitidum, nigrum, basi punctum; antennis, capite thoraceque brevioribus, fusciscentibus; oculis ovatis magnis.

*Thorax* subquadratus; apice vix angustior, angulis minus deflexis quam in conspeciebus huius familiae; coleoptris paulo minor; seriebus dorsalibus tripunctis, puncto ultimo remoto, ad basis marginem sito; seriebus lateralibus tripunctis; punctis marginalibus pluribus, duobus autem majoribus.

*Coleoptra* pilis brevibus tecta, subviridi-aenea.

Habitat in Bengala.

*St. cinctulus* — Mus. Pr. Hellwig.

- 17 *St. cyanipennis*, niger, nitidus; coleoptris vel cyaneis, vel coeruleis, vel viridibus.

*Habitu*, partiumque forma ac proportione *St. aenei*; punctura autem subtiliore et elytrorum colore differt.

*Longitudo* 5 lin.

*Caput* orbiculatum, vel thorace angustius, vel eius latitudine; punctis quibusdam subtilibus basi impressum.

*Thorax* seriebus dorsalibus quadripunctis, lateralibus arcuatis tripunctis, marginalibus bipunctis.

*Coleoptra* pilis brevibus tenuibus tecta.

*Pedes*, tarsi anticis gracilibus.

Habitat in America septentr.

*St. cyanipennis* Fabr. Ent. S. St. n. 29.

- 18 *St. metallicus*, niger, nitidus; elytris aeneis; thorace seriebus dorsalibus quinquepunctis; capite orbiculato.

*Habitu* *St. aenei*; statura autem graciliore, splendore minus nitido.

*Longitudo*  $3\frac{3}{4}$  lin.

*Caput* orbiculatum, thorace minus; antennis capite thoraceque vix brevioribus.

*Thorax* seriebus dorsalibus quinquepunctis, lateralibus tripunctis, marginalibus bipunctis.

*Coleoptra* quadrata, subpilosella, coeruleo-viridique-aenea. Forsan nitor coeruleo-aeneus fortuitus, et viridiae-nus solus proprius est.

Unicum, quod possideo, individuum huius speciei, verisimile cum aliis Staphylinis in fimo captum est prope Brunswigam.

19 *St. Virgo*, niger, nitidus; thorace seriebus dorsalibus sexpunctis; capite suborbiculato.

*Habitu St. variante gracilior.*

*Longitudo* 3 lin.

*Caput* latitudine paulo longius, thorace angustius; antennis, capitis thoracisque longitudine, gracilibus.

*Thorax* seriebus dorsalibus sexpunctis, lateralibus tripunctis, marginalibus bipunctis, punctis subtilibus.

*Coleoptra* quadrata depila.

*Pedes*, tarsi anticis subdilatis fuscis.

Habitat in Lusitania.

*Staph.* — Mus. Com. de Hoffmannsegg.

20 *St. umbrinus*, niger, nitidus; abdomine elytrisque subopacis; palpis pedibusque fuscis; thorace seriebus dorsalibus quinquepunctis; capite orbiculato.

*Habitu St. atrati.*

*Longitudo*  $3\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* orbiculatum, thoracis fere magnitudine.

*Coleoptra* quadrata, subsericans, depila.

*Abdomen* subsericans,

Habitat in America septentr.

*St. umbrinus* — Mus. Pr. Knoch.

21 *St. umbratilis*, niger, nitidus; coleoptris aenescentibus; palpis pedibusque pallide fuscis; thorace seriebus dorsalibus quadripunctis; capite orbiculato.

*Habitu*, *St. praecedente* minor et gracilior; capite minore; coleoptris latitudine paulo longioribus

*Longitudo* 3 lin.

Habitat in America septentr.

*St.* — Mus. Pr. *Knoch.*

22 *St. ebeninus* niger, nitidus; pedibus piceo-fuscis; thorace seriebus dorsalibus quinquepunctis; capite orbiculato.

*Habitu* *St. atrati*; punctura autem thoracis et colore pedum distinctus.

*Longitudo*  $3\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* orbiculatum, nitidissimum, thorace paulo angustius; antennis, capite longioribus, palpisque obscure fuscis.

*Thorax* nitidissimus.

*Coleoptra* subquadrata, latitudine paulo longiora, puncta, nitida, pilis tenuibus grisescentibus vestita.

*Abdomen* nigrum, nitidum, pilis tenuibus grisescentibus sericans.

Habitat Brunsvigae.

23 *St. thoracicus*, niger, nitidus; basi antennarum, thorace, pedibus, elytrisque rufis.

*Habitu* *St. marginali*; statura autem paulo graciliore et minore, thorace paulo angustiore.

*Longitudo* 3 lin.



*Caput* subovatum, thorace minus, nitidissimum, nigrum; palpis, antennarumque articulo primo rufis; antennis, capitis thoracisque longitudine, articulo ultimo pallido.

*Thorax* nitidissimus, rufus; seriebus dorsalibus sexpunctis, lateralibus tripunctis, marginalibus bipunctis.

*Coleoptera* quadrata, subnitida, subtilissime puncta, obscure rufa, depilia.

*Abdomen* nigrum, subgrisco-sericans.

Habitat in America septentr.

*St. thoracicus* — Mus. Pr. Knoch.

24 *St. rufipes*, niger, nitidus; antennis, palpis, pedibusque rufis; thorace seriebus dorsalibus tripunctis.

*Habitu*, partiumque forma ac proportione *St. marginati*.

*Longitudo*  $3\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* suborbiculatum, thorace angustius, nitidum; oculis magnis oblongis.

*Thorax*, coleoptris paulo angustior, nitidus; seriebus dorsalibus tripunctis, punctis subtilibus; seriebus lateralibus obsoletis; puncto marginali uno distincto.

*Coleoptera* quadrata, subopaca, depilia, grisescentia, subtilissime confertissimeque puncta.

*Abdomen* subopacum, nigrum; ventre viridi-aeneo.

*Pedes* rufi: capitibus femorum mediis et posticis nigris.

Habitat in Bohemia.

*St. rufipes* — Mus. C. de Hoffmannsegg.

25 *St. sericans*, nitidus, fusco-nigricans, subsericeo-nitens; pedibus pallidis; thorace seriebus dorsalibus sexpunctis; capite orbiculato.

*Habitu St. fuscii*; thoracis autem seriebus dorsalibus sexpunctis.

*Longitudo* 2 lin.

*Thorax* colore fugacissimo obsoleto griseo sericans; seriebus dorsalibus sexpunctis, lateralibus tripunctis, puncto marginali uno.

*Coleoptera* quadrata depilia,

Habitat in America septentr.

*St. nitens* — Mus. Pr. Knoch.

26 *St. brunneus*, nitidus, fusco-nigricans; pedibus rufis; thorace seriebus dorsalibus sexpunctis; capite orbiculato.

*Statura* graciliore et longiore, capite thoraceque proportionaliter minoribus, a *St.* praecedente differt.

*Longitudo* 2½ lin.

*Caput* orbiculatum, thorace paulo minus, nigricans; palpis, antennarumque basi rufescentibus.

*Thorax* vel rufo-vel nigro-fuscus.

*Abdomen* subgriseo-sericans.

Habitat in America septentr.

*St. brunneus* — Mus. Fr. Knoch.

27 *St. praecox*, testaceus, nitidus; capite et thoracis disco fuscis.

*Longitudo* 3 lin.

*Caput* suborbiculatum, thorace angustius, fuscum; ore, antennarumque basi pallide rufis; his capite thoraceque brevioribus.

*Thorax*, coleoptrorum latitudine, fuscus, testaceo-marginatus; seriebus dorsalibus tripunctis.

*Coleoptera* testacea, latitudine paulo longiora, subopaca, puncta, depilata.

*Abdomen* coloribus variis aeneis nitens.

*Pedes* testacei; tarsi anticis dilatatis.

Habitat in Lusitania.

*St.* — Mus. Comitis de *Hoffmannsegg*.

28 *St. laticollis*, niger, nitidus; antennis, palpis, elytris, pedibusque rufescentibus; thorace seriebus dorsalibus tripunctis; capite orbiculato.

*Habitu* quidem *St. nitidi*; thorace autem medio haud latiore, angulis apicis haud declivis, antennis multo gracilioribus, satis differt.

*Longitudo*  $4\frac{1}{3}$  lin.

*Caput* suborbiculatum, thorace minus, nitidissimum; palpis rufis; antennis, capite vix paulo longioribus, gracilibus, fere filiformibus, fuscis, articulo primo interdum rufo.

*Thorax* suborbiculatus, nitidissimus, lateribus declinatus; seriebus dorsalibus tripunctis, lateralibus bipunctis, punctis subtilibus; puncto autem marginali majore.

*Coleoptera* quadrata, subtiliter et confertim puncta, pilis brevibus tenuibus tecta, castanea vel nigro-rufa.

*Abdomen* nitidum, pilis griseis tenuissimis sericans.

*Pedes* rufo-fuscescentes, apice interdum pallidiores; tarsi anticis dilatatis.

Habitat Baltimore.

*St. laticollis* — Mus. Pr. *Knoch*.

29 *St. ventralis*, nitidus, nigricans; basi antennarum, pedibus, segmentorumque marginibus ventre, rufis; thorace seriebus dorsalibus quinquepunctis.

*Habitu St. subuliformis.*

*Longitudo* 3 lin.

*Caput* orbiculatum, thorace angustius, nigrum; ore rufo; antennis, capite longioribus, fuscis, articulo primo rufo.

*Thorax*; seriebus dorsalibus quinquepunctis, punctis tribus mediis approximatis; seriebus lateralibus tri- vel quadri-punctis, arcuatis; marginalibus bipunctis.

*Coleoptra* quadrata depilia.

*Pedes* rufo-testacei.

*Habitat* in Lusitania.

*St.* — Mus. Com. de *Hoffmannsegg*.

30 *St. obscurus*, niger, nitidus; thorace seriebus dorsalibus quinquepunctis; capite suborbiculato.

*Habitu St. opaci*; statura autem paulo graciliore, capite paululum maiore, capitibus femorum anticis (quae *St. opaco* semper piceo-testacea sunt) nigris &c. differt.

*Longitudo* fere 3 lin.

*Caput* thorace paulo angustius.

*Coleoptra* latitudine paulo longiora, pilis sparsis tecta.

*Pedes* obscure fusciscentes.

*Habitat* Brunsvigae.

31 *St. contaminatus*, niger, nitidus; coleoptris subsanguineo-nitentibus; thorace seriebus dorsalibus quinquepunctis; capite suborbiculato.

*Habitu*, medium tenet inter *St. bipustulatum* et *St. sanguinolentum*.

*Longitudo*  $3\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* suborbiculatum, thorace paulo minus, antennis capite paululum longioribus, crassioribus et brevioribus quam in speciebus affinis.

*Thorax* *St. bipustulati*, paulo longior et angustior quam in *St. sanguinolento*; seriebus dorsalibus quinquepunctis, punctis tribus mediis approximatis.

*Pedes* fusciscentes; capitibus femorum concoloribus, vix paulo pallidioribus.

*Habitat* Brunsvigae.

32 *St. fimetarius*, niger, nitidus; elytris aeneis; pedibus pallidis; thorace seriebus dorsalibus quadripunctis; capite subovato:

*Habitu* *St. ochropodis*; thorace autem seriebus dorsalibus quadripunctis; statura maiore.

*Longitudo*  $2\frac{1}{2}$  —  $3\frac{1}{4}$  lin.

*Caput* subovatum, thorace plerumque paulo minus, rarius thoracis magnitudine; antennis vix capitis thoracisque longitudine.

*Thorax* *St. ochropodis*, seriebus autem dorsalibus quadripunctis.

*Coleoptera* subviridi-aenea, subpilosa.

*Abdomen* nigrum, interdum pilis grisescens vestitum.

*Pedes* vel testacei, vel fusciscentes; capitibus femorum anticis compressis, nitidissimis, pallidis.

*Habitat* Brunsvigae, in fimo bovino et equino.

- 33 *St. sordidus*, niger, nitidus; elytris aencis; thorace seriebus dorsalibus quadripunctis; capite suborbiculato.

*Habitu* et magnitudine *Staph. ochropodis*; thorace autem seriebus dorsalibus quadripunctis, capite paulo minore quam thorax, pedibus nigris.

*Longitudo*  $2\frac{1}{2}$  lin.

*Thorax* *St. ochropodis*.

Habitat in fimo; cum *St. praecedente*.

- 34 *St. Anthrax*, nitidus; nigricans; pedibus rufis; thorace subquadrato, seriebus dorsalibus quinquepunctis.

*Habitu*, partiumque forma proportione ac punctura *Staph. ochropodis*.

*Longitudo* 3 lin.

*Caput* suborbiculatum, thoracis magnitudine.

*Thorax* antice haud angustior, subquadratus, latitudine paulo longior, nigro-fuscus.

*Coleoptra* quadrata, obscure fuscescencia, depilata.

Habitat in America septentr.

*St. anthrax* — Mus. Pr. Knoch.

#### Fam. IV.

- 35 *St. emmesus*, niger, nitidus; thorace, elytris, pedibus, anoque rufis.

*Habitu*, partiumque forma ac proportione *St. ochracei*; differt autem punctura thoracis et colore.

*Longitudo*  $2\frac{3}{4}$  lin.

*Caput* nigerrimum; antennis, capitis longitudine, fuscis, basi rufescentibus; palpis rufis.

*Thorax* rufus; seriebus punctorum *St. elongati*.

*Coleoptra* testaceo-rufa, puncto-striata.

Habitat in America septentr.

*St. emmesus* — Mus. Pr. Knoch.

36 *St. longiceps*, nigricans, nitidus; antennis pedibusque pallide fuscis; thorace lateribus multipuncto.

*Habitu*, partiumque forma ac proportione omnino *St. ochracei*; punctura autem thoracis differt.

*Longitudo*  $2\frac{3}{4}$  lin.

*Thorax* subtiliter, nec confertissime, punctus, linea media longitudinali lata laevissima; punctis interdum in serie octo obsoletas subdispositis.

*Coleoptra* picescentia.

Habitat in Lusitania.

*St. longiceps* — Mus. C. de Hoffmannsegg.

37 *St. punctulatus*, niger, nitidissimus; antennis pedibusque fuscis; thorace lateribus multipuncto.

*Habitu*, partiumque forma proportione ac punctura *Staph. ochracei*; statura autem maiore — An, cum *St. praecedente* et *St. ochraceo*, eiusdem speciei?

*Longitudo* 3 — 4 lin.

*Corpus* nitidum, nigricans vel subfuscens, subaeneo-nitens.

*Caput* subtiliter punctum, medio laeve, nigrum; antennis palpisque rufescentibus seu fuscis.

*Thorax* ut in *St. praecedente*.

*Coleoptra* puncta, haud puncto-striata.

*Pis.* rufi vel fuscescentes.

Habitat in Lusitania.

*St. punctulat.* Mus. C. de *Hoffmannsegg.*

38 *St. glabratus*, niger, nitidus; elytris rufo - testaceis; thoracæ seriebus dorsalibus sexpunctis.

*Habitu*, partiumque forma ac proportione *St. glabri*; statura autem multo maiore.

*Longitudo* 5.— 6 lin.

*Caput*, laeve, nitidum, basi punctum, nigrum; antennis et palpis fuscis.

*Thorax*, seriebus dorsalibus sexpunctis, lateralibus quadripunctis, marginalibus tripunctis, ultimis duabus apice conjunctis uti in *St. glabro*, ochraceo &c.

*Coleoptera* puncta; punctis crassis nec confertissimis; obsolete subpuncto-striata.

*Pedes*, femoribus obscure fuscis, tibiis tarsisque pallide fuscis seu rufescentibus.

Habitat in Lusitania.

*St.* — Mus. Com. de *Hoffmannsegg.*



## Genus II.

## Lathrobium.

1 *L. bicolor*, nigrum, nitidum; thorace, elytris, anoque fusco-castaneis; pedibus testaceis.

*Habitu*, partiumque forma ac proportione omnino *L. badii*.

*Longitudo*  $4\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* confertim punctum, nigrum; palpis antennisque fuscis; his, capitis thoracisque longitudine, articulo primo rufo.

*Thorax* confertim punctus, linea media longitudinali laevi nitida.

*Abdomen* nigrum, segmentis duobus ultimis fusco-castaneis.

*Pedes* testacei; capitibus femorum rufis; tarsis tenuibus.

Habitat in America septentr.

*Paederus bicolor* — Mus. Pr. Knoch.

2 *L. pallipes*, nigricans, nitidum; pedibus testaceis; ore antennarumque articulo primo rufis.

*Longitudo* 4 —  $4\frac{1}{2}$  lin.

• *Corpus* nigrum seu obscure fuscum.

*Caput* ovatum, thorace paulo latius et brevius, vel magnitudine thoracis, nigrum, punctum; antennis, capite thoraceque paulo brevioribus, gracilibus, extrorsum vix paulo crassioribus, fuscis, articulis, primo rufo longissimo ut in *L. fracticorni*, sequentibus elongato - campanulatis longitudine decrescente, ultimo orbiculato acuminato; ore rufo, mandibulis nigris falcatis.

*Thorax* coleoptris angustior, at vix paulo brevior, nitidissimus, punctus; linea media longitudinali laevissima glaberrima.

*Coleoptra* nitidula, puncta, punctis cicatricosis.

*Abdomen* subpilosellum.

*Pedes* graciles, testacei; capitibus femorum rufis.

Habitat in America septentr.

*Paederus pallipes* — Mus. Pr. Knoch.

3 *L. politum*, nitidum, pallide fuscum; antennis pedibusque rufescentibus; capite nigricante; thorace elytrisque puncto-striatis.

*Habitu*, magnitudine, partiumque forma proportione ac punctura omnino *L. sequentis*. An hujus varietas junior?

*Caput* nigricans; antennis fuscis, articulo primo rufo; palpis rufis.

*Thorax* obscure fuscus.

*Coleoptra* fusco-rufescentia.

*Abdomen* infra rufescens, supra fuscum, tenuissime griseo-sericans.

*Pedes* antici pallide rufi, medii fuscii.

Habitat in America septentr.

*Paederus politus* — Mus. Pr. Knoch.

4 *L. longiusculum*, nigrum, nitidum; ore, antennis, elytris, pedibusque rufescentibus; thorace elytris puncto-striatis.

*Habitu*, partiumque forma ac proportione *L. elongati*; punctura autem differt.

*Longitudo* 3 lin.

*Caput* nitidum, subtiliter vage punctum, medio laevissimum, nigrum; ore antennisque rufescentibus; his gracilibus, capitis thoracisque longitudine vel paulo longioribus.

*Thorax* nitidus, laevis; scribebus dorsalibus novempunctis, lateralibus et marginalibus octopunctis; punctis subtilibus.

*Coleoptera* subnitidula, puncto-striata; striis interdum obsolete; fusco-castanea.

*Abdomen* nigrum; segmentis tribus ultimis interdum obscure rufis; pilis brevibus tenuibus grisescentibus tectum.

*Pedes* pallide rufi; tarsis anticis brevibus dilatatis.

Habitat in America septentr.

*Paederus longiusculus* — Mus. Pr. Knoch — Coleoptris distincte puncto-striatis; abdomine nigro, segmentis ultimis margine subpallidis.

Habitat etiam in Lusitania.

Mus. Com. de *Hoffmannsegg* — Coleoptris obsolete puncto-striatis, ano rufescente.

5 *L. gracile*, nigrum, nitidum; ore, antennis, pedibus, coleoptrorum et abdominis apice rufis.

*Habitu*, partiumque proportionem forma ac punctura *L. elongati*; statura autem multo minore, nitore splendidiore &c. distinctum.

*Longitudo* 3 lin.

*Coleoptra* basi nigra, apice rufa; sutura attamen tota nigra.

Habitat in Lusitania.

*Staph. gracilis* — Mus. Com. de *Hoffmannsegg*.

6 *L. depressum*, nigrum, nitidum, deplanatum; antennis pedibusque fuscis; coleoptris puncto-striatis, rufis, basi nigris.

*Habitu* ab omnibus conspeciebus satis discedit.

*Longitudo*  $3\frac{1}{4}$  lin.

*Caput* quadratum, angulis obtusis, apicem versus vix paulo angustius, depressum, magnitudine thoracis, nitidum, subtiliter, nec confertissime, punctum, nigrum; ore rufotestaceo; antennis filiformibus, capite thoraceque vix longioribus, fuscis, articulis, primo valido, secundo brevi, tertio paulo longiore quam secundus, clavatis, sequentibus longitudine decrescentibus, ultimo ovato acuto.

*Thorax* latitudine paulo longior, depressus, basin versus subangustatus, nitidus, subtiliter, nec confertissime, punctus, angulis anticis acutis.

*Coleoptera* plana, subrectangula, thorace paulo longiora, subnitida, puncta vel puncto-striata.

*Abdomen* planum, nigrum; ano fusciscente.

*Pedes* rufi; femoribus posticis et capitibus femorum nigricantibus.

Habitat in Lusitania.

Mus. Com. de *Hoffmannsegg*.

## Genus III.

## P a e d e r u s.

1 *P. corticinus*, subnitidus, fusco-nigricans; ore, antennis, coleoptris, thorace, pedibusque pallidioribus.

*Habitu P. castanei*; statura autem brevior et minus gracili, capite et thorace latioribus &c. satis differt.

*Longitudo*  $2\frac{3}{4}$  lin.

*Corpus* supra obscurum, infra pallidum; capite, thorace, elytrisque nitidulis; subtilissime et confertissime punctis, punctis oculo bene armato conspicuis.

*Caput* quadratum, magnitudine thoracis.

*Thorax* quadratus, basin versus vix ac ne vix quidem angustatus, coleoptris paulo minor, rufo-fuscus; linea media longitudinali laevi nitida.

*Coleoptra* quadrata, pallide picea.

*Abdomen* nitidulum, griseo-sericans; supra obscure fuscum, marginibus segmentorum pallidis; infra rufescens.

*Pedes* rufi.

Habitat in America septentr.

*Paed. corticinus* — Mus. Pr. Knoch.

a *P. ruficollis*, nitidus, niger vel subcyanescens; coleoptris cyaneis; thorace rufo.

*Statura, magnitudine, partiumque forma proportione ac punctura P. littoralis.*

*Caput*; palporum anteriorum articulo medio rufo; apice interdum fusciscente.

*Thorax* subtiliter vage punctus.

Habitat sub lapidibus, in Germania, Lusitania.

*P. ruficollis*: Fabr. Ent. Syst. P. n. 2.

- Panzer Fn. Germ. H. 27. t. 22.

*Staph. rufc.* Payk. Mon. St. n. 18.

## Genus V.

## Aleochara.

## Fam. II.

- 1 *A. dichroa*, nigra, nitida; pedibus elytrisque testaceis.

*Habitu* omnino *Al. Boleti*; statura autem paulo graciliore.

*Longitudo*  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* thorace minus, nigrum; antennis fuscis, capite thoraceque longioribus, articulo primo rufo.

*Thorax* transversus, lateribus rotundatus, nitidus, foveola ante scutellum impressus.

*Coleoptra* quadrata.

*Habitat* in America septentr.

*Al. dichroa* — Mus. Pr. Knoch.

## Fam. III.

- 2 *A. lata*, nigra, nitida; coleoptris brevissimis.

*Habitu* omnino *Al. fuscipedis* maioris; tota autem nigra, coleoptris brevioribus, elytris quadratis.

*Longitudo*  $2\frac{1}{3}$  — 3 lin.

*Habitat* in America septentr.

*Al. lata* — Mus. Pr. Knoch.



3 *A. bimaculata*, nigra, nitida; elytris apice rufo - testaceis; thorace obsolete bisulcato.

*Habitu* *Al. fuscipedis*; statura autem paulo angustiore, antennis gracilioribus, thoracis sculptura &c. ab illa discedit.

*Longitudo*  $2\frac{1}{4}$  —  $2\frac{3}{4}$  lin.

*Caput* nigrum; antennis, capite longioribus, palpisque fuscescentibus.

*Thorax* nitidus; foveis ante scutellum duabus obsolete longitudinalibus, dimidii thoracis longitudine, punctis, impressus.

*Coleoptera* nigra, seu obscure fusca; macula anguli interioris elytrorum apicis testacea seu rufo castanea.

*Abdomen* nigrum, subgriseo - sericans.

*Pedes* obscure fusci.

*Habitat* in America septentr.

*Al. bimaculata* Mus. Pr. Knoch.

## Genus VIII.

## Anthophagus.

- 1 *A. dichrous*, subnitidus, niger; ore, antennis, thorace, scutello, elytris, pectore, pedibusque rufis.

*Longitudo*  $3\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* thoracis magnitudine; antennis capite thoraceque longioribus.

*Thorax* *A. testacei*, punctus, lateribus et ante basin impressus.

*Coleoptra* rectangula, thorace duplo longiora et latiora, cicatriculoso-puncta.

Habitat Dresdae.

*Staph. dichrous* — Mus. C. de Hoffmannsegg.

- 2 *A. alpinus*, niger, nitidus; apice antennarum thoraceque fuscis; basi antennarum, elytris, pedibusque testaceis.

*Habitu* omnino *A. armigeri*; statura autem multo minore, capite nigro simplici.

Habitat in betula et salice, in summis alpibus Lapponiae.

*Staph. alpinus* Fabr. Ent. S. St. n. 33.

*Staph. Payk. Fn. Suec. St. n. 27.*

*Olivier Ent. St. n. 45. pl. VI. f. 55.*

; *A. plagiatus*, niger, nitidus; pedibus antennisque fuscis; elytris disco sanguineis.

*Habitu*, partiumque forma ac proportione *A. obscuri*; magnitudine autem et elytrorum disco sanguineo distinctus est.

*Longitudo*  $2\frac{1}{2}$  lin.

*Habitat* — Mus. Pr. *Hellwig.*

*Staph. plagiatus Payk. Fn. Suec. St. n. 28.*

An *St. plagiatus Fabr.* (Suppl. St. pag. 180.)? cui thorax est planus.

## Genus IX.

## Tachyporus.

1 *T. crassus*, nitidus, brevis, subgriseo-sericans, nigro-fuscus; antennis pedibusque pallidioribus.

*Statura*, *T. pubescente* multo latior et crassior.

*Longitudo*  $1\frac{3}{4}$  lin.

*Thorax* convexus nitidus.

*Coleoptra* nitidula, subquadrata, longitudine vix paulo latiora.

Habitat in America septentr.

*T. crassus* — Mus. Pr. Knoch.

## Genus X.

## T a c h i n u s .

## Fam. I.

1 *T. batycheus*, niger, nitidus; antennis, pedibus, clytrorumque humeris rufis.

*Habitu* *T. bipustulati* et *humeralis*; thorace autem et coleoptris angustioribus.

*Longitudo*  $2\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* nigrum; antennis rufo-fuscescentibus, articulis tribus primis rufis.

*Thorax* niger, marginibus lateralibus subpallidioribus.

*Coleoptra* latitudine paulo longiora, nigra; sutura et clytrorum macula humerali subquadrata obscure castaneis.

*Pedes* pallide rufi; capitibus femorum nigricantibus.

*Habitat* in America septentr.

*Tachyporus batychr.* — Mus. Pr. Knoch.

2 *T. fimbriatus*, niger, nitidus; coleoptris castaneis, margine apicali nigro.

*Habitu* *T. rufipedis*, statura autem multo maiore, thorace proportionaliter paulo latiore.

*Longitudo*  $3\frac{1}{4}$  lin.

Caput nigrum; antennis fuscis, capite thoraceque brevioribus, articulo primo rufescente; labro palpisque pallide rufis.

*Coleoptra* subquadrata, obsolete striata, castanea, margine apicali et margine dimidio laterali nigris.

*Pedes* fuscescentes.

Habitat in America septentr.

*Tachypor. fimb.* — Mus. Pr. Knoch.

3 *T. memnonius*, niger, nitidulus; ore, antennis, pedibusque rufis.

*Habitu*, partiumque forma ac proportione *T. pullo* similis; statura autem paulo maiore, nitore minus splendido.

*Longitudo*  $2\frac{2}{3}$  lin.

Caput nigrum, palpis antennisque fuscescentibus; his basi pallidioribus.

Habitat in America septentr.

*Tachypor. memm.* — Mus. Pr. Knoch.

4 *T. marginalis*, niger, nitidus; thoracis lateribus, coleoptorum sutura et margine apicali, pedibusque testaceis.

*Habitu*, partiumque forma ac proportione omnino *T. suturalis*.

*Longitudo* 1 lin.

Caput cum antennis et palpis, nec non thorax omnino

*T. suturalis*.

*Coleoptra*; sutura margineque apicali testaceis, hoc autem obsolete.

*Pedes* testacci; capitibus femorum nigris.

Habitat in America septentr.

*Tachypor. marg.* — Mus. Pr. *Knoch.*

Fam. II.

5 *T. niger*, niger, nitidus; antennarum articulo primo, et segmenti penultimi margine, rufescentibus.

*Statura* quidem magna et colore nigro ab omnibus huius familiae cospeciebus discedit; forma autem et proportione partium, imprimis thoracis et ultimi antennarum articuli, utique cum illis congruit.

*Longitudo* 5 lin.

*Caput* ovatum, thorace plus duplo minus, laeve nitidum, nigrum; clypeo testaceo; palpis antennisque fuscis, his, articulis primo et ultimo rufis.

*Coleoptra* subquadrata, latitudine vix paulo longiora, laevia; elytris, serie disci obsolete tripuncta.

*Abdomen* pilis brevibus tenuissimis vestitum, nigrum; segmento penultimo rufo, basi nigricante.

Habitat in America septentr.

*Tachyp. niger* — Mus. Pr. *Knoch.*

6 *T. cinctus*, nitidus, rufus; capite, pectore, anoque nigris; coleoptris chalybeis, basi et sutura rufis.

*Habitu*, partiumque forma proportione et punctura omnino *T. atricapilli*; statura autem minus gracili et sutura rufa differt.

*Longitudo*  $2\frac{1}{2}$  lin.

*Antennae* nigricantes, articulis tribus primis et ultimo rufis.

Habitat in America septentr.

*Tachypor. cinctus* — Mus. Pr. Knoch.



## Genus XI.

## Oxyporus.

1 *O. lateralis*, nitidus, rufus; lateribus thoracis et capitis, angulisque coleoptrorum apicis nigris.

*Habitu* *O. rufi*; coleoptris autem multo majoribus, et thorace medio latiore.

*Longitudo*  $3\frac{1}{2}$  lin.

*Corpus* infra, cum palpis et pedibus, testaceum.

*Caput*, thoracis magnitudine, pallide vel obscure rufum; disco, oculis et angulis basis nigris.

*Thorax* pallide seu obscure rufus; lateribus rotundatis nigris; coleoptris duplo angustior et brevior.

*Coleoptera* quadrata, apicem versus paulo latiora, testacea; sutura interdum, angulis vero apicis semper, nigris; elytris, disco punctis et bistriatis, striis vero apicem haud attingentibus (ut in *Oxyp. rufo*).

*Abdomen* rufum, plerumque punctis duobus segmenti singuli nigris notatum.

Habitat in America septentr.

*O. lateralis* — Mus. Pr. *Knoch*.

2 *O. vittatus*, niger, nitidus; palpis, pedibus, coleoptrisque testaceis, his margine laterali atque sutura nigris.

*Habitu*, partiumque proportione, forma et sculptura omnino Oxyp. *maxillosi* — Ab O. sequente, statura minore, capite thorace elytrisque nitidioribus, thorace brevioris, pedibus totis testaceis differt.

*Longitudo* 3 lin.

*Caput*; antennis, capite paulo brevioribus, pallide fuscis, articulo primo testaceo.

*Thorax* transversus, lateribus rotundatis, medio latissimus.

*Coleoptra* testacea; sutura et vitta marginali, apicem versus dilatata, nigris.

Habitat in America septentr.

*Ox. vittatus* — Mus. Pr. Knoch.

- 3 *O. femoralis*, niger, nitidulus; palpis posticis, tibiis, tarsis, coleoptris testaceis; his sutura margineque laterali nigris.

*Habitu* O. praecedentis.

*Longitudo*  $3\frac{3}{4}$  lin.

*Thorax*, longitudine latitudinis, basin versus subangustatus.

*Coleoptra* omnino ut in Oxyp. praecedente.

*Pedes* nigri; tibiis testaceis, summa apice nigra; tarsis testaceis.

Habitat in America septentr.

*O. vittati* var. — Mus. Pr. Knoch.

- 4 *O. cinctus*, niger, nitidus; antennis, palpis pedibusque testaceis; abdominis ventre margineque rufis; coleoptris testaceis, sutura atque lateribus nigris.

*Habitu omnino O. vittati* (n. 2.), a quo colore solummodo differt — An eius varietas?

*Longitudo* 3 lin.

*Coleoptra* testacea; sutura et vitta laterali, apicem versus dilatata, latiore quam in *Ox. vittato*, nigris.

Habitat in America septentr.

*O. cinctus* — Mus. Pr. Knoch.

5 *O. caelatus*, nitidus, cicatricosus, niger; coleoptris rufis, angulis apicis nigris.

*Longitudo* 2 lin.

*Caput*, thoracis magnitudine, punctis crebris crassis nodulisque scabrum; oculis globosis prosilientibus.

*Thorax* convexus, quadratus, lateribus paululum rotundatis, coleoptrorum longitudine; punctis crebris crassis impressis nodisque cicatricosis scabrum; nodis septem maioribus insignibus, quorum quatuor, figuram quadrati exhibentes, in discum, quintus ante scutellum, sextus et septimus ad latera dispositi sunt.

*Coleoptra* transversa, thorace latiora, punctis impressis nodulisque cicatricosis irregularibus scabra.

*Abdomen* nigrum, marginibus subrufescentibus; serie nodulorum marginali, nodulis singuli segmenti duobus.

*Pedes* rufi; femoribus apice nigris.

Habitat in America septentr.

*O. caelatus* — Mus. Pr. Knoch.

## Genus XII.

## S t e n u s.

1 *St. cordatus*, niger; pedibus rufis, genibus nigris; thorace cordato.

*Habitu* Stenorum plurimorum, thorace autem cordato, coleoptris proportionaliter latioribus, abdomine apicem versus attenuato, satis distinctus.

*Longitudo* 3 lin.

*Corpus* nitidulum, punctum, punctis autem subtilioribus quam in *St. cicindeloides*.

*Thorax*, longitudine latitudinis, cordatus, sulcis duobus longitudinalibus obsoletis impressus, coleoptris brevior et duplo angustior.

*Coleoptra* quadrata lata.

*Abdomen* apicem versus attenuatum.

*Pedes*; femoribus basi rufis, apice nigris; tibiis rufis, basi nigris.

Habitat in Lusitania.

Mus. Com. de *Hoffmannsegg*.

## Genus XIII.

## Astrapeus.

Palpi securidacei.

*Habitu*, partiumque forma atque proportione Staphylinorum familiae tertiæ.

*Caput*; palpis, articulis ultimis securiformibus, reliquis clavatis.

1 *A. Ulmi*, niger, nitidus; antennarum basi, ore, elytris et segmento penultimi margine rufis.

*Habitu* Staph. *nitidi* maioris.

*Longitudo*  $4\frac{1}{2}$  —  $5\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* suborbiculatum, thorace minus, laevissimum, nitidissimum, nigrum; antennis, capite paulo longioribus, fuscis, articulo primo rufo; clypeo testaceo; labro rufo; palpis rufo-testaceis.

*Thorax*, coleoptorum magnitudine, suborbiculatus, apice angustior, lateribus deflexus, laevissimus, nitidissimus, puncto interdum uno alterove impressus.

*Coleoptera* quadrata, nitidissima, laevia; elytris, serie  
disci longitudinali recta quadripuncta.

*Abdomen* nitidulum.

*Pedes* nigri; tibiis tarsisque anticis fuscescentibus, his  
dilatatis.

Habitat sub cortice Ulmi, primo vere — *Rossi*.

*Staph. Ulmi Rossi* Fn. Etr. n. 611 tab. V fig. 6.

- *Olivier* Ent. St. n. 17 pl. IV f. 37.

## Genus XIV.

## P i n o p h i l u s .

Palpi filiformes.

Antennae filiformes.

Thorax quadratus, postice truncatus.

*Habitu* Lathrobiiis affinis, praecipue *L. pallipedi* et *L. badio*, palpis autem filiformibus et thorace quadrato differt — A Staphylinis thorace basi truncato distinctus.

*Corypus* filiforme Lathrobii.

*Caput* orbiculatum, thoracis fere latitudine, punctum. Labro et clypeo brevibus latis. Mandibulis falcatis acutis. Palpis filiformibus, anterioribus quadriarticulatis, posterioribus triarticulatis. Antennis filiformibus; articulis ultimo suborbiculato acuminato, reliquis clavatis, primo longissimo valido, tertio et quarto longioribus quam secundus, sequentibus longitudine decreascentibus.

*Thorax* quadratus, basi truncatus, capite paulo longior, coleoptis paulo brevior, convexiusculus, punctus, linea media longitudinali subobsoleta laevi nitida. Canalicula marginali puncta. Ora laterali deflexa glaberrima, basi latiore.

*Coleoptera* rectangular, puncta, thoracis latitudine.

*Pedes cursorii*, subpiloselli; antici validi fossorii, capitibus femorum femore paulo brevioribus, ejus autem crassitie, femoribus tibiisque brevibus validis, tarsis brevissimis dilatatis; posteriores graciliores, capitibus femorum brevissimis, articulis tarsorum, primo longiore, tertio brevissimo, quinto, seu ungula, haud apici articuli quarti, sed basi ejus, seu apici articuli tertii, adhaerente; tibiis posticis apice oblique sinuatis.

1 *P. latipes*, fusco - nigricans; palpis, antennis, pedibusque testaceis.

*Longitudo* 6 lin.

*Antennae*, capite thoraceque paulo breviores; articulis testaceis apice fusciscentis, excepto primo toto testaceo.

*Pedes* testacei; capitibus femorum nigricantibus.

Habitat in America septentr.

*Paederus latipes* — Mus. Pr. *Knock*.



## I n d e x.

Nomina, literis cursivis impressa, significant genera nova vel species novas. Species, quibus litera *e* postposito est, exoticæ sunt.

*Aleochara* G. V.

pag. 67 et 186.

<i>Aerhiops</i>	n. 15	<i>lucida</i>	n. 4
<i>alternans</i>	— 26	<i>lugens</i>	— 40
<i>analis</i>	— 14	<i>moesta</i>	— 41
<i>aterrima</i>	— 29	<i>morion</i>	— 45
<i>bimaculata e</i>	— 3	<i>nana</i>	— 47
<i>hipunctata</i>	— 37	<i>nigra</i>	— 12
<i>boleti</i>	— 21	<i>nigricollis</i>	— 24
<i>canaliculata</i>	— 1	<i>nigritula</i>	— 25
<i>cinnamomea</i>	— 30	<i>nitida</i>	— 44
<i>collaris</i>	— 6	<i>obfuscata</i>	— 28
<i>corticalis</i>	— 13	<i>obscura</i>	— 10
<i>deplanata</i>	— 50	<i>opaca</i>	— 31
<i>depressa</i>	— 49	<i>picea</i>	— 11
<i>dichroa e</i>	— 1	<i>polita</i>	— 48
<i>elongatula</i>	— 18	<i>prolixa</i>	— 5
<i>fumata</i>	— 42	<i>pulla</i>	— 43
<i>fuscipes</i>	— 36	<i>pumilio</i>	— 46
<i>humeralis</i>	— 33	<i>pusilla</i>	— 17
<i>impressa</i>	— 7	<i>pygmaea</i>	— 27
<i>inquinula</i>	— 16	<i>ryularis</i>	— 8
<i>laevis</i>	— 39	<i>ruficornis</i>	— 34
<i>lanuginosa</i>	— 38	<i>strumosa</i>	— 35
<i>lata e</i>	— 2	<i>sulcata</i>	— 9
<i>limbata</i>	— 3	<i>tenuis</i>	— 23
<i>linearis</i>	— 2	<i>teres</i>	— 19
<i>longicornis</i>	— 29	<i>umbrata</i>	— 32
<i>longiuscula</i>	— 20		

*Anthophagus* G. VIII.

pag. 120 et 187.

<i>Alpinus e</i>	n. 2	<i>obscurus</i>	n. 4
<i>armiger</i>	— 3	<i>plagiatus</i>	— 5
<i>caraboides</i>	— 1	<i>testaceus</i>	— 2
<i>dichrous e</i>	— 1		

*Astrapaëus* G. XIII.  
pag. 199.

Ulmii e n. I

*Callicerus* G. IV.  
pag. III.

Obscura n. I

*Lathrobium* G. II.  
pag. 51 et 179.

Badium	n. 3	lineare	n. 6
bicolor e	— 1	longiusculum e	— 4
brunnipes	— 10	longulum	— 4
castaneum	— 1	multipunctum	— 2
depressum e	— 6	pallipes e	— 2
elongatum	— 8	pilosum	— 9
fracticorne	— 5	politum e	— 3
gracile e	— 5	terminatum	— 7

*Omalium* G. VII.  
pag. III.

Brachypterum	n. 5	Ranunculi	n. II
brunneum	— 3	rivulare	— 8
crenatum	— 4	rufum	— 6
depressum	— 2	ragosum	— 7
florale	— 10	striatum	— 12
planum	— 1	Viburni	— 9

*Oxyporus* G. XI.  
pag. 150 et 195.

Caelatus e	n. 5	maxillosus	n. 2
cinctus e	— 4	rufus	— 1
femorialis e	— 3	vittatus e	— 2
lateralis e	— 1		

*Oxytelus* G. VI.  
pag. 101.

Caelatus	n. 4	nitidulus	n. 8
carinatus	— 6	pedicellus	— 2
cornutus	— 10	piceus	— 5
depressus	— 3	pulcher	— 7
fuliginosus	— 1	tricoloris	— II
morsitans	— 9		

*Paederus* G. III.  
pag. 58 et 184.

Angustatus	n. 7	ochraceus	n. I
bicolor	— 2	orbiculatus	— 6
castaneus	— 3	riparius	— 5
corticinus e	— 1	ruficollis e	— 2
littoralis	— 4		

*Pinophilus* G. XIV.

pag. 201.

Latipes e

n. I

*Staphylinus* G. I.

pag. 1 et 159.

<i>Aeneocephalus</i>	n. 8	<i>laminatus</i>	n. 17
<i>aeneus</i>	— 18	<i>lateralis</i>	— 50
<i>albipes</i>	— 40	<i>lasicollis</i> e	— 28
<i>alternans</i>	— 72	<i>lepidus</i>	— 48
<i>Anthrax</i> p. 176	— 34	<i>linearis</i>	— 64
<i>atév</i> e	— 5	<i>longiceps</i> e	— 36
<i>aterrimus</i>	— 62	<i>lucidus</i>	— 24
<i>atriatus</i>	— 23	<i>macrocephalus</i> e	— 3
<i>attenuatus</i>	— 38	<i>maculosus</i> e	— 13
<i>baltimorensis</i> e	— 8	<i>marginatus</i>	— 32
<i>bimaculatus</i>	— 55	<i>maxillosus</i>	— 1
<i>binotatus</i>	— 39	<i>metallicus</i> p. 168	— 18
<i>bipustulatus</i>	— 54	<i>micans</i>	— 34
<i>boops</i>	— 26	<i>morio</i>	— 4
<i>brevicornis</i>	— 28	<i>murinus</i>	— 15
<i>brunneus</i> e	— 26	<i>nebulosus</i>	— 14
<i>carbonarius</i>	— 31	<i>nigritulus</i>	— 61
<i>castanopterus</i>	— 10	<i>nitens</i>	— 36
<i>cephalotes</i>	— 27	<i>nitidulus</i>	— 37
<i>chlopterus</i> e	— 15	<i>nitidus</i>	— 46
<i>cinctulus</i> e	— 16	<i>obscurus</i> p. 174	— 30
<i>cinerascens</i>	— 74	<i>ochraceus</i>	— 65
<i>cingulatus</i> e	— 14	<i>ochtopus</i>	— 57
<i>cinnamopterus</i> e	— 11	<i>olens</i>	— 2
<i>concinus</i>	— 25	<i>opacus</i>	— 35
<i>contaminatus</i> p. 174	— 31	<i>palmula</i>	— 73
<i>corruscus</i>	— 47	<i>parvicornis</i>	— 30
<i>crassicollis</i>	— 7	<i>parvulus</i>	— 63
<i>cyanens</i>	— 5	<i>pedator</i> e	— 9
<i>cyampennis</i> e	— 17	<i>politus</i>	— 19
<i>debilis</i>	— 52	<i>praecox</i>	— 27
<i>decorus</i>	— 20	<i>pubescens</i>	— 13
<i>discoides</i>	— 56	<i>punctulatus</i> e	— 37
<i>ebeniinus</i> p. 170	— 22	<i>punctus</i>	— 22
<i>elegans</i>	— 68	<i>rigidicornis</i>	— 29
<i>elongatus</i>	— 66	<i>rufipennis</i>	— 59
<i>egmesus</i> e	— 35	<i>rufipes</i> e	— 24
<i>erythropterus</i>	— 11	<i>sanguinolentus</i>	— 53
<i>fimetarius</i> p. 175	— 32	<i>sericans</i> e	— 25
<i>fossator</i> e	— 12	<i>similis</i>	— 3
<i>fossor</i>	— 9	<i>sordidus</i> p. 176	— 33
<i>fragilis</i>	— 44	<i>splendidulus</i>	— 60
<i>fulgidus</i>	— 71	<i>splendens</i>	— 16
<i>fuliginosus</i>	— 49	<i>stercorarius</i>	— 12
<i>fulminans</i>	— 70	<i>subuliformis</i>	— 42
<i>fulvipes</i>	— 33	<i>tennis</i> N	— 58
<i>fuscatus</i> e	— 10	<i>terminatus</i>	— 43
<i>fuscus</i>	— 41	<i>thoracicus</i> e	— 23
<i>glaber</i>	— 67	<i>tomentosus</i> e	— 4
<i>glabratus</i> e	— 38	<i>tricolor</i>	— 6
<i>hirtus</i> e	— 1	<i>tristis</i>	— 43
<i>impressus</i>	— 51	<i>umbratilis</i> e	— 21

umbrinus e	n. 20	villosus e	n. 2
ustulatus	— 69	violaceus e	— 6
varians	— 21	virgo e	— 19
ventralis e	— 29	zonatus e	— 7

*Stenus G. XII.*

pag. 153 et 198.

Digittatus	n. 2	cordatus e	n. 1
buphthalmus	— 6	fuscipes	— 8
cicindeloides	— 4	Juno	— 1
circularis	— 9	oculatus	— 3
clavicornis	— 5	pallipes	— 7

*Tachinus G. X.*

pag. 134 et 191.

Analıs	n. 20	marginális e	n. 4
atricapillus	— 19	marginellus	— 14
batyehrous e	— 1	melanocephalus	— 16
bipustulatus	— 2	memnonius e	— 3
castaneus	— 7	merdarius	— 21
cinctus e	— 6	niger e	— 5
collaris	— 13	pallus	— 6
corticinus	— 11	rufipes	— 4
fimbriatus e	— 2	signatus	— 5
fimetarius	— 9	sordidus	— 8
humeralis	— 3	striatus	— 17
immaturus	— 12	subterraneus	— 1
laticollis	— 10	suturalis	— 15
lunulatus	— 18		

*Tachyporus G. IX.*

pag. 124 et 190.

Abdominalis	n. 3	dissimilis	n. 1
analıs	— 8	lateralis	— 4
binotatus	— 12	marginatus	— 5
bipunctatus	— 13	nitidulus	— 2
bipustulatus	— 11	pedicularius	— 14
cellaris	— 10	pubescens	— 9
chrysomelinus	— 7	ruficollis	— 6
crassus e	— 1		

